

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF LONDON

Accession Number

Press Mark

LIEUTAUD, J.

vol 1

65536/7



$\frac{C}{C.56}$

56

1866

307

COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA,
CHE CONTIENE
L'ISTORIA DELLE MALATTIE,
E LA MANIERA DI TRATTARLE.

CLXV

COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA,
CHE CONTIENE
L'ISTORIA DELLE MALATTIE,
E LA MANIERA DI TRATTARLE.

Henr. Tournes.

COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA,
CHE CONTIENE
L'ISTORIA DELLE MALATTIE,
E LA MANIERA DI TRATTARLE:

CON OSSERVAZIONI, E RIFLESSIONI CRITICHE
INTORNO AI PUNTI PIU' RILEVANTI

DEL SIGNOR
GIUSEPPE LIEUTAUD,

MEDICO DI MONSIGNORE IL DUCA DI BORGOGNA,
E DEGL' INFANTI DI FRANCIA:
MEMBRO DELL'ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE,
E DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA.
TRADOTTO DALLA LINGUA FRANCESE.
TOMO PRIMO.



IN VENEZIA, MDCCLXXIV.

Presso GIAMBATISTA PASQUALI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

THE CONSTITUTION
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA
AS REVISED
AND ENLARGED
BY THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1787
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1791
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1795
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1798
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1803
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1810
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1817
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1820
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1823
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1826
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1829
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1832
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1835
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1838
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1841
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1844
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1847
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1850
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1853
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1856
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1859
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1862
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1865
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1868
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1871
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1874
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1877
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1880
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1883
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1886
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1889
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1892
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1895
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1898
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1901
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1904
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1907
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1910
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1913
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1916
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1919
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1922
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1925
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1928
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1931
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1934
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1937
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1940
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1943
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1946
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1949
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1952
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1955
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1958
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1961
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1964
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1967
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1970
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1973
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1976
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1979
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1982
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1985
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1988
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1991
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1994
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 1997
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2000
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2003
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2006
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2009
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2012
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2015
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2018
AND THE CONSTITUTIONAL
CONVENTION OF 2021

IN WITNESS WHEREOF
WE HAVE HEREunto
set our hands and
affixed the Great Seal
of the United States
this 22d day of September
1787

INTRODUZIONE.

LA pratica della vera Medicina, illuminata dalle Scienze, che le vanno innanzi (a) è fondata sull' Istoria d' un numero così grande di fatti, tanto semplici, che combinati, che è quasi impossibile l' avergli presenti tutti colla memoria anche la più esercitata. Una *pittura*, che riunisse tutte queste *disperse cognizioni*, e le presentasse con nettezza, e precisione, sarebbe veramente vantaggiosissima: ma questo progetto quanto è agevole a concepirsi, se bene vi si rifletta, è altrettanto malagevole ad effettuarsi. Io pertanto mi vi sono insensibilmente impegnato in iscrivendo per mio uso colla maggiore accuratezza, e attenzione, di cui io era capace, il risultato delle osservazioni, che mi hanno somministrato, ed un lungo esercizio al letto degli ammalati, e l' apertura di numero ben grande di cadaveri. A questa mia fatica, allorchè mi è venuto in capo di pubblicarla, ho aggiunto quella dei nostri migliori Pratici, estraendo dai loro Scritti tutto quello, che poteva arricchire questa mia Opera. Non ho adottato, che i soli fatti, i quali mi son comparsi i meglio certificati, e i più sbarazzati di produzioni d' ingegno di niun valore: gli ho soprattutto presi da quei tali, che pubblicando le loro buone riuscite, non hanno dissimulato, o taciuto le infelici. In una parola, ho messo insieme non meno dalle mie *Osservazioni*, che da quelle degli altri, tutto quello, che ho

A

rin-

(a) La maggior parte delle Mattematiche, la Fisica Sperimentale, la Chimica, l' Anatomia, l' Istoria Naturale, ec.

rinvenuto di più importante , e di più certo nell' arte di conservâr la vita all' uman genere .

L' ordine da me dato agli articoli di questo *Compendio* , non è gran fatto ricercato ; ma non per questo riuscirà meno vantaggioso a' nostri Pratici . Siccome io ho rinunciato a tutte le illusioni della Fisica sistematica ; così io non poteva abbracciar quello , che è cavato da quei vizj , i quali suppongonsi , non meno nelle parti organiche , che nel sangue , nella linfa , e negli altri umori . L' ordine alfabetico produce un ammasso informe di parti , che non hanno infra loro alcun rapporto , trovandosi ciascun articolo isolato necessariamente , e senza la menoma connessione con quello , che lo precede , e con quel , che lo seguita ; oltre di che egli è troppo arbitrario a motivo della nomenclatura diversa delle infermità , di modo che si stenta sovente a trovare quel , che si cerca , se non vi s' insinui il puro caso . Io ho creduto di schivare siffatti sconcerti col sottometermi all' ordine anatomico per tutte le malattie , sì interne , che esterne , le quali ne son suscettibili : facendo precedere l' esposizione di quelle , che son generali , o che non hanno sede fissa : e per uniformarmi a un uso prudentemente stabilito , ne ho separate le malattie delle donne , e dei fanciulli . Egli è agevole il vedere , come questa disposizione può somministrare parecchi ripieghi per li casi , che non sono comuni , o che s' incontreranno la prima volta , sopra i quali segue tutto giorno , che si consultino gli altrui Libri , senza il menomo frutto .

Questo mio Libro era scritto in Latino , ma per delle ragioni , che non rileva il sapersi , io l' ho disteso in Franzese , e non ho lasciato che pochi Titoli particolari , che non possono tradursi in questa

sta Lingua . Ho procurato in ciascheduno articolo di non omettere alcuno di quei *segni* , che caratterizzano l' infermità , che ne è il soggetto , e d' esporre a un tempo stesso i *sintomi* , che possono accompagnarla : io avrei voluto esser in grado di presentargli separatamente ; ma fanno bene i Pratici , che per quante differenze abbiano stabilite i nostri Autori fra queste due sorte di fenomeni , uno è spesso fiate obbligato a confondergli , avvegnachè la Natura non abbia sottoscritto la distinzione , che ne fa ; ed oltre a ciò , perchè non vi ha , quasi dissi , cosa tanto arbitraria , quanto l' applicazione dei termini , che gli distinguono . Avrei anche bramato nell' esporre , sì gli uni , che gli altri , d' uniformarmi all' ordine dei tempi : ma e chi non fa , ch' essi non si fissano ad alcun tempo ? Quindi è secondo il mio avviso , che intorno a ciò non posson darsi , che delle cose generali , o degli spropositi .

Siccome io non ho voluto porre in questa raccolta alcuna ipotesi , così non mi è stato lecito il fermarmi nelle cagioni prossime e immediate , esposte con tante varietà , e presunzioni nei nostri Libri , quantunque perpetuamente impenetrabili : ma non ho lasciato di favellare di quelle , che diconsi *evidenti* , e *lontane* , le quali possono svelare con meno ambiguità il vero carattere delle malattie . Ho altresì fondato la mia dottrina sopra osservazioni in tutti i generi le più meditate , e la cui sola catena può formare un sistema solido , e fermo , il quale dal tempo , che tutto rovescia , non può essere in un menomo chè danneggiato . Mi è paruto , che in un' opera dell' indole di questa mia , non potesse aver luogo , che la sola Teoria ; ed è agevole il vedere , com' ella differisce poco dalla Pratica : avvegnachè si possa coltiva-

re la prima , se altri s' attiene all' osservazione , ovvero alle riflessioni , che ella fa nascere , e che eserciti la seconda , operando al letto degl' infermi : la prima in una parola è lo studio meditato di tutti i fatti di Pratica ridotti in precetti ; e la seconda è l' applicazione di quelli .

Dalle mie Memorie mi è stata somministrata una buona parte di ciò , che ho scritto intorno alla fede delle malattie , o intorno agli iconcerti , che ne sono il prodotto . Non si stenterà a credere , che , essendomi tutto dato pel corso di venti anni a fatiche relative a siffatto oggetto , mi sieno passati per le mani molti casi , che sieno sfuggiti agli altri . Io ne presento il semplice risultato , che uniscono a quello delle osservazioni del genere medesimo , che sono state mede insieme dai Signori *Bonet* , e *Manget* ; come altresì di tutte quelle , che si trovano sparse nei libri più recenti . Non debbo però tacere , aver io fatto uso dell' une , e dell' altre con qualche riserva , essendomi sembrato , che coloro , i quali ce le hanno comunicate , non avessero tutti quel discernimento , e quello spirito d' esame , i quali soli dar possono del peso a simili relazioni . Dannosi però molte malattie , intorno alle quali nulla c' insegna l' apertura dei cadaveri : ella si è buona cosa l' eserne prevenuto , affinchè non venga preso per una omissione il mio silenzio sopra di ciò in alcuni articoli .

Io non mi sono esato overchiamente intorno alle *predizioni* , perchè io non ho creduto necessario il ripetere in ogni articolo , che il delirio , il sopore , e le convulsioni , l' oppressione , e il rilasciamento , gli svenimenti , il sudor freddo , ed altri sintomi gravi , comuni a tutte le malattie , erano pericolosi : e vi ha forse chi possa ignorarlo ! Ma ve ne sono degli altri , i quali , secondo le

circostanze , esser possono buoni , o rei , come la febbre , le eruzioni , o fioriture cutanee , le emorragie , il vomito , lo scioglimento del ventre , e somiglianti . Mi son dato il pensiero di farne parola . Nulladimeno quei , che non son privi d'esperienza , e che hanno il raro talento di pensare , e di riflettere , fanno benissimo , ed hannolo per avventura imparato a proprie spese , che non si dee pronunziare sopra l'avvenire , se non se con massima riserva ; hanno essi indubitatamente toccato con mano , come quasi tutto quello , che *Ippocrate* , il quale ha soverchio generalizzato i casi particolari , ha scritto sopra questa materia , è pieno d'incertezze : io rilevo finalmente , che questo Autore c'istruisce più , allorch'ei confessa , che *non si può predire alcuna cosa di certo nelle malattie acute* , che in tutto quello , ch'egli ha sparso nelle sue Opere sopra siffatto soggetto .

Me la passo altresì leggermente rispetto *alla dieta* , tuttochè io la riguardi come il punto più rilevante della Cura , e benchè l'osservarla sia una di quelle regole fondamentali della Medicina , dalla quale non è mai lecito il dilungarsi : ma non ho però creduto , che per un Medico alquanto accurato possa esservi cosa , che suggerir se gli debba sopra tal particolare . Con tutto questo io non lascio di far tratto tratto osservare nel decorso di questo Compendio , come si può alcuna volta ritrarre maggior vantaggio da ciò , che dall'applicazione di tutti i rimedj . In fatti quante volte non si è veduto , sia nelle malattie acute più formidabili , sia nelle croniche più ostinate , averla vinta il solo governo , e riuscire infruttuosi , senza il soccorso di quello , i più celebrati rimedj ? Se vi ha finalmente nella Medicina alcuna cosa , che possa meritare tutti i pomposi elogj , che dan-

nosì dai Ciarlatani ai loro Segreti, si è il governo nella dieta.

Il trattamento termina tutti i miei articoli: per ciascheduna malattia io propongo i principali *rimedj*, che vi si sono applicati. Quantunque io gli abbia ridotti a un picciol numero, non lascio tuttavia d' additarne una serie più copiosa di quello abbisogni per porsi in opera nei casi ordinarij. Si sa, che i mali acuti ne vogliono, generalmente parlando, pochissimi, e che non è tampoco permesso l' applicarli in tutti i tempi: e tale si è il sentimento di quasi tutti gli antichi, e moderni autori. Per altro una tale sospensione, tanto commendata in tutte le loro Opere, non è già, come altri potrebbe intenderla, un' oziosa inazione; ma bensì una condotta illuminata, che tende ad aspettare, che la Natura dia il segno d' operare. La cosa non va così nelle infermità croniche, le quali con maggior frequenza richieggiono un trattamento variato, e perciò vogliono altresì la contezza di parecchi rimedj: imperciocchè fanno bene i Medici più esercitati, come i soccorsi, che sembrano i più dicevoli alla malattia, non corrispondono d' ordinario alle loro speranze, e che in più occasioni fa di mestieri tentare varie cose prima di rinvenire quella tale, che ci presenti la buona riuscita. In somma io mi son prefisso, sì per le prime, che per le seconde infermità, di porre sotto gli occhi d' un Pratico addestrato tutto quello, di cui egli può far uso. Non gli rimane, che il fissarsi per la scelta, e il regolare il tempo dell' applicazione: quando il soggetto, ch' io ho alle mani, lo comporta, io addito l' una, e l' altra di queste due cose: ma non è sempre possibile il farla, a cagione d' un' infinità di circostanze, che a mala pena si possono comprendere in quelle ope-
re

re, che si fissano a trattare d' una sola infermità .

Tale si è il piano di questo ristretto , il quale non è simile ad alcuno di quelli , che sono usciti alla luce finora . *Le mie proprie osservazioni , tanto Cliniche , che Anatomiche* , mi hanno , come già accennai , somministrato la materia principale ; nè sono ricorso a quelle degli altri , se non per render l' opera più compiuta ; non ho nemmeno creduto necessario il distinguerle : gl' intendenti non istenteranno a rintracciarne la ragione . Essi giudicheranno altresì , che essendomi prefisso di render questi volumi portatili , e di farvi entrare a un tempo stesso *tutta la Medicina* , non mi era possibile il dilatare viemaggiormente i miei articoli : nulladimeno per quanto possan parere concisi , io ho ragion di promettermi , che , se ne vengano eccettuate poche cose , i veri conoscitori vi rileveranno tutto quello , che è necessario per fargli pensare a qualunque cosa ; è questo è il mio unico fine : nè debbo tampoco temere di non averla indovinata , se mi è permesso giudicarne dall' uso quotidiano , ch' io ne fo . Non lascerò di dire in questo luogo , come i materiali da me impiegati ne' miei Articoli , peccano alcuna volta nell' ordine , e nella connessione , e che vi sono anche talvolta delle lacune considerabili . Agevole mi sarebbe stato lo schivare siffatte mancanze , qualora , come hanno fatto tanti Scrittori , io avessi voluto lavorare a norma , o delle mie , o delle loro idee : ma , io lo ripeto , non mi son prefisso altra legge , salvo quella di scriver l' istoria compendiata dei fatti , e non già quella delle opinioni . E chi non sa , che la prima è per anche molto imperfetta , e che si può racchiudere entro un breve spazio ; dove per lo contrario la seconda , sommamente dilatata , a grandissimo stento si potrebbe abbracciare

entro una ventina di volumi simili a questo . Ultimamente io dirò , come più inteso a quello , che può ampliare le nostre cognizioni , che alla scelta , e alla disposizione delle parole , ho sovente lasciato scorrere la mia penna : la chiarezza però delle mie espressioni compenserà per avventura la trascuratezza dello stile , e i difetti di lingua , che mi potessero essere scappati . Lo spaccio così spedito della prima Edizione non mi acquieta rispetto a ciò , non m'essendo ignoto , la stessa sorte esser toccata anche ad opere spregevolissime : ma non è lo stesso rispetto al giudizio vantaggioso , che ne hanno già fatto moltissimi Dotti , i quali prego ad accoglierne in questo luogo un picciol contrassegno della mia gratitudine .





COMPENDIO
DELLA
MEDICINA PRATICA

RISGUARDANTE LE MALATTIE INTERNE.

SEZIONE PRIMA.

*Le malattie generali, e quelle, che non hanno
alcuna sede determinata.*

LE FEBBRI.



Noto, che la Febbre, di cui mi si per-
metterà, ch'io lasci di dare la defini-
zione, si è la più comune di tutte le
infermità, e quella, della quale si è più
trattato, che di qualunque altra: eppu-
re, chi lo crederebbe, mai? Ella è per
avventura la meno manifestata, e la
maggior parte di coloro, che l'hanno

presa per soggetto delle loro Opere, non hanno, quasi
dissi, altro seguito, che le proprie idee, e le proprie
ipotesi. Nè io sono lontano dal pensare, ugualmente
che parecchi dotti Medici, che si stenterà grandemente
a diradare, e sgombrar questo Caos, se non si lascia da

un lato quasi tutto quello , che è stato scritto fino ai giorni nostri, e si cominci a lavorar del suo sopra l'Osservazione. Aspettando pertanto, che alcuno voglia abbracciare questa grande impresa, io mi farò a esporre in poche parole il piano, ch'io mi son diviso nella pratica, o sia il risultato di tutto ciò, che ho potuto osservare intorno a questa materia.

Nell'assistere agli ammalati non ho potuto rilevare, che sole quattro sorte di *febbre essenziale continua*, vale a dire, 1. *la continua semplice*, denominata da molti *continente*, come quella che vien supposta priva d'esacerbamento, lo che non è esattamente vero: la sua durata è incerta: ma ella non oltrepassa il giro di quattordici giorni, qualora ella non degeneri, a motivo d'un reo trattamento: 2. *la continua putrida* accompagnata da esacerbamenti, e da sintomi più gravi: sembra, che ella dipenda da una specie d'alterazione, o di putredine del sangue, e degli umori, e che tenda a un depuramento, più, o meno manifesto, che ne fa il carattere principale: 3. *l'ardente*, la quale viene bastantemente distinta dalle altre pel calore interno abbruciante, e per l'aridezza della bocca: 4. *la maligna*, i cui molto più gravi sintomi dipendono dall'azione de' nervi, e del cervello, nel che consiste il suo carattere essenziale: questa è d'ordinario più lunga delle altre, sovente epidemica, e contagiosa, ed alcuna volta pestilenziale.

Queste quattro specie di febbre, le quali hanno, a ben riflettervi, differenti gradi, si rassomigliano talvolta infra sè per ombre tanto impercettibili, che è sommamente malagevole il distinguerle: e quando si considera anche la poca distanza, che vi ha dall'una all'altra, uno sarebbe tentato a credere col *Boerhaave*, che essenzialmente non differisca, o, e che siano semplicemente gradi diversi d'una *stessa malattia*, che si presentano sotto varj aspetti. Trovasi un esempio molto urgente di varietà, di cui è suscettibile la febbre nell'esame delle epidemie, che compariscono sotto varie forme nel tempo medesimo, e nel medesimo luogo: sembra eziandio, che murino carattere, tuttochè si sappia benissimo, ch'esse non riconoscono se non una sola, e una medesima cagione, la quale possono modificare l'età, e il temperamento, ugualmente che un'infinità d'altre circostanze, ed accidenti. Si è osservato ancora molta *affinità fra le febbri continue, e le intermittenti*: gli

esacer-

esacerbamenti delle une, e gli accessi delle altre hanno un grandissimo rapporto, di pari che i lor periodi, e le loro crisi, ec.: oltre il non avervi cosa più comune nella pratica del vederli le continue cangiarsi in intermittenti, e queste degenerare in continue. Siasi però ciò che si voglia della loro differenza, io son d'avviso, che sia dicevole il considerarle disgiuntamente; e siffatta distinzione dee influire moltissimo anche nel trattamento.

S'egli è talvolta malagevole il distinguerle febbri *essenziali continue* infra esse, ed il trovare il lor punto di divisione; non è certamente meno difficile il confonderle con un grandissimo numero di *febbri sintomatiche*, che dagli Autori molto disacconciamente sono state messe a mazzo con le prime, sotto le denominazioni di *febbre resipelacea*, *infiammatoria*, *dissenterica*, *catarrale*, *reumatica*, *artritica*, *lattea*, *lochiale*, *cachetica*, *scurbutica*, e somiglianti. Non si esiterà a considerare come sintomatica la febbre, che accompagna il vajuolo, la rosolia, la roschezza scarlattina, la resipola, e le altre fioriture cutanee: come altresì l'infiammazione, la dissenteria, le flussioni, il reumatismo, la gotta, la formazione del latte, la soppressione de' lochj, o sia l'oppilazione, e finalmente i dolori, le contusioni, le piaghe, le scottature, ec. Ma non si distinguerà coll'evidenza medesima quella, che dipende dalla pletora, dalla cachessia, dal depravamento della bile, dallo scorbutico, dal mal franzese, dalle scrofole, dalle affezioni isteriche, ed ipocondriache, dal calor del sangue, dalla crappula, dalle materie putride, e verminose, che stanziano nelle prime vie: dalle ostruzioni, dalle suppurazioni, e cancrene interne, dalle soverchie evacuazioni, dalla soppressione delle medesime; dalle fioriture cutanee tornate indietro, dal latte sparso, e finalmente dalla spoffatezza dalle passioni d'animo, dal Sole, e somiglianti. Non vi ha pertanto cosa più rilevante del distinguer la febbre sintomatica, dipendente da un vizio locale, o da un'altra malattia, dalla febbre essenziale proveniente dal solo vizio del sangue, e degli umori: si fa par troppo, come ogni giorno vien presa l'una per l'altra. Io non mi fermo a considerare le conseguenze funeste, che venir possono da siffatti equivoci.

Non si sono gli Scrittori contentati di trasportar nella classe delle febbri ciò, che non è che il prodotto d'un'altra infermità, senza considerare, ch'e' bisognereb-

be formarne tante spezie, quante sono le malattie, dachè poche se ne conoscono, dalle quali non possa promuoversi la febbre: ma si sono altresì immaginati de' caratteri, ed hanno stampati dei nomi, cavati dal sintoma, che più faceva lor colpo. Di là appunto sono scaturite tutte quelle febbri chimeriche mentovate nel loro Scritti; vale a dire, *febris algida*, *epiala*, *typhiria*, *comatosa*, *phrenetica*, *sicculosa*, *sputatoria*, *isotans*, *singultuosa*, *famelica*, *anhelosa*, *anxiosa*, *syncopalis*, *vomitatoria*, *terminalis*, *cacatoria*, *sudatoria*, *uretica*, *colliquativa*, ec. Ma lasciamo da un lato tutte queste sciocchezze, e passiamo a ragionare di più rilevanti difficoltà. Incontransi queste nell'esame d'un numero grande di febbri, le quali non hanno carattere, e che non possono riferirsi ad alcuna, nè delle essenziali, nè delle sintomatiche pochi anni noverate.

Non ignorano i Pratici, che le continue, come le intermittenti, hanno bene spesso nel principio loro un corso irregolare (*febres nondum typicae*) in tal caso si dee sospendere il proprio giudizio, qualora non ci ajuti l'epidemia dominante. Simiglianti spezie di sviamenti della natura sono comunissime in quasi tutte le infermità, ma principalmente nelle febbri, soprattutto nelle maligne, delle quali con frequenza non si può rilevare il carattere prima dei sette primi giorni, ed anche più tardi. Segue eziandio assai comunemente, che il cattivo governo, o un malinteso trattamento sovverta l'ordine, che si osserva nel corso ordinario delle malattie; e da un tale disordine risultano delle febbri tanto continue, che intermittenti, le quali degenerano (*febres corruptae*) si dilungano queste dalla lor carriera nota, e fanno sì anche più pericolose, col prendere un aspetto di malignità. Io ho più fiate osservato, come la molteplicità dei rimedj faceva strada a siffatto cambiamento funesto; ha fatto il Sydenham l'osservazione medesima: al tempo suo, come si fa pur oggi, s'ascriveva la durata di queste febbri allo Scorbuto. Lasciamo questi odiosi ripieghi a coloro, che sonosi arrogati il diritto d'ingannare il Pubblico.

Tutte le difficoltà divisate sono anche leggiera cosa in confronto di quelle, che presentano le febbri complicate (*febres complicatae*) nè vi è per avventura, che il giudizio, e la sagacità, che ne possano trionfare. Le continue, e le intermittenti, le essenziali, e le sintoma-

tomatiche, le acute, e le lente, si mescolano insieme, e colla loro combinazione vengono a formare delle malattie, che non si posson ridurre sotto alcuna classe, e che sonb per li Medici, eziandio i più sperimentati, scogli tali, ai quali va a naufragare assai spesso tutto il loro sapere. In questi casi, i quali par, che permettano a ciascuno di seguir quelle tracce, che inspiragli il proprio genio, potrebbe altri servirsi molto utilmente d'una buona pittura di malattie, la quale porrebbe sotto gli occhi, in un ordine ben digerito, tutte le affezioni, che aver possono del rapporto a quelle, che si debbon trattare; indarno altri si fiderebbe alla propria memoria: imperciocchè, e chi non ha cento volte provato, che allora tradisce, e massimamente coloro, che non hanno saputo coltivarla?

E' noto, le febbri essere accompagnate da numero grande di sintomi, che rendono più, o meno pericolose, e che da questa sorgente si è attinta la dottrina delle *predizioni*, esposta con non minore ampiezza, che confusione negli Scritti, che vengono attribuiti a *Ippocrate*: dottrina presentataci dall' *Alpino* fedelissimamente con tutte le sue incertezze. Questa c' insegna, che un tal segnale è buono, o reo, secondo che viene accompagnato da buoni, o da tristi sintomi: vale a dire, che quando un movimento, qualunque siasi, della natura solleva, o guarisce, si può francamente pronunziare, esser buono, e che è reo, allorchè il male s'aggrava: è questo a un di presso il risultato della maggior parte delle cognizioni, che i più illuminati ritrar possono in tal soggetto dalla lettura d' *Ippocrate*, e di tutti i suoi Comentatori. Oltredichè fa egli di mestieri l'aver molto studiato, per sapere, che il sopimento, l'abbagliamento della vista, il delirio, le convulsioni, il tremore, l'estrema stanchezza, le ansietà, gli svenimenti, il sudor freddo, l'oppressione, il rilasciamento, il polso debole e intermittente; in una parola, i sintomi tutti, che riconoscono l'intacco del polmone, del cuore, e del cervello, sono perpetuamente pericolosi? Rispetto agli altri, ci saremo noi di vantaggio inoltrati, quando sapremo, che l'emoragia, la cefalalgia, la vigilia, la sordità, la sete, il salivamento, la svogliatezza, il vomito, i varj flussi del ventre, i sudori d'ogni specie, le varietà, che osservansi nelle orine, e tanti altri accidenti, posson esser buoni, indifferenti, o rei, secondo
la

la concorrenza degli altri sintomi? Questa materia pertanto addimanda una maggiore estensione; ed io la racchiuderò entro alcuni Articoli.

La *faccia*, e la *bocca* sono le prime parti, che sottopongonfi all'esame d'un Pratico: l'ispezione della prima in tutte le infermità, ma singolarmente nelle febbri, è d'un importanza somma: è noto, come si dee tanto più temere, che si allontanano dal suo stato naturale; ma vi si scuoprono tante, e tante cose, che è quasi impossibile il rilevarle tutte: il solo lungo uso può farci acquistare sopra di ciò molte cognizioni, le quali sono tanto più preziose, quanto sono meno comuni. Si sa, che il naso affilato, gli occhi incavati, le tempie concave, l'aridezza, e il color pallido, e piombino della cute, costituiscono ciò, che addimandasi *faccia ippocratica*, che è, soprattutto nei primi giorni della malattia, quasi sempre un segno mortale. Il *viso* infiammato, la pulsazione violenta delle carotidi, gli occhi rossi, e scintillanti, lo sguardo fisso, e truce sono d'ordinario i forieri del delirio, e talvolta dell'emorragia. Il timore della luce, fuori del caso della rosolia, e del vaiuolo, gli occhi immobili, smorti, e foschi, la convulsione dei medesimi, l'indebolimento, o la perdita della vista, gli occhi in dormendo mezzi aperti, debbono dare molta inquietudine rispetto all'evento: e sono sovente segno di morte in circostanze ree le lagrime involontarie. Le guance rubiconde nelle malattie acute precedono il raddoppiamento, o dimostrano il cattivo stato del petto: è noto quanto sia da temersi questa roschezza nei giovani di petto delicato: lo sconcerto, che attacca il polmone, si manifesta dal moto delle ale del *naso*. La gonfiezza del volto, sì comune nelle malattie acute, rade volte è pericolosa; ma fa temere la lunghezza dell'infermità. La spezie di rognia, che comparisce bene spesso intorno alle *labbra*, e al *naso* predice il fine della febbre. La *sete* estrema, ed il contrario sono ugualmente pericolosi; e dee anche far temer di vantaggio nelle febbri ardenti il suo istantaneo cessamento. Le *asie* livide, e nere, e la *difficoltà a' inghiottire* sono altresì pessimi sintomi. La lingua arsa, e abbruciata, coperta d'una crosta nericia, manifesta un male gravissimo. La *salivazione* non annunzia reo evento: ella è altresì vantaggiosa nel vaiuolo, ed in alcune febbri epidemiche. Il digrignar convulsivo dei *denti*, ed il loro scoppiamento, assai spiate sono

abituale, ed eccitano dei falsi timori in quei tali, che non ne sono instrutti.

Non vi è bisogno di suggerire, che i violenti mali di testa, e continui, la *vigilia* ostinata, il *delirio*, l'*assopimento*, la perdita della memoria, e delle cognizioni, le *convulsioni*, lo storcimento degli occhi, il tremolar delle labbra, l'indolentramento di tutte le parti, il moto involontario delle mani, che pare, che uniscano alcuna cosa, e somiglianti, fanno quasi sempre un tristo presagio: ciò non ostante altri non dee farsi gran paura del delirio, delle convulsioni, e del tremolio, allorchè il polso è sviluppato, e regolare. L'afezione *comatosa*, che succede al delirio, è più d'ogni altro da temersi: si può proferire la sentenza stessa delle convulsioni risvegliate dalle perdite soverchie. L'*emorragia del naso* è il più delle volte proficua: osserviamo tutto dì, che solleva grandemente la testa; ma la più salutare non trascende giammai il valore di due, o di tre giutte cavate di sangue: e gli addestrati Pratici fanno, esser la medesima d'ordinario mortale, qualora oltrepassa il divisato confine: lo che dovrebbero aver considerato i partigiani delle frequenti cavate di sangue. Il *tinnito delle orecchie* non è pericoloso: nè più si dee temere della sordità, sintoma familiarissimo alle febbri maligne, massime se sopraggiunge nel tempo del rilasciamento: ma la cosa è tutt' all' opposto del dolore, che si fa talvolta sentire con somma intensione nell'organo stesso.

Dall'esame della testa si procede a quello del petto. La voce estinta, o tremolante, il *respiro faticoso*, e *tronco*, il *rantolo*, il *singhiozzo*, le ansietà, o quelle crudeli inquietudini, che indarno si tenta di calmar col mutar situazione, son rei segni: fa d'uopo l'eccettuarne l'*oppressione*, o il ferramento del petto, che precede alcune Crisi, come la fioritura del vajuolo, della rosolia, e d'alcune altre efflorescenze, o pustole cutanee, che si posson considerare come critici moti. Il polso, il quale risguarda anche più il petto, che le altre parti, è l'oggetto principale delle nostre ricerche: è questo, come ognun sa, la bussola dei Medici: non è da dubitarsi, che dalle sue varietà non se ne possano cavare delle grandi cognizioni: ma è altresì cosa certissima, pochissime persone esser capaci d'osservarle. Ci può il polso far conoscere il grado della febbre, e quello delle forze, come anche lo stato dei solidi: e que-

ste

ste tali cognizioni combinate devono influire sopra il prognostico.

Il polso pieno, e sviluppato: il regolare per rapporto all'intervallo delle pulsazioni: l'eguale, le cui percosse sono somigliantissime; e finalmente l'arteria arrendevole, e flessibile danno (in più gradi di frequenza, e prestezza) grandi speranze di guarigione. Per lo contrario il polso picciolo, e serrato, l'irregolare, e illudugale, finalmente l'arteria tesa, manifestano la violenza della malattia. Il debole, il concentrato, e l'intermittente, danno perpetuamente da temere; non lo dà punto meno il convulsivo, massime quando le pulsazioni sono sì frequenti, che vengono a formare sotto le dita una specie d'undulazione. Temonsi altresì i polsi, la cui lentezza non corrisponde alla violenza del male, come si vede seguire nella maggior parte delle febbri maligne. Si è fatta osservazione, che i raddoppiamenti, che non hanno alcuna regola, come quelli, che ritornano ogni due giorni, non sono di rea conseguenza: ma si temono per lo contrario quelli, che si fanno vedere ogni giorno, massime quando il ritorno previene la fine di quello, che lo precede. Se l'esacerbamento non torna che il quarto giorno, noi dobbiamo aspettarci una lunga malattia; e questa osservazione scuopre eziandio il rapporto, che vi è fra la febbre continua, e l'intermittente. Aggiungerò in questo luogo, come i *sopraalti tendini* (*subfultus tendinum*) che si fanno sentire al collo del braccio, allorchè non sono abituali, ci presagiscono una grave infermità. Si giudica altresì, in toccando il polso, dell'aridezza, e del calore della cute, donde si possono cavare molte cognizioni; come ancora della freddezza delle estremità, la quale, se si eccettui il tempo dei rigori di freddo, è perpetuamente di pessimo augurio. Finalmente si dee grandemente temere per quelli, che ritirano la mano, quando toccasi loro il polso, oppure, che lo hanno tremolante.

Somministra di pari ampia materia alle nostre osservazioni il basso ventre: il gonfiamento, e la prominente degli *ipocondi*, e di tutto il *basso ventre*, è nelle febbri un sintoma assai familiare, e da non temersi grandemente; ma non se ne dee giudicar così perpetuamente: imperciocchè se la tensione è dolorosa, o estrema, vi è poca speranza. Il vomito sul principio delle malattie è vantaggioso; ma non è lo stesso negli altri periodi

massi-

massime quando non cede nè agli emetici, nè ai purganti: rade volte egli è critico: quello delle materie ghiarse, e biliose è buono in tutti i tempi: ma le materie nere, e fetenti minacciano la vita degli ammalati. Temono eziandio i Pratici l'ecceffivo *corso del ventre*, gli scarichi spontanei, sierosi, spumosi, oleosi, verminosi, sanguigni, i neri, e gli estremamente fetenti: nulladimeno si è osservato affai fiate, come la diarrea sollevava grandemente la testa. Per ciò, che concerne le orine, le soverchio abbondanti, le ardenti, le sanguigne, singolarmente nel vajuolo, le viscosi, e le nere non presagiscono cosa buona: la loro soppressione, ed il loro scolo involontario annunziano una grave malattia. Se le orine sono ardenti nel principio d'una febbre acuta, ci dobbiamo promettere una corta malattia, ma l'evento della medesima molto incerto: temonsi molto le palide, e le acquose nel caso d'intacco del cervello. L'orine cariche di maniera varia nel tempo della concezione, ci presagiscono bene i cambiamenti, che vi seguono in un altro tempo, e meritano altresì d'essere osservati: ma dee altri guardarsi dal cavarne alcun pronostico, s'e' non si vuol esser presi per ciarlatani dalle persone, che fanno il fatto loro in siffate materie.

Dei sudori febbrili può asserirsi, essere con più frequenza critici, che sintomatici: questi terminano più, o meno sensibilmente la maggior parte delle febbri; e si è osservato, come i periodi, ove questi mancano, sono i più ribelli: per altro i sudori trasmodanti, massime nel principio delle infermità, i continui, quei che si fermano a una parte del corpo, che diremmo parziali, i collosi, i fetenti, e quei, che più si dilungano dallo stato lor naturale, non meno per rispetto al colore, e all'odore, che rispetto alla consistenza, sono sempre mai pericolosi, e rei. Non si ritrae molto lume dalle *tacche*, e dalle *fioriture* sintomatiche della cute: le stesse *petecchie*, secondo il sentimento de' migliori Pratici, non rendono più terribile la malattia. Abbiamo già detto, come i sudori freddi, singolarmente se non occupano, che il solo volto, sono bene speso mortali. I rigori, che vanno innanzi alla febbre, o che annunziano il raddoppiamento, non sono da temersi, massime s'e' sieno proportionati al grado di calore, che vien loro dietro: i rigori lunghi ci danno indizio bene spesso di lunga infermità: si temono quelli, che si manifestano dopo il

sudore , ugualmente che gl' irregolari , che sono d' ordinario i forieri del delirio , o d' alcun altro tristo accidente , ed eziandio della morte : ognun sa , che i frequenti accessi dei rigori fanno temere una suppurazione interna . Non parliamo in questo luogo dei rigori di freddo , che nascono da una cagione esterna , nè di quelli , che accompagnano le affezioni isteriche , ed ipochondriache , il marasmo , e le altre malattie di languore .

Si sa , che i *dolori* vaghi , quei della testa , del dorso , dei lombi , e delle altre parti , che non riconoscono alcun vizio locale , sono sintomi comuni alle febbri tutte , e sopra i quali non si fonda alcun pronostico . Non è la cosa medesima però di quelli , che dipendono dall' ingorgamento , dalla flogosi , dalla suppurazione , dalla cancrena , e somiglianti . Non vi ha cosa da temere tanto , quanto il cessamento istantaneo dei gran dolori interni nelle febbri , come quello , che ci dinota la mortificazione della parte . Non si debbono ascrivere alla febbre i dolori , che le sono forestieri , come quei del vajuolo , gli scorbutici , i reumatici , ec. In questo luogo io debbo far osservare , rispetto ai sintomi febrili , de' quali ho ragionato , come non debbono , pel maggior numero , porre alcuna mutazione nel trattare la malattia ; ma che fra gli altri se ne trovano molti , che obbligano a variarlo , ed alcuni , che vogliono assolutamente un trattamento particolare : ella non è nella Pratica una delle leggiere difficoltà questa ed è necessario molto lume , e grande esperienza , per saper prendere sopra di ciò un buon partito . Fo di meno di favellare in questo luogo di parecchi particolari , che non risguardano , che alcuni speciali casi , e che hanno all' trove il luogo loro .

Molti fenomeni febrili , de' quali abbiamo parlato , per quanto possano parer violenti , ci annunziano ben spesso la *crisi* , oppure la costituiscono , ponendo felicemente fine alle più gravi malattie . Non vi ha quasi febbre , chechè se ne dicano i moderni , che non possa terminarsi per una crisi , o se si vuole , per una specie di depuramento più , o meno manifesto , che segue comunemente , allorchè il male si trova nel suo ultimo periodo , e che è anche preceduta da un' agitazione talvolta violenta , alla quale si ha quasi sempre l' imprudenza d' opporre i più gran rimedj ; di modo che non è maraviglia , che il malato soccomba , non meno sotto gli sfor-

sforzi della Natura, che sotto le violenze dell'Arte. I sudori, che dileguano, come abbiamo detto, quasi tutte le febbri, lo spettoramento, l'emorragia, e le altre perdite di sangue, e il vomito, il corso del ventre, le orine torbide, più, o meno cariche, i tumori, come gli abscessi, i bubboni, le parotidi, e i carbonchi, le fioriture cutanee, e somiglianti, sono i mezzi ordinarij, di cui serve la Natura per dileguare le più gravi infermità: se questi sono imperfetti, le malattie vengono a prolungarsi, e fanno eziandio mortali. La *dottrina dei giorni critici*, stabilita da *Ippocrate* meglio che da alcuno de' suoi successori, passa ai giorni nostri, malgrado la singolar venerazione, che si ha per questo Antico, per piena d'incertezza, e d'oscurità. Non bisogna maravigliarsene, poichè dopo che si è lasciata da un lato l'osservazione, si sovvertono, se mi è lecito il così esprimermi, i movimenti della Natura, e si attraversa l'ordine delle operazioni, che tendono alla guarigione degli ammalati.

I *giorni critici*, secondo *Ippocrate*, sono il quarto della malattia, il settimo, l'undecimo, il decimoquarto, il decimosettimo: si vede, esser sottoposti con molta esattezza al numero settenario, o demisettenario, e non già al conteggio superstizioso dei numeri di *Pittagora*, come da certuni è stato preteso. Osservasi ogni giorno, malgrado la prava condotta, che si tiene il più delle volte, come molte febbri finiscono il quarto, il settimo, l'undecimo, il decimoquarto, ec. o colla guarigione, o colla morte. Quei periodi d'una mezza settimana, che colpiscono gli osservatori meno attenti, fanno bastantemente conoscere la giustezza delle osservazioni Ippocratiche, avvegnachè inoltrava questo Autore il conteggio diviso fino ai quarantadue giorni, termine della giusta rivoluzione di dodici periodi alternativi di tre, e di quattro giorni. Si sa, che le febbri terzane non oltrepassano di molto il settimo accesso: che le febbri infiammatorie terminano d'ordinario in quattro, o in sette giorni. La peripneumonia finisce talvolta collo scioglimento il quarto giorno, ovvero allora la suppurazione si stabilisce, e la malattia termina il settimo, ovvero si prolunga fino al decimoquarto, ed anche fino al vigesimo primo. La febbre scarlattina, la resipelacea, e quella della rosolia, non oltrepassano per lo più il settimo giorno. Il vajuolo si manifesta con più frequenza dal terzo al quarto, e suppara nel settimo. Pieni sono

i nostri Libri dell' Istoria delle febbri epidemiche , che son terminate nel settimo col sudore: si è finalmente osservato , per non parlare d'un' infinità d'altri esempi , come l'epilessia dei bambini durava sette mesi , o sett'anni . Oltre le varietà però , e le eccezioni , che può soffrire questa regola , è necessario il fare osservare , come si stenta a farne l'applicazione a molte infermità , il cui principio è sommamente equivoco ; di modo che bene spesso si corre pericolo di sbagliare il termine , da cui convien partire , e per conseguente di malamente calcolare .

Sembra pertanto evidente , che la Natura segua una spezie di regola nella carriera , e nei periodi della maggior parte delle malattie ; regola , cui tanto più importa il conoscere , quanto che è necessario il conformarvisi , vale a dire , che le abbisogna un dato numero di giorni per domare la materia ignota , la quale è piaciuto agli uomini di chiamare *morbifica* . A questo stesso lavoro della Natura hanno gli antichi assegnata la vaga denominazione di *concozione*: termine , che offende le orecchie dei moderni , e che , se si vuole , sarà male applicato , ma di cui forza è servirsi , come della moneta corrente . Del rimanente non bisogna pensare , che il tempo contrassegnato per le crisi , preparate sempremai dalla concozione , sia invariabile: il clima , la stagione , l'età , il temperamento , il trattamento della malattia , e infinite altre circostanze , possono estenderlo , o accorciarlo : può anche succedere , che indarno si aspetti la crisi , sia che ella segua in guisa impercettibile , sia che assolutamente ella non si faccia ; ma ciò non impedisce , che non si debba evitare d'amministrare de' gran rimedj nei giorni critici : gli stessi moderni , che si sono più manifestamente dichiarati contrarj a questa dottrina , non lasciano peranche di rispettare il settimo giorno . Si può vedere il risultato di tutto ciò , che è stato scritto in questo soggetto nella dottissima Dissertazione , di cui M. *Bordeau* ha arricchito l'Enciclopedia .

Dopo quello , che abbiamo detto è agevole il giudicare , che il *trattamento delle febbri* esser dee semplicissimo : non vi è chi non sappia , che le cavate di sangue , gli emetici , i purganti , gli emollienti , i rinfrescanti , i temperanti , gli antiputridi , i diaforetici , e i calmanti , sono i rimedj più dicevoli , e i più impiegati ; ma non è sempre permesso il farne uso , avvegnachè possano esser

per-

perniciosi, quando non operano di conserva colla Natura. Ippocrate ci raccomanda l'entrare nelle sue mire, e ce ne fa un precetto: *Quo Natura vergit, eo ducere oportet*. Sembra non esservi cosa, che meglio favorisca i suoi salutari movimenti, della più severa Dieta; io voglio dire l'acqua, oppure ogni altra leggiera bevanda, presa per tre, o quattro giorni per intiero nutrimento: questo allettante, che può servire in luogo di molti altri rimedj, e che dà meno da temere, non lascia, quando si ha timore d'una grave malattia d'evacuare le prime vie, dopo aver fatto precedere una, o due cavate di sangue. Possonsi per tali mezzi troncate molte malattie, le quali, condotte secondo altro metodo, qualunque siasi, sarebbero riuscite lunghissime, e pericolose: s'è non s'ottiene tal prezioso vantaggio, per lo meno si diminuisce la violenza del male, e per conseguente il pericolo. Io non credo, che si possa obbiettare cosa alcuna ragionevole contra siffatto metodo, salvo nel caso d'un estremo spostamento: tanto più, che non ve ne ha un solo, eziandio fra i più seguitati, che non vada soggetto a varie censure. Pel rimanente io non ne giudico sulle apparenze: la più lunga, e la meno equivoca esperienza è quella, che mi ha insegnato, il maggior numero di febbri, e d'altre acute infermità poter essere con somma felicità trattate in questa guisa.

Tutte le febbri non richieggono cavate di sangue: queste sono sovente inutili, ed alcuna volta dannose: ce ne hanno avvertito i più assennati osservatori; ma non ci hanno sempre insegnato a distinguere i casi, ne' quali bisogna astenersene; e noi ci troviamo, quasi dissi, ridotti sopra di ciò, a ritrarre, come hanno fatto essi stessi, questa preziosa cognizione dai nostri proprj falli. Non vi ha dubbio, che le febbri infiammatorie non sieno quelle, che più ne richiedono; eppure le stesse cavate di sangue sono alle medesime talvolta contrarie, siccome P *Huxham*, e parecchi altri Autori lo hanno osservato in alcune epidemie. Dobbiamo aggiungere, che il tempo delle cavate di sangue è limitato ai tre, o quattro giorni dell'infermità, e che dopo questa epoca non si dee prometterse cosa alcuna, se non è in tali casi gravi, che ci si offrono molto di rado, e che per conseguenza non potrebbero servir di pretesto a coloro, che par che si facciano giuoco di fare spargere il sangue.

Dopo le cavate di sangue, allorchè vengono giudicate,

te necessarie, gli *emetici*, e i *purganti* sono i rimedj più usati: sono questi d'ordinario d'una grande efficacia, se si prescrivono nel decorso del primo, o del secondo giorno dell' invasion della febbre: ma non ne segue lo stesso nel corso della malattia: allora non producono buoni effetti, se non se nel fine della concozione, o nel tempo del rilasciamento: *concocta medicari oportet, non cruda*, dicono gli Antichi tutti dopo Ippocrate. Essi non ci hanno raccomandato d'aspettare il divisato tempo, se non dopo esserne stati ammaestrati da una lunga esperienza: e gli sconcerti, che si risvegliano alla giornata dai purganti, e da altri stimolanti, nel tempo che la Natura opera, giustificano pur troppo la condotta di quei primi Maestri. I falli, che si commettono con tanta familiarità nel far uso dei *purganti*, non nascono se non dal confondere i due oggetti, che si possono avere nell'amministrargli: il primo si è d'evacuare i rei succhi, la bile, e le materie putride, che stanziano nelle prime vie, e che, passando nella massa del sangue, non lasciano di render la febbre più terribile, e più ostinata: con questa mira non dee si perdere un momento, avvegnachè l'evacuazione più salutare è la più pronta. Il secondo oggetto è di secondare l'espulsione della materia morbifica, mescolata col sangue, e con gli umori, di cui lo sfogo più naturale si è il condotto intestinale: ma questa materia esser dee disimpegnata prima delle altre sostanze, e questo è il frutto della concozione: gli organi debbon esser preparati, e disposti alla sua uscita: nè si dee ciò prometter si, che dal rilasciamento. E' agevole il concepire, che in queste circostanze la natura trovasi disposta a secondare l'azione dei purganti; ma se altri tenta di farne uso prima di questo termine, farà ciò indarno; oppure, lo che è più trista cosa, si risvegliano delle tempeste, che poi si mettono a carico della malattia. E come mai non si attraverserebbero, per mezzo di tanti rimedj inutili, e perniciosi i salutari movimenti della Natura? S'interrompono le sue operazioni: se ne pervertono gli effetti, e si spiana la via a delle catastrofe più funeste: è veramente cosa sorprendente, che queste non facciano aprire gli occhi a tanti temerarij, i quali ogni giorno, per motivi, ch'io temo d'esaminare a fondo, fanno un abuso così strano, non meno di cavate di sangue, che di purganti, e d'altri rimedj. L'*Osmanno*, e parecchi altri buoni Scrittori si sono scaglia-

ti con veemenza contro un cotal metodo , introdotto , come è noto , da alcune persone ardite , che hanno voluto acquistar fama infra i Medici per mezzo di questa pretesa riforma : quei tali , che hanno letto a dovere i buoni Autori , fanno benissimo , che hanno riprovato la *moltiplicità dei rimedj* , e che molti anche hanno pronunziato , che si potrebbero guarire con minor pericolo tutte le infermità acute colla sola bevanda , e la dieta : fanno altresì , come *Ippocrate* non trattava i suoi ammalati , che col *Governo* : che l'*Etmullero* per lo spazio di più giorni non permetteva ai suoi , che la semplice bevanda . Il *Sydenham* , sommamente abile a giudicarne , pretendeva , che si dovesse accagionare i rimedj dati fuor di tempo della maggior parte delle più gravi malattie . Il *Baglivi* esclamava contro l'abuso , che se ne faceva , al tempo suo , ed accertava , che la maggior parte dei sintomi più formidabili , che si addossano alle malattie acute , debbono imputarsi ai rimedj . Il *Ramazzini* avea osservato in parecchie Epidemie , come non si salvavano , che quasi quei soli , che non facevan uso di Medicine . La stessa osservazione fece il *Santorio* rispetto alla Pessilenza . Finalmente il *Lobb* , per non far quì una lunga filastrocca di citazioni , avendo conosciuto fino a qual segno si faceva abuso dei rimedj , ha dato in un eccesso contrario , col pretendere di bandire dalla Medicina , non solo le cavate di sangue , ma eziandio gli emetici , ed i purganti .

FEBBRE CONTINUA SEMPLICE.

Si dà a questa febbre la denominazione di *sinoca* non putrida , d'*efemera* , di *continente* , ec. Abbiamo detto , che da certuni veniva considerata pel primo grado della febbre putrida : ella non porta tuttavia alcun segnale di putrefazione , nè vi si scuopre alcun indizio di concozione , tuttochè ella finisca bene spesso per una specie di crisi , ma che non è annunciata , come lo è nell' altre febbri . Chiamasi *efemera* , quando termina in 24. ore , o che dura alcuni giorni : ella è nota in alcune Provincie Meridionali di Francia sotto il nome d' *infreddatura* , alla quale sono soggetti i giovani . La febbre *continente* , la quale , secondo l'idea degli Antichi , non ha nè remittenza , nè esacerbamento , non esiste rigorosamente parlando , se non se nei Libri .

La febbre continua semplice , che investe d' ordinario le

persone sane, e vigorose, non è facile a distinguersi dalle altre febbri, per esser somigliantissimi bene spesso i principj delle une, e delle altre. *Ippocrate* credeva eziandio, che allora fosse quasi impossibile il distinguerle: *Galeno* per lo contrario pretendeva, che altri non vi si dovesse ingannare: quanto a me, io non son lontano dal credere, che nè l'uno, nè l'altro avesse ragione. Nulladimeno la lontananza dei sintomi gravi, le remittenze, e gli esacerbamenti poco rilevanti, ne fanno il principal carattere: fa di mestieri aggiungervi la sua durata più corta, che nelle febbri, non essendo che d'uno, o più giorni, nè stendendosi comunemente oltre il settimo, e di radissimo fino al decimoquarto. Tutto questo però non fa, che non vi sieno molte difficoltà per conoscerla: la sola cosa, che mi è sembrato, che la distingua meglio dalle altre febbri, si è, che non vien preceduta dal disgusto, dalle stanchezze, e dagli altri forieri delle febbri putride, ardenti, e maligne: siffatto avvertimento, che è del *Loennio*, mi è stato quasi sempre proficuo. La sua durata, oltre il non permettere, che si pronunzi, se non quando il male è passato, è pure un indizio somamente incerto, sendovi molti accessi di febbri intermittenti, le quali, rispetto a questo punto, sono somigliantissime alla febbre efemera: tuttavia il fine loro non è lo stesso: il cessamento della febbre efemera è quasi momentaneo, o totale in cortissimo tempo: dove per lo contrario l'accesso dell'intermittente termina sempre mai insensibilmente, anche dopo il sudore. Questa osservazione, che fu il primo a fare *Galeno*, è buona, sebbene ella non è perpetuamente sicura. E' altresì agevolissimo il confondere certe febbri sintomatiche con quelle, di cui ragioniamo: quelle hanno sovente la stessa carriera, e sono d'una stessa durata; e allora è necessaria molta sagacità, e attenzione per uscirne bene.

La febbre, che è il soggetto di questo Articolo, vien d'ordinario preceduta da un lieve rigor di freddo: il calore, che ne succede, è talvolta intensissimo nei giovani; il polso è regolare, e sciolto. Il mal di testa, le stanchezze, i dolori ai lombi, ed altri erranti, sono i suoi sintomi ordinarij; ella è alcuna fiata accompagnata da fioriture militarij, o da scottature, e si dilegua il più delle volte, ora per sudore, ora per una emorragia. Le passioni d'animo, le vigilie, le soverchie fatiche, il sole ardente, l'eccessivo freddo, e le altre intemperie dell'aria,

aria, la crapula, di pari che l'astinenza soverchia, la cagionano. E' familiare nei giovani, e in quei tali, che vivono negli agj, e alla spensierata. Ha osservato il *Foresti*, che vi erano sottoposte le Persone Ecclesiastiche, dai Prelati facendoci fino ai Frati. Siffatte cognizioni, com' altri può concepire, possono entrare nel diagnostico di questa malattia, la quale per se stessa non dee far paura, ma che si può bene far degenerare pel modo reo di trattarla in una più terribile. E' questo uno dei casi, in cui la Medicina, senza poter giovare, può cagionare molto male. Poco ci vorrebbe a provarlo con parecchi esempj.

Da ciò, che detto abbiamo risulta, che questa febbre non vuole, quasi dissi, rimedj. Rade sono quelle volte, che nel principio abbisogni una *cavata di sangue*, e un vomitorio; nulladimeno non si potrebbero biasimare quei tali, che applicano ambi questi rimedj, allorchè nascono loro dei dubbj rispetto al carattere dell' infermità, purchè se ne eccettuino i casi d'astinenza, e di spossamento. La soia dieta, gli *attentanti*, e gli *addolcenti*, d'ordinario fan quanto basta: possono talvolta amministrar dei *leggieri diaforetici*, massime allorchè la traspirazione è stata troncata. Si pongono altresì in uso molto familiarmente gli *attemperanti*, i *refrigeranti*, e i *nitrosi*; ma questi ultimi possono esser nocevoli, quando vi è della disposizione a sudare. Bisogna aver l'attenzione di tenere il ventre libero; ma non dannosi per lo più dei purganti che verso il termine della malattia, nè tampoco son questi sempre necessari. Accade ogni giorno, che venga una tal malattia trattata con delle *numerosc cavate di sangue*, o con altri *rimedj grandi*, e che a un tempo stesso la Natura resista al male, ed ai capricci dell' arte: coloro, i quali, per mezzo della loro condotta, di pari che con li loro discorsi, avevano fatto supporre una lunga infermità, rimangono un poco sconcertati nel vederla svanire in tre, o in quattro giorni: ma tutto questo non fa, che non abbiano la sfacciataggine d'ascrivere al pravo lor metodo la buona riuscita.

F E B B R E P U T R I D A.

Denominano gli Antichi questa febbre sinoca putrida; ma l'idea, che i medesimi se ne facevano, è sì confusa, che altri può far di meno di rilevar ciò, che dicono intorno ad essa, senza temere di perdervi gran fatto. La *depravazione degli umori*, che mostra di tender

dere all'alcalescenza, e che termina per mezzo d'una depurazione più, o meno manifesta, ne fa il carattere principale: su questo punto di vista il *Sydenham* denominolla *febbre depuratoria*: ma la sua descrizione non sembra bastantemente generale, sendosi limitato ad alcune epidemie.

Il termine di putrida da noi adottato per non introdurre un linguaggio nuovo, non dee esser preso a rigore: non significa una vera putrefazione, come se lo persuadono certuni fra i moderni, che ne giudicano dal fetor dei sudori, delle orine, e delle fecce, che rendono per lo più gli ammalati: questo fetore, che ha fatto specie, è ancora più osservabile nelle febbri maligne: ma non potrebbesi mai considerare per un segnale di corrompimento. Alcuni suppongono, che facciasi nei vasi una suppurazione, della quale pretendono di vedere il segno nelle orine, o negli sputi: altri hanno immaginato un getto, o fonditura putrida del sangue, fondati dall'alterazione, che prova questo liquido tratto nella flebotomia, oppure sopra le frequenti emorragie, che accompagnano il male.

Sarebbe veramente cosa affai singolare, che quegli infermi, nei quali sonosi osservati i segni più perfetti di questo *preteso corrompimento*, non solamente potessero risanarne, ma ricovrare eziandio in brevissimo tempo la sanità più perfetta. Quante persone per altra parte hanno il fiato così puzzolento, che altri non ardisce d'accostarfi loro, ed altre, i cui sudori, e la cui traspirazione fetono a segno, che si stenta a soffrirle, e che malgrado ciò godono la miglior salute del mondo? Si avrà egli fronte di dire in tal circostanza, che il costoro sangue è corrotto? Quante sostanze non veggiamo noi fra i vegetabili, gli animali, e i minerali, che spirano di lor natura odori ributtantissimi? Perchè i liquori viventi animali non potranno prendere questo carattere, indipendentemente dalla putrefazione, i cui effetti si sa, essere la distruzione totale della sostanza mescolata, senza ricovramento? Ve ne sono anche di quelli, che riguardano la cancrena, che bene spesso accompagna la febbre, di cui ragioniamo, di pari che le maligne, come una prova della putrefazione, che vi si suppone: ella sarebbe, secondo me, cosa molto straordinaria, prendendo la cancrena per una vera putrefazione, che il freddo, il quale si sa, essere il maggior preservativo della corruzione, vi facesse cadere, quasi instan-

stantaneamente, delle intiere membra, siccome talvolta veggiamo accadere.

Tuttavia non si potrebbe negare, come osserva il celebre *Van-Swieten*, che i liquori depravati di quelle persone, che sono investite dalla febbre putrida, non sieno più disposti al corrompimento, quando verranno privati del calor vitale, di pari che le parti cancrenate, o sfacelate. Si sa, che l'orina, che rendono gl'infermi nella febbre putrida, si corrompe agevolmente; che il sangue stesso, che si cava dalle lor vene, soccombe poco tempo dopo tratto allo stesso cambiamento: il *Baillon* pretende eziandio d'avervi scoperto, un'ora dopo l'emissione, un formicolamento di vermi. Si può aggiungere a quello, che abbiamo detto, che i cadaveri di coloro, che avevano questo male, spandono talvolta un'infezione, che non permette l'approssimarvisi: ma questa disposizione al corrompimento è comune a infiniti altri morbi; e ne possono fare una buona testimonianza gli Anatomici.

Del rimanente il termine *putrida*, con tutte le idee, che vi si uniscono, è un ripiego sovrano per gl'ignoranti: abbiano già rilevato l'abuso che essi ne fanno, applicandolo indistintamente alle febbri tutte, sì essenziali, che sintomatiche, il cui carattere sono incapaci di riconoscere; e se il Pubblico esige da essi, che diano una denominazione al male, si può dire, che fanno libero uso della facilità, che hanno di soddisfarlo. Ve ne sono altresì molti, le cui superficiali idee non passano più là delle *prime vie*, e che, credendo la *febbre putrida* non esser prodotta, se non se dalle materie, che in esse stanziano, regolano a norma di ciò la pratica loro.

Le persone d'un temperamento sanguigno, quelli, che hanno l'abito di disturbar colla fatica la lor digestione, quei tali finalmente, che menano una vita dissoluta, mi è paruto, essere i più sottoposti alla *febbre putrida*. Ella comincia quasi sempre dal *rigor freddo* alla foggia delle altre febbri: un peso grande alla testa, l'astopimento, il delirio, e gli acutissimi dolori di viscere, ne rendono la prima invasione alcuna volta spaventevole: il calore da principio è assai vivo; ma in seguito va moderandosi, per riassumere nuove forze, e per farsi più acre, e interno con somma aridezza alla cute. La frequenza del polso in questa specie di febbre, non corrisponde sempre al calore: nei primi periodi egli è ba-

stan-

stantemente flessibile, e regolare; ma fatti in progresso duro, e disuguale, ed allora si sentono bene spesso dei soprassalti nei tendini. D'ordinario non vi è che un raddoppiamento per giorno, che è alternativamente più violento. I periodi settenarj, e demisettenarj nella febbre putrida sono più rilevabili, che nelle altre: la sua durata è fra i quattordici, e i venti giorni, e di vantaggio.

Quantunque il male alla testa non sia per lo più violento nel corso di questa sorta di febbre, e che varj infermi nemmeno se ne lagnino; non lasciano però i medesimi d'essere esposti all'*assopimento*, a crudeli vigilie, al *delirio*, alle *convulsioni*, e a funeste *emoragie*. Oltre i dolori dei lombi, e delle estremità comuni alle altre febbri, sentonsi bene spesso in questa dei dolori al petto, e alla regione del fegato; non è sempre agevole il distinguere i reumatici, e gli artritici, che mescolansi frequentemente con li dolori febbrili, di pari che quelli, che nascono da ingorgamenti, e da infiammazioni. L'*oppressione* corrisponde alla violenza della febbre: le *anossietà* battono grandemente gl' infermi, che per altro si trovano in un' *oppressione* proporzionata al grado della malattia: è cosa rarissima, ch'ella principj senza vomito, o nausea: la lingua si carica d'una limacciosità biancastra, che in progresso si secca, e s'annerisce. Alcuni si lagnano del male alla gola: altri, ma più di rado, hanno la salivazione. L'orina è sommamente colorita, e anche ardente, torbida o chiara, senza posatura prima del giorno decimoquarto. Gl' *ipocondri*, e il ventre son sempre gonfi, e *meteorizzati*. Le scariche del ventre sono fetenti, e talvolta verminose. Il corso del ventre sieroso nel corso del male, è sommamente da temersi; ma s'e' sopraggiunge nel declinar d'esso male, è proficuo. Si può giudicare nella stessa guisa degli eccessivi sudori, che compariscono prima del tempo del depuramento: meno si temono i fetenti. La fioritura delle resipole, delle pustole miliari, e somiglianti, è alcuna fiata vantaggiosa.

La *febbre putrida*, perpetuamente *pericolosa*, per la violenza dei suoi sintomi, s'avvicina talvolta così dappresso alla febbre maligna, che non dee far maraviglia, che sieno state confuse da diversi buoni Autori. Nulladimeno la putrida, qualora non degeneri, dura meno; e l'affezione dei nervi, e del cervello, inseparabile dalla maligna, in questa è soltanto passeggera: per altro il depuramento, che nella maligna si fa rade volte, e con

som-

somma difficoltà, è ordinario alla putrida, nella quale si può fare un buon uso della dottrina delle *Crisi*, qualora per mezzo di rimedj amministrati fuor di tempo non s'incrociano i tentativi della Natura, che vi tendono. Le buone *Crisi* fanno per via delle orine, e del sudore, rade volte per l'emoragia: le orine si caricano, e depongono dal duodecimo al decimoquarto giorno, e allora veggonsi scemare gli accidenti. I sudori salutari compariscono verso il medesimo tempo, o talvolta più tardi, come l'emoragia: non è rado il depuramento per isputo: ma non vi è allora il sognato motivo di credere questo sputo marcioso, di pari che la deposizione bianchiccia delle orine. Le *Crisi*, che fanno per vomito, pel corso del ventre, per le fioriture cutanee, ec. il più delle volte sono imperfette.

Gli sconcerti, che cagiona la febbre putrida negli organi, non si manifesta gran fatto per l'apertura de' cadaveri; trovansi per altro in alcuni delle infiammazioni, ed altri ingorgamenti, dei corrompimenti, e delle cancrene, oltre ai travasamenti serosi, che s'incontrano con frequenza, tanto nel capo, che nel petto, e nel basso ventre.

Non si può per avventura far di meno in questa infermità della *cavata del sangue*; si è eziandio talvolta obbligati a reiterarla, per prevenire gl'ingorgamenti, e le infiammazioni, che possono sopraggiungere, quando è passato il tempo del cavar del sangue. L'emetico è indispensabile: per mezzo del medesimo possono prevenire quegli ostinati corsi di ventre, i quali durano talvolta quanto la stessa febbre, nè mancano di frastornare i sudori critici. Basta nei primi tempi del male tenere il ventre aperto co i più leggieri lassativi, o con dei clisteri, e questa è la via migliore di porsi al coperto degli accidenti, che minacciano la testa. I purganti non son proprj, che nel tempo del depuramento: segue però alcuna volta, che si possa, e che anzi si sia obbligati a dilungarsi da questa regola, che dee sempre andar di concerto co i movimenti della Natura. Gli *allentanti*, e gli *attemperanti*, i *refrigeranti*, e i *nitrosi* vengono in questo caso altamente commendati, e meritano d'esserlo: io non ne eccettuo gli *antiputridi*, tuttochè suggeriti da un'ipotesi, avvegnachè io gli creda acconciissimi a far testa all'alcalescenza degli umori. La Chinachina è sovente utile sul fine di questa febbre, come un fortificante, che soccorre in tal caso gli organi indeboliti dalla violenza del

del male, e non già come antiseptico, siccome l'hanno fatto credere a certuni alcune esperienze fatte sopra corpi inanimati. Sono di qualche ajuto i *cordiali*, e i *diarforetici*, allorchè la languida natura ha bisogno d'essere fiancheggiata nel tempo della concozione: ma è rarissimo un tal bisogno. La *canfora* è il calmante più appropriato a questa infermità. Gli *Ipnotici* vi sono in estremo sospetti, nè si dee ricorrere ai medesimi, salvo che nei casi pressanti. Quando è attaccata la testa, si procura di sollevarla con dei pediluvj, con dei sinapismi alle piante, con dei vescicanti, e con delle coppette a vuoto: finalmente non dee dispregiarsi l'applicazione degli animali viventi.

FEBBRE ARDENTE.

Potrebbe questa denominare *febbre putrida biliosa*, avvegnachè grandissima parte abbiasi la bile; ma oltre il non volersi, che questo liquore v'abbia perpetuamente molto che fare, dannosi delle febbri biliose sintomatiche, che non si assomigliano a questa. Gli Antichi ce l'hanno descritta sotto la denominazione di *Causus*: quanto alle altre denominazioni non meritano d'essere riferite. Distinguesi dalla precedente, non solo per l'ardore abbruciante, che sentesi interiormente, e per la veemenza dei sintomi concomitanti; ma eziandio per la sua durata, che non oltrepassa d'ordinario il termine dai quattro ai sette giorni. Non è, ch'ella non s'estenda alcuna fiata fino al decimoquarto, ed anche di più; ma questi casi sono rarissimi. E' bene il sapersi, come oltre la biliosa sintomatica, dannosi più sorte di febbri, come le infiammatorie, le vulnerarie, massime quando il fegato è intaccato, ec. le quali prendono l'aspetto di *febbri ardenti*; ma la loro carriera è diversa. Quella, di cui parliamo, comincia perpetuamente dal rigor freddo, che dà luogo ad un violento calore, più interno, che sensibile al di fuori: accade talvolta ancora, che ad onta di questo fuoco interiore, la cute, e le estremità sieno fredde, e abbian di pari anche delle abbrivature: lo che ha fatto, che gli Antichi in tal circostanza la denominassero *febris typhica*. In varie epidemie essa vien preceduta da alcuni accessi di febbre intermittente, terzana, terzana doppia, ovvero quotidiana.

Il polso nella *febbre ardente* è d'ordinario vivace, duro, e frequente: ma indi a non molto fassi debole, e

irre.

irregolare , con grande oppressione . Violenti sono gli esacerbamenti , massime nei giorni dispari : non hanno questi talvolta alcuna regola , nè pel ritorno , nè per la durata ; ma seguono per lo più la carriera della terza-
na doppia , e sono anche preceduti da una sensazione di freddo , più o meno considerabile . I pazienti son tormentati dalla sete , che fa testa a tutti i rinfrescanti : si lagnano del calore , e dell'amarezza della bocca : la lingua , e le labbra s' inaridiscono , annerano , e si screpolano : soffrono de' violenti *mali di testa* , delle crudeli *vigilie* , e precipitano non di rado in un delirio furioso , o cadono in un *assopimento* , e talvolta in convulsioni . Vomitano della *bile rugginosa* , e le loro scariche per secesso , che si dee procurar sempre di conservarle , sono della natura medesima , e spumose : fa di mestieri osservare , che questa evacuazione per le due strade è alcuna volta sì copiosa , che si potrebbe prendere pel morbo Colèra , se la continuazione non ci additasse questo equivoco . La bile in alcuni soggetti è sì acra , e così caustica , che in passando intacca l' esofago , i denti , e la bocca : e di pari scotta il deretano . Non è malagevole il concepire , che se cotal caustico liquore non l' evacua , la malattia divien più terribile , e più mortale : può infiammarsi lo stesso stomaco , lo che si rileva a un acutissimo dolore , ad un calore abbruciante nella regione di quello , al singhiozzo , e al freddo delle estremità : ma l' infiammazione investe più comunemente il fegato , il petto , e anche il cervello . La maggior parte degli ammalati son tormentati da ansietà , oppure dalla cardialgia , nè posson trovar riposo nel letto loro . La loro respirazione è più , o meno faticosa : i loro *ipocondrij* son *renitenti* , e tesi : essi lagnansi di dolori vaghi , e profondi , e cadono talvolta in sincope . Frequentissime sono in questa sorta di febbre le *emoragie* , e per lo più sono mortali . Le *urine* sono *ardenti* , di colore di matton cotto , e talvolta torbide , o cariche di bile , come nell' itterizia . La cute ha sempre alcuna ombra di giallo , dove per lo contrario è livida nella febbre maligna : ella è frequentemente coperta d' un inutile sudore : vedonvisi eziandio delle tacche petecchiali , e delle cancrenose . più , o meno estese : ciò che ha dato luogo all' equivoco di molti , che hanno collocato questa febbre nella classe delle maligne .

Le vive passioni , le eccessive fatiche , l' abuso d' alimenti piccanti , del vino , e dei liquori , sono le ordinarie

narie *cagioni* della *febbre ardente*; ma l'età, il temperamento, e la stagione, molto vi contribuiscono. Degenera essa sovente in febbre maligna, o se si vuole, quest'ultima prende nel principio l'aspetto di quella, di cui trattiamo. Il vomito, e il corso del ventre, verso il quarto, od il settimo giorno sono quasi le sole *evacuazioni*, che si possano riguardare come *critiche*: le orine per altro alcuna volta depongono; ma si dee poco aspettare dai sudori, e dalle emorragie. Le convulsioni, il delirio, il letargo, la difficoltà d'inghiottire, le parotidi, lo sputo sanguigno, le ansietà dei precordj, il singhiozzo, l'orina nera, e sanguigna, il sudor del volto, lo scioglimento del ventre innanzi tempo, e somiglianti, sono perpetuamente di *tristo augurio*. Di questa infermità si muore nel terzo, o nel quarto giorno; di rado nell settimo. La *febbre ardente* è meno *pericolosa* per li giovani, che vi sono più soggetti, di quello sìalo per li vecchi; ella si cangia talvolta in febbre intermittente: può anche degenerare in febbre lenta, o in malattia di languore, che assai di rado cede ai rimedj.

In questo caso molte osservazioni ci somministra l'*apertura dei cadaveri*: trovansi nella *testa* delle flogosi, delle putrefazioni, e delle suppurazioni, tanto nel cervello, che ne' suoi andirivieni: il plesso coroide ingor-gato, e varicoso: degli stravasamenti di varia natura, ma per lo più saniosi. Il *petto* ci svela gli sconcerti stessi nel polmone, e nelle membrane, che lo circondano, degli stravasamenti saniosi, e puzzolenti, tanto nella cavità del pericardio, che nella grande capacità: il pericardio in guisa diversa intaccato, il cuore increspato, e disseccato, questa stessa viscera d'una mostruosa grossezza, i suoi ventricoli, e le sue auricole piene d'un sangue fangoso, giallognolo, e sommamente aderente ai loro seni. Si è veduto nel *basso ventre* il fegato infiammato, purulento, e precipitante in putrefazione, questa stessa viscera d'un colore di zafferano, non meno nella sua superficie, che internamente, d'un volume prodigioso, e spingente alcuna volta il diaframma molto avanti nel petto, scirroso, duro, secco, e aggrinzato, d'un colore scuriccio, massime verso i suoi contorni, oppure nero come il carbone, delle adherenze più, o meno forti con gli adjacenti, la vescica piena zeppa di bile porracea, o nericcia, talvolta affatto vuota, e riarisa con delle concrezioni nella sua cavità. Si è osser-

vato, come la bile, che traspirava da questo conservatorio, aveva fatto corrompere le parti adjacenti, che ne erano tinte. Sonosi trovati i reni, e le altre viscere, sebben più di rado, nello stato medesimo, e degli stravasamenti della stessa natura entro la cavità dell'addome. Il sangue delle vene epatiche, di quelle del cervello, ec. è sembrato nero, e somigliantissimo alla pece: ultimamente si sono osservate delle tacche cancrenose sopra diverse parti.

La cavata del sangue non dee aver luogo, se non nel primo giorno della febbre ardente, e si ha anche talvolta difficoltà a prescriverla. E' cosa rara, che faccia d'uopo il reitarla, qualor non sopravvenga un'infiammazione; e gli errori, che commettonsi in tal particolare, sono bene spesso mortiferi. Siffatta osservazione non ha sfuggito l'avvedutezza del famoso *Van-Swieten*. Ho veduto degl'infermi precipitare in convulsioni, prima ch'fosse loro sciolta la legatura: io mi so bene, che si trovavano delle osservazioni contrarie; ma sovvenghiamoci pure, come sovente la Natura fa testa all'infermità, e a colui, che la medica. Che altri non si proponga d'adempire, per mezzo dell'effusione del sangue, le mire, che essa può avere, in eccitando una critica emorragia. Si è cento volte osservato, che gli effetti non ne erano gli stessi, e che l'emorragia in un tempo favorevole, era incomparabilmente più salutare, che tutte le cavate di sangue, che erano prima state fatte. Si può aggiungere, che in questa sorta di febbre, il più delle volte l'emorragia è funesta. Gli *emetici*, che pajono i rimedj più indicati, debbonsi tuttavia amministrar con moderazione, e debbon esser proporzionati alle disposizioni, che l'infermo ha per il vomito: senza questo essi aumentano l'incendio, eccitando l'infiammazione al basso ventre, ed altri funesti accidenti: questo è in una parola, spronar chi corre: *currenti calcar addere* ☐; di modo che si dee far uso in caso somigliante dei vomitivi più dolci, e diluirgli in una quantità di liquido. Fa d'uopo aver l'attenzione stessa per li *Purganti*, e servirsi soltanto di quelli, che non urtano i nervi, come sono i tamarindi, e la cassia nel siero, ec. Deesi usare la delicatezza medesima per li lavativi, per altro necessarissimi, e non servirsi, che dei più addolcenti, ove si fa entrare il latte, il burro, l'olio di mandorle dolci fatto di fresco, ec. I *calmanti*, che in questo caso si crederebbero dicevoli,

C

sono

sono da schivarfi più d'ogni altro rimedio. I *cordiali*, che talvolta mostra di chiedere la debolezza, non sono meno da temersi: io so altresì, che molti osservatori hanno scritto, d'aver amministrato con riuscita gli *oni*, e gli altri; ma, intanto ne hanno giudicato così, in quanto i loro infermi non ne erano morti. Gli *allentanti*, gli *addolcenti*, i *rinfriscanti*, e gli *acidi*, sono migliori calmanti, che amministrar si possano: proficui sono i *nitrosi*, il siero, il brodo lungo di pollastra, le emulsioni, i giulebbi acidi, e la limonata leggiera sono le bevande più amministrate: esse debbono servire per il totale nutrimento per li due, o tre primi giorni del male. Si amministra ancora alcuna fiata con molta riuscita la magnesia, e gli altri *assorbenti*, acconciissimi in parecchi casi a domare la bile.

FEBBRE MALIGNA.

Allorchè si consultano gli Scrittori, sì antichi, che moderni, che hanno trattato della *febbre maligna*, si stenta a formarsi una giusta idea di questa infermità, tanto sono le idee loro diversificate, e oscure; di modo che a giudicarne dalle loro opere, questa specie di febbre potrebbe passare per un problema da esser per anche disciolto. Con tutto questo io non credo, ch'è sia tanto malagevole l'acquistarne una nozione esatta, e lo sviluppare il carattere, allorchè altri si farà ad esaminare attentamente i fenomeni, che la medesima ci presenta. Per quanto assurdo siasi il termine di malignità, si è malgrado nostro costretti a servircene, per non interrompere un uso, renduto rispettabile dalla sua antichità; ma s'assene alla giornata un abuso scandaloso, applicandolo, non meno a tutte le febbri, che offrono dei gravi sintomi, che a quelle, che hanno degenerato per essere state malcurate: e ciò, che vi è anche più vituperevole, si è, che altri regola la propria pratica sopra questa falsa opinione. Il *Sydenham* non aveva per avventura torto a pretendere, che la parola malignità relativamente alle malattie, fosse stata più fatale agli uomini, che l'invenzione della polvere da schioppo: quei primi, che l'introdussero, non l'applicarono, che a quelle sorte di febbri, nelle quali la natura comparisce oppressa, e nelle quali lo stato del polso, e dei sintomi non corrisponde alla veemenza del male: — *Quasi clancularias vite strueret insidias*: — Laonde si vede ogni giorno in questa spe-

zie di febbre, che gli ammalati allora appunto muojono, che uno manco se l'aspetta. Ma c'incanneremmo a credere, che tutte le *febbri maligne* portassero questo carattere: ve ne sono di quelle, che camminano al coperto, e i cui sintomi non c'impongono, come osservasi in quella, che si chiama *Castrensis*, vel *Ungarica*, ed in parecchie altre sommamente manifeste, pel calore, per la frequenza, o velocità del polso, e pel la violenza dei sintomi: ma non fa d'uopo allora, come puossi rimproverare ad alcuni Scrittori, anche di quei, che vanno per la maggiore, confonderla colla febbre ardente, la quale è sempre di minor durata: la maligna, per quanto veelemente ella sia, non termina mai prima del ventesimo giorno, e quasi sempre più tardi: oltre l'essere d'ordinario epidemica, e contagiosa, di pari che la pestilenza, sicchè potrebbesi collocare dicevolmente sotto lo stesso titolo; ma noi tuttavia ne faremo un articolo a parte, per non caricare soverchiamente la nostra descrizione.

Non si potrebbe dubitare, che la *febbre maligna* non abbia la sua principal sede nei nervi, e nel cervello; in questo solo io ravviso un carattere, che potrebbe ottimamente distinguerla dalle altre specie di febbri: egli è vero, che queste seconde sono bene spesso accompagnate dalle medesime affezioni del cervello, e dei nervi: ma queste non vi sono, che passeggiere, e sintomatiche, dove per lo contrario accompagnano essenzialmente la febbre maligna in tutti i tempi: un altro fatto, di cui posso io attestare, prova in qualche guisa la mia asserzione; ed è, che i due terzi per lo meno di coloro, ch'io ho veduti investiti dalla febbre maligna, si trovavano immersi in sventure, ed avevano provato dei disgusti, ed afflizioni di spirito. La *febbre*, di cui ragioniamo, non investe molto bruscamente: ella è quasi sempre *annunziata* dalle stanchezze spontanee, e da una specie di sfiancamento, dal dolore e dalla gravità del capo, dalla cattiva bocca, dalla lingua pastosa, e dalla sfogliatezza, da nausea, da vigilie, o da un sonno opprimente, e laborioso, dall'affidamento delle membra, dalle alternative di freddo, e di caldo, e somiglianti. In questo stato di disagio si passano più giorni, fino a sette, od otto, senza porsi nel letto: allora pare, che la febbre covi, e che non si sveli, se non dopo essersi bene avanzata. In progresso ella si manifesta in guisa meno equivoca con un rigore di fred-

do più, o meno lungo, seguito dalla frequenza del polso, e da un calore dappprincipio assai moderato, presentandosi sotto un aspetto molto mite, che può ingannare i più avveduti, qualora non vengano avvertiti dall'epidemia. Tuttavolta in molti pazienti la sincope, l'affezione comatosa, poco diversa da un attacco apopleptico, le convulsioni, la colera, e dei dolori acutissimi di viscere, che s'affomigliano, ora alla colica nefritica, ora all'epatica, aprono la scena. In alcune epidemie questa malattia vien preceduta da accessi di febbre terzana, di doppia terzana, ec. che sono d'ordinario irregolari, e lunghissimi, le cui intermissioni sono accompagnate da oppressione, da ansietà, e da altri forieri della febbre maligna; ma con varietà così grande, che la loro istoria più circostanziata ricoprirebbe questa materia piuttosto d'oscurità, che di lume.

Gl' infermi si lagnano in seguito d'un' oppressione generale di dolori universali, e maceranti: quello, che tormenta il capo, è talvolta vivissimo, e si fa sentire fino nel fondo delle orbite. Alcuni si lagnano d'un dolor solitario, la cui sede si muta: altri hanno la testa barcollante, e la faccia livida, piombina, e schifosa. La vista torbida, lo spirito imbarazzato, o scovato, le mancanze, e le sinoppi, la vigilia, e il delirio, il letargo, e lo stramortimento, i tremori, e le convulsioni, ne sono i più familiari sintomi. La lingua nei primi tempi bavosa, e limacciofa, fassi poi abbrustolita, incavata, e tremolante. Parecchi hanno le labbra arrostitte: altri stentano ad inghiottire: ve ne sono di quelli, che hanno il fiato fetente, la salivazione, ec. Il polso in questo male è languido, debole, irregolare, e disuguale, alcuna volta naturale, o veementemente: si sente in toccandolo, un tremolito, o de' soprassalti di tendini; i raddoppiamenti vengono una, o più volte il giorno, senza molta regola. La respirazione è più, o meno legata, e si hanno talora delle palpitazioni. Il ventre nella febbre maligna è gonfio, più, o meno prominente, o teso, e doloroso. Le urine sono alcuna fiata soverchio copiose, oppure sopresse, e ritenute entro la vescica: non si può per altro ritrarre alcuna cognizione dal loro esame; elle son naturali, bianchiccie, cedrinee, rosse, nere, torbide, senza posatura, puzzolenti, ec. sudori, quasi sempre infruttuosi, sono irregolari, fetenti, freddi, ec. La bile viziata risveglia sovente degli sconcerti grandi, i più comuni de' quali sono il vomito,

to, il corso del ventre, la cardialgia, le ansietà, il singhiozzo, ec. Le *dejezioni* sono fetenti, verminose, e involontarie: rispetto alla dissenteria maligna, che molti collocano nella classe delle febbri, di cui parliamo, non è agevole il decidere, quale delle due malattie sia la principale: mi è tuttavia paruto, che questa infermità complicata spettasse più alla dissenteria, che alla febbre maligna: lo stesso è dalla febbre catarrale, del vajuolo, ec. che hanno talvolta i contraffegni più perfetti della malignità, senza perdere il primo loro carattere.

La *febbre maligna* è bene spesso accompagnata da picciole tacche porporine (*petechie*) somiglianti alle morficature di pulce, senza prominenza alla cute, nè asprezza: fanno vedersi sopra tutte le parti, a riserva delle mani, e del volto: la lor fioritura non ha alcun tempo fisso: qualora queste non rechino alcun sollievo, esse non rendono però peggiore la malattia: la loro durata è di quei tre in quattro giorni, e poscia si dileguano insensibilmente; veggionsi in maggior numero sopra il petto, e sul dorso, e talvolta sì una addosso l'altra, tuttochè sempre distinte, che fanno arrossare la pelle: con assai frequenza divengon livide, e nere: quest' ultime, che si considerano come cancrenose, sono in alcuni pazienti della larghezza d'un'unghia, e passano per un segno mortale, non meno nella febbre maligna, che nel vajuolo. Vi ha un' altra spezie di fioritura, che appellasi *miliare*: queste son *pustole vesciculari*, da principio trasparenti, e poscia bianchicce, note sotto la denominazione di *porpora bianca* (*purpura alba*) vengon sempremai precedute dal sudore; ma esse possono affacciarsi eziandio in tutti i tempi della malattia, sebbene con più frequenza sopravvengono nel settimo, nel nono, nell' undecimo, e nel decimoquarto: compariscono, e dileguansi fin due, e tre volte, e durano cinque, o sei giorni: sono accompagnate talvolta da un prurito, e da un trasudamento seroso: finalmente vedesi in alcuni soggetti, come le tacche petecchiali, e le pustole miliari si succedono a vicenda.

Fuor di proposito in vero hanno i Medici voluto separare dalle altre febbri maligne, le febbri *porporine*, e le *miliari*, poichè questa fioritura non è, che un mero accidente, il quale non cangia la natura del male, e che probabilmente dipende dalla natura del sudore, o da al-

un'altra circostanza, avvegnachè, come abbiamo accennato, il volto, e le mani, ne sono d'ordinario a coperto. Non se ne dubiterà, qualor si consideri ciò, che segue nel vajuolo, nella rosolia, nella febbre resipelacea, e nella scarlattina, le cui fioriture formano il carattere essenziale: è noto, come il volto, le mani in questi casi, non solo non vengono risparmiati, ma sono i primi investiti, e con più veemenza. Si può aggiungere, che le fioriture *petecchiali*, e *miliari*, compariscono in altre circostanze, ed anche talvolta senza febbre: non vi è chi non sappia, che le prime vengono in iscena col vajuolo, colla febbre ardente, colla dissenterica, colla catarrale, coll' affezione scorbutica, ec. Quanto alle seconde, si sa, che accompagnano spesso febbri leggerissime, e s' affacciano talvolta alla cute, senza la menoma alterazione del polso: che sono familiari alle donne di parto, ed ai convalescenti: che si fanno vedere, di pari che le altre, anche col vajuolo, colla rosolia, colla febbre scarlattina, ec.

Si fanno altresì vedere nelle febbri maligne delle parotidi , che suppurano con difficoltà , dei carbonchj , o delle pustole d'indole a questi analoga , delle cancrene esteriori , e simiglianti . Alcuni infermi perdono la memoria , o restano per lungo tratto di tempo melenfi : ve ne sono di quelli , che restano per alcun tempo sordi , e ciechi : altri passano in malattia di languore , o contraggono degl'incomodi , che stentano a cedere all'rimedj . Accade in alcune epidemie , che questa febbre si muti in intermittente , in terzana , o in terzana doppia , verso il decimoquinto , o il ventesimo del male . Non è uguale il fissare la durata delle febbri maligne , non meno a motivo dell'incertezza del loro principio ; ed anche del loro fine , i quali sappiamo essere sommaramente equivoci , che perchè la loro lunghezza sembra essere in ragione inversa della loro violenza : nulladimeno si può accertare , che queste non terminano giammai , prima del vigesimo , o del vigesimoprime giorno , e che arrivano fino ai quaranta , ed anche ai sessant giorni . La loro declinazione è d'ordinario assai lunga , e pericolosa : bisogna anche osservare , che quando la febbre conserva in questi ultimi tempi un certo grado di forza , ci dobbiamo aspettare una disposizione . Coloro , i quali che la malattia , di cui si tratta , possa de' giorni , hanno preso ,

E
S

preso, & io non m'inganno, la febbre ardente per la febbre maligna. Io ho pure osservato, come quei tali, che guarivano sul ventesimo giorno, erano più sottoposti alle ricadute, sì frequenti in questa malattia, la cui convalescenza è perpetuamente lunga, e sommamente incomoda, e non disgiunta da molte inquietudini. Abbiamo detto, che i *dolori di spirito*, e soprattutto il terrore, ingenerano sovente quest'orrido male: a questa cagione bisogna aggiungere l'*indigenza*, che porta seco la sozzura, e la privazione delle cose più necessarie alla vita, l'aria infetta degli spedali, delle prigioni, dei vascelli in mare, e somiglianti.

Il *pronostico della febbre maligna* non può essere, se non tristo: per farlo a dovere debbonsi principalmente consultare le forze, e lo stato dello spirito: si è cento volte provato, come il terrore, e lo scoraggiamento lasciavano poco da sperare rispetto alla guarigione, e come gli scorbutici difficilmente resistevano al male. L'oscuramento della vista, il tremolar della lingua, il mal di gola, le aste livide, il muover delle mani fuor di proposito, ec. debbon far temere dell'evento. La sordità non è pericolosa, la gotta serena d'ordinario col tempo si dilegua: proficua è la salivazione, di pari che quella specie di rogna, della quale verso la declinazione si gremiscono le labbra. Il calor moderato, il polso, e le urine, che si accostano allo stato lor naturale, non ci debbono rassicurare, veggendosi perire in cortissimo spazio degl' infermi, malgrado le apparenze più belle. Lo scioglimento del ventre, e il suo contrario, sono da temersi: le dejezioni lienteriche, le nere, le sanguigne, quelle che esalano odor cadaverico, non ci fanno sperare alcun bene. Si teme la fioritura innanzi tempo delle tacche petecchiali, ugualmente che la loro negrezza; ci fa altresì molta paura il lor tornare in dentro, come quella delle pustole miliari. L'emorragia dee intimorirci in qualunque tempo ella sopravvenga. E' inutile il dire, che il singhiozzo, gli svenimenti, le convulsioni, il delirio, e singolarmente il taciturno, le affezioni comatose, ec. sono sempremai tristi sintomi. Le *crisi* nella febbre maligna sono rarissime, fassene una imperfetta assai spesso verso il settimo giorno: ma i sudori, lo scioglimento del ventre, e le parotidi alcuna volta sono salutari. massime allorchè queste ultime terminano collo scioglimento, lo che sembra contrario a

tutti i sistemi, che si son fatti sopra questa materia: gli abscessi posson essere parimente critici; ma quei che si formano interiormente, divengono sovente mortali per la sola circostanza del luogo, che occupano. Abbiamo già detto, che non si poteva stabilir cosa alcuna sopra le orine: nulladimeno accade talvolta, che queste deppongono con isternamento degli accidenti; ma la malattia non lascia di continuare la sua carriera.

Le *dissezioni* sono in questo caso il più delle volte inutili, o sia perchè si fanno con soverchia fretta; o sia, perchè gli sconcerti cagionati da questa febbre non son sempre manifesti: tuttavia scuopransi nella testa degli abscessi, dei travasamenti saniosi, e purulenti. Trovansi, ma più di rado, gli sconcerti medesimi nel petto: i polmoni sembrano spesso coperti di tacche livide, e cancerose; sono talvolta in uno stato di corrompimento, che non gli lascia resistere al tatto, e tali io gli ho trovati in parecchi soggetti. Le viscere del basso ventre sono con più frequenza intaccate, che quelle del petto; oltre i vermi, che in questo luogo sono molto frequenti, vedonvisi de' segnali di sfacelo in tutte le parti, ma principalmente negli intestini, che sono perpetuamente gonfiati, e talvolta forati, con istravasamenti di materie fecciose. Non vi è cosa più comune del veder l'epiploon distrutto dalla corruzione: questa si comunica in alcuni al fegato, all'amilza, ec. Il sangue, che trovasi nel cuore, e nei grossi vasi, sembra essere in uno stato di scioglimento: eppure ci è talvolta sembrato assai grosso, e formante ciò che si dice concrezione poliposa. I cadaveri per lo più si gonfiano prodigiosamente, e scuopransi di tacche porporine, che non si erano vedute prima: si corrompono in breve ora, e si lacerano sotto le dita: in tale stato uno ha della difficoltà, come può crederci, ad accostarvisi; vi si corre anche del pericolo; e l'esame, che vi si fa con tanta ripugnanza, non può essere che superficiale.

La prima carriera occulta, ed equivoca di questa febbre priva d'ordinario gli ammalati dei più rilevanti ajuti, poichè non se ne debbono loro amministrar, se non quando ella si manifesta chiaramente, e che ha fatto interiormente dei grandi progressi. Si è appreso dall'esperienza, in parecchie epidemie, mercè le quali è più agevole il riconoscerla, che i semplici rimedj generali, la più severa dieta, od anche il solo mutar aria, posson dilungare questa infermità, o distruggerne il germoglio, che

non

non ha avuto il tempo di svilupparsi. Il trattamento della febbre maligna dee esser variato, avvegnachè ella prenda, come accennammo, diverse forme, e sia accompagnata da grandissimo numero di sintomi, i quali vogliono sovente una condotta speciale. Può dirsi in generale, che non le conviene la *cavata del sangue*; tuttavia dannosi delle circostanze, che la richieggono: ma ce ne dobbiamo anche sempre servire nel caso d'infiammazione, di dolor violento, di trasporto, e d'oppressione, con molta riserva. E' un uso quasi universalmente fra noi ricevuto il proporre il sangue dal piede, allorchè è investita, o minacciata la testa: tuttavia buoni osservatori, per non citare la mia testimonianza, ci accertano, che d'ordinario non ci reca alcuno ajuto, e che accresce piuttosto talvolta questo accidente. Dirò di più: il Signor *Pringle*, Autore, di cui è nota l'esattezza, ha asserito, che le copiose cavate di sangue disponevano al delirio: abbiamo finalmente un gran numero d'istorie, che confermano la loro mala riuscita, tanto in questa, che nelle altre circostanze. I *Vomitivi* nel principio sono indispensabili: debbon seguire da vicino la prima cavata di sangue, qualora siasi stimata necessaria, per non dar tempo ai rei sughi stanzianti nelle prime vie, d'insinuarsi nel sangue, poichè come è noto, la cavata di sangue apre loro quella strada. I *lasciativi*, come la cassia col cremor di tartaro, i tamarindi, e la cassia, debbon essere impiegati spesso: ma non se ne dee far uso, se non dopo il settimo giorno del male: non son proprj, nè nel principio delle fioriture cutanee, nè quando vi ha una disposizione infiammatoria nel basso ventre: rispetto ai purganti ordinarj, bisogna riserbargli alta declinazione del male, ove sono necessarissimi. I Clisteri emollienti fanno del bene in tutti i tempi. Gli *allentanti*, i *temperanti*, i *nitrosi*, gli *acidi*, e gli *antiputridi*, sono i rimedj più familiari, e i meno da temersi. Amministransi ancora talvolta gli *assorbenti*, e gli *antelmintici*.

I *cordiali*, e gli *alessiterj*, come il vino, la triaca, le confezioni, il giglio, i sali volatili degli animali, ec. sono sommamente proficui nelle malattie intermittenti, e in parecchi altri casi, ma non potrebbon mai esser proprj, come certuni se lo persuadono, a tutte le febbri maligne. Siamo obbligati a mescolargli alcuna volta con li purganti, oppure ad impiegare il *Kermes minerale*, che può compensare questa doppia mira. I *calmanti*, eccet-

tuandone la *canfora*, e il *sale sedativo*, son sempre sospetti: tuttavolta dannosi dei casi, ove uno è forzato a servirsene, siccome hanno fatto molti famosi Medici: questo però dee farsi perpetuamente con gran giudizio, e moderazione: i dolori, a cagion d'esempio, i più acuti le infiammazioni, e gli eccessivi scioglimenti di ventre, posson talvolta renderne l'uso legittimo, ma non convengono al delirio, sendosi provato cento volte, che gl' infermi facevansi più furiosi. La China è bene spesso necessaria verso il declinar della febbre: abbiamo detto che non dovevamo contare sopra la sua qualità antiputrida, e che poteva amministrarsi come un fortificante: o come uno stimolante proprio ad impedire, od a rimediare alla cancrena, che s'unisce sovente alla malattia di cui parliamo. Quei, che amministrano questa corteccia, e le altre piante amare, e febrifughe nelle maligne intermittenti, espongono i loro infermi a più orride catastrofi: questi tali rimedj possono essere allora soltanto impiegati, quando la febbre maligna, dopo quindici, o venti giorni, prende assolutamente l'indole, ed il carattere dell'intermittente, siccome si vede accadere in alcune epidemiche costituzioni. I *vescicanti* applicati dietro all'orecchie, al dorso, alle coscie, o alle gambe, quando il capo è investito, o minacciato, passano con ragione per grandi rimedj: fa d'uopo mantenerne lo scoto per mezzo di nuove applicazioni, ovvero per altri mezzi: non riescono però, allorchè in questa malattia domina anche la bile: fuori d'una tal circostanza sono proficui, quando le fioriture cutanee son rientrate, e singolarmente allorchè la loro materia si getta sopra qualche viscera: per questi casi adopransi ancora le *coppette a taglio*. Le *mignatte* applicate alle tempie per li violenti mali di testa, danno maggior sollievo, che le cavate di sangue, e son meno da temere. *sinapismi*, e gli altri cataplasmi stimolanti, alle piante, sollevano il capo: lo stesso effetto si ha sovente dal bagno ai piedi. Ultimamente si rimedia alla tensione dolorosa del ventre colle fomentate, e con altri topici emollienti.

IL SUDORE ANGLICANO.

E' questa la più compendiosa, e la più tremenda delle infermità: questa non è nota, secondo il *Villis*, se non da 300. anni in qua nell' Inghilterra, e non sono cinquant'anni, che si è veduta per la prima volta in Francia, ov' è rarissima - E' stata rettamente definita

ana febbre efemera peffilenziale , che per lo più non paffa le 24. ore . Il *Sudore anglicano* è fomamente mortifero , e porta via d'ordinario due terzi degl' infermi , che ne fon attaccati , maffime allorchè cadono in mano di quei tali , che ignorano il modo di trattarlo . Invefte fempre orridamente le perfone più vigorofe , e par , che rifpetti i vecchi , e i fanciulli . Il fuo principio fi manifefta d'ordinario per mezzo d'una grande *oppreffione* , o per ifvenimenti : alcuni toffrono un *tremor* generale , o fia una fpezie di rigor freddo convulfivo : dopo di quefto fopravviene un acre madore , che degenera in *copioffimi fudori* , i quali per lo più non terminano , che colla vita ; e caratterizzano a maraviglia quefta crudeliffima febbre . Il maggior numero muore prima delle 24. ore , e io ne ho veduti morire nel corto fpazio di fei ore . Qualora fi foppravviva un giorno intiero , fi è comunemente fuor di pericolo ; ma dee fi temere la ricaduta : per altro fe ne veggiono di quelli , che giungono fino al quarto , o quinto giorno , ma rariffimi fino al fettimo . I pazienti , il cui fpirito è ugualmente abbattuto , che il corpo , fi lamentano d'uno *ftraordinario calore* , d'un gran dolore alla regione dei reni : fon tormentati dalla *sete* : il loro *refpivo* è frequente , e *difficoltoso* : hanno delle *palpitazioni* , delle *caratagie* , delle *anfità* , ed anche delle *incopi* : il loro polfo non ha regola alcuna ; ma è per lo più frequente , elevato , e difuguale : occupa il loro fpirito un *mortale fpavento* , da quefto ftato paffano nel delirio , o nell' affopimento , che conducono alla morte . Le emorragie nel *Sudore anglicano* fon molto rare , di pari che le fioriture alla cute : di quefte feconde fe ne fon vedute delle fimili alla rofolla : accade con affai frequenza , che i convalefcenti provano per mefi e mefi dei fudori notturni , che ingenerano lor per la vita delle icottature . Si è offervato . come quefta *epidemia* non dominava d'ordinario più di tre , o quattro mefi , e che era preceduta da un tempo umido .

La cofa migliore , che può farfi nel trattare quefta infermità , fi è il *mantenere i fudori* , o l' eccitarli pel tratto di 24. ore . Nelle prime cinque , o fei ore fi privano i pazienti della bevanda , e paffato quefto fpazio , fi dà loro per alimento : fi dee far loro fchivare fcrupolofamente il freddo : fi è anche più fiate provato , effere pericoloso l'efporvi le mani . Dee dilungarfi , ed impedirfi , per quanto fi può , il fonno , che gl' invefte . Allorchè

chè il sudore non par sufficiente , si ecciterà con delle *fregagioni* fatte con tovaglioli caldi , o con della fenella : colla stessa mira si mettono in opera i *diaphoretici* , e i *sudorifici* . Quanto alla *cavata del sangue* , sembra non convenire a questo male ; tuttavia ci viene accortato , che in una , o in due epidemie di tal natura ella ha prodotto dei buoni effetti (*) ; ma egli è certo , ch'è stata inutilissima nelle altre . Non so parlar dei *purganti* , che non si possono praticare , se non nella convalescenza . Allorchè son passati tutti gli accidenti di questo morbo , non dee il paziente ometter per qualche tempo di mantenersi caldo : questa precauzione è importantissima ; sendosi provato , che quando è stata trascurata , son sopraggiunti a costoro degli scioglimenti di ventre , che hanno fatto testa a tutti i rimedj , e che non lasciavano d'uccider quei tali , ai quali avevala perdonata il *sudore anglicano* stesso .

LA PESTILENZA.

Questa malattia , che vien bastantemente distinta dalle altre , dalle eruzioni , dal contagio , e dalla grande mortalità , ci si offre sotto tante forme , ch'è dura cosa , e malagevole il farne una buona descrizione . L'epidemie non solamente non si somigliano ; ma nella stessa epidemia ella si mostra sotto differenti apparenze , com'è agevole ill giudicarne dall'eccellente pittura , che ce ne ha fatta l'illustre M. *Senac* , nel trattato della Pestilenza , pubblicato per ordine del Re . Si crede , che ci venga portata dai paesi orientali con gli altri abiti , stoffe , ed altre infette mercanzie : nulladimeno si è assai volte osservato , essere stata preceduta da una prodigiosa quantità d'insetti , come mosche , cavallette , bruchi , e somiglianti dalla carestia , e da altre calamità : questi fatti molto ben confermati , son difficili ad accordarsi colla prima opinione . Se non abbiamo contezza certa di sua *origine* , non siamo più ammaestrati rispetto al suo *carattere* , ed alla maniera di trattarla . Si può anche affermare , che da questo crudel morbo ver-

ran-

(*) M. *Boyer* Medico celebre della Facoltà di Parigi è l'Autore di questo metodo : è fuor d'ogni dubbio , ch'è ben riuscito a *Beauvais* : ma il solo tempo ci potrà far vedere , se sia applicabile a tutte le epidemie di quest'indole ,

ranno perpetuamente confusi i raziocinj, e perfino l'esperienza dei Medici i più illuminati.

E' noto, che inspira il più orrido terrore, e che il suo principio non è più regolare, nè più costante di quello della febbre maligna: ha però talvolta la Pestilenza dei forieri, come il disgusto, le nausee, le stanchezze, le vertigini, ec. ma ella investe per lo più bruscamente, senza che i pazienti s'avveggano per menoma cosa innanzi del loro stato. Il *primo assalto*, che giunge rade volte senza *rigor freddo*, si manifesta d'ordinario per mezzo d'una *grande oppressione*, del terrore, o per un imbarazzo, o confusione di mente, che in breve ora precipita l'infermo nel *delirio*, o nel *sopimento*: quest'infelici sentono per la maggior parte un dolore all'anguinaja; vi si scuopre altresì un'enfiagione, più o meno profonda; alcuni cominciano ad ammalarsi da una febbre intermittente, il cui terzo accesso gli uccide. Il dolore, e la gravezza di testa, lo stordimento, le vertigini, la vista torbida, e lo sguardo *truce*, i dolori alla schiena, ed al petto, i tremori, e le convulsioni, le *ansietà*, e gli svenimenti, il singhiozzo, e gli altri sintomi della febbre maligna, sono in questo male frequentissimi: alcuni pazienti vomitano delle materie nere, verdi, e fetenti: altri gettano dei vermi per bocca, e per secesso. Il *fiato* nel maggior numero urta l'odorato, e sconvolge lo stomaco. La *lingua* è di rado nera, ma sempre limacciata: molti si lagnano della sete, e d'un fuoco interno divorante. Il *pulso* sembra alcuna volta naturale, sovente debole, e languido, d'ordinario veementissimo, e finalmente irregolare, disuguale, e intermittente: il calore è più, o meno violento: in una parola, la febbre passa per tutti i gradi, dal più leggiero fino al più veemente: termina talvolta in quattro, o in cinque giorni: con più frequenza ella arriva fino al duodecimo, ed anche al decimoquarto, e se oltrepassa questo termine, è un puro accidente: ma la malattia vien prolungata dai tumori, che stanno talvolta lunghissimo tempo a suppurare. Vien da certuni preteso, che la febbre non sia essenziale a questa infermità; ma io son d'avviso, ciò essere senza fondamento, e che sia presso che una cosa stessa, che il vajuolo, che non comparisce mai senza una maggiore, o minor febbre. Il *madore*, o il *sudore* degli *appestati*, ha un odore disgustantissimo, che in-

infetta tutto quello , ch' è servito ad uso loro , e si comunica eziandio alla camera .

Gli esantemi , le fioriture pustolose , e le parotidi , che ordinario corteggiano la febbre maligna , son meno comuni in questo morbo ; ma vi sono familiarissimi i *buboni* , e i *carbonchi* : i primi si fanno vedere all' angina , alla ascelle , al collo , e agli altri luoghi glandulosi s' affacciano nella prima invasione , o negli altri punti della malattia , ed anche dopo la febbre : talvolta suppurano con gran prontezza ; ma si consumano anche insensibilmente per via di scioglimento ; questa strada però è più pericolosa . I carbonchi resipelacei , o flemmatici , non la risparmiano ad alcuna parte del corpo : invadono perfino la gola , e le parti interne : compariscono al di fuori sotto la forma d' un furuncolo , o di piccole pustole d' un color rosso livido , circondate da un cerchio infiammato : veggionsene di tutte le grossezze fino a quella di cinque , o sei polsi di diametro : in breve ora si sfaccellano colla cute , che serve loro di base , donde risulta un' escara : il trattamento di questi carbonchi prolunga talvolta la malattia d' uno , ed anche di due mesi . Finalmente la Pestilenza non termina felicemente , se non quando il veleno si porta verso l' abito del corpo , di pari che nel vajuolo : questo fatto svela una specie di rapporto fra queste due malattie , che posson esser l' una , e l' altra sommamente leggierissime o veementissime , e che egualmente si comunicano .

Quantunque la Pestilenza , a parlar propriamente non la perdoni a veruno ; nulladimeno si è osservato che le persone intrepide , quei , che vivono sobriamente , che amano la pulizia , quei che sono d' una complessione magra , che son soggetti all' emorroidi , che hanno delle ulceri , o de' cauterj aperti , e finalmente i tifici , e i gottosi , rade volte ne vengono investiti : che per lo contrario quei , che hanno l' animo sbigottito , che vivono nella crapula , o nella miseria , ne sono più suscettibili degli altri tutti . I più robusti ne sono i più maltrattati : le donne gravide , e le donne di parto non la superano . Lo stato del polso , e la veemenza dei sintomi annunziano in questo caso il pericolo con più sicurezza , che nelle febbri maligne : ciò non ostante se ne son veduti di quelli , che l' hanno scampata a monta dei più formidabili accidenti , dove altri per lo contrario , ch' erano tenuti per salvi colla maggior sicu-

rezza, hanno ceduto al male. E' cosa estremamente rara, che in questa malattia soppravengano evacuazioni critiche: l'Emorragia è più sovente funesta, che favorevole: quasi sempre mortale è riuscita la diarrea: i sudori posson esser buoni verso il quarto giorno, massime s'e' son naturali; ma negli altri tempi sono infruttuosi. Il *delirio*, che succede al sudore ne' primi giorni del male, è reputato *mortale*. Il tremolito delle mani, e della lingua, lo sguardo stralunato, e truce, gli occhi scintillanti, la voce rauca, i rigori di freddo irregolari, ec. sono *pessimi sintomi*; ma niente dee far più temere, tanto nella Pestilenza, che nelle altre malattie acute, della *insensibilità degl' infermi*; i quali tuttochè trovinsi in uno stato deplorabile, dicono, che stanno bene. Non si può ritrarre alcun lume dagli *esantemi* ordinarij, ma dai neri, e dai lividi viene annunziata una vicina morte. Non vi ha cosa, che dia maggiore speranza in questo morbo, dell'eruzion dei bubboni: i carbonchj non sono così favorevoli, massime s'e' compariscano prima del quarto giorno del male. L'uscita dei bubboni, dei carbonchj, e delle parotidi, preceduta dalla febbre vemente, calma la burrasca; ma quando queste eruzioni alzano la testa in mezzo alla tranquillità, danno anche maggiore *speranza di guarigione*. I tumori del collo non meno i glandulosi, che i carbonchj, sono quei, che più d'ogni altro si debbon temere: ma non vi ha cosa più pericolosa della febbre ardente, o qualunque altro accidente, che s'attraversi alla loro uscita: non è meno tremendo il loro tornare in dentro, purchè le orine allora non divengano purolente, lo che si è veduto accadere molto di rado. *Prendesi buono augurio* dai bubboni, che si fanno vedere spuntare sul quarto giorno del male: si considerano come critici, ma temonsi con ragione i più tardivi. I *carbonchj* son più *pericolosi*, che i tumori glandulosi, massime se servon loro di base questi secondi. Si muore in tutti i tempi della malattia; ma con più frequenza nel primo, nel secondo, o nel terzo giorno: veggionsene per fino di quelli, che spiran l'anima nelle prime cinque, o sei ore del male.

L'*apertura dei cadaveri* ha scoperto interiormente ciò, che si vede al di fuori: vale a dire, delle tacche porporine, livide, e nere sopra tutte le viscere, dei tumori, e degli abscessi, che partecipano della natura dei bubboni, delle pustole carbonchiali, non meno sopra le
vilce-

viscere, che sopra le membrane, che vestono le grandi cavità. Veggionsi altresì delle flogosi cancerose, e degli sfaceli, la bile rugginosa, e nericia stanziate nella vescica, e ne' suoi vasi, o ringorgante nello stomaco, e nel duodeno. Il cuore, ed il fegato si son veduti ben spesso d'una mostruosa grossezza, ed i vasi pieni zeppi d'un sangue nero, e aggrumato: in alcuni finalmente non si è trovata cosa, che meriti d'essere osservata.

L'arte di preservare dalla Pestilenza è più rilevante e più certa, che quella di risanarla. Si purifica l'aria con dei profumi, eccitati dalla polvere da schioppo dall'aceto, dal tabacco, dal succino, dallo zolfo, e dagli aromi. Il *Diemerbroeck* faceva molto caso del tabacco a fumare, ed usavalo. Si stima ancora l'odore dell'aceto, o di ruta, o semplice, l'odor del cedro, e simili gli aromi. Riputatissimo si è di pari l'uso interno di questo frutto, ed è nota la somma fidanza, che vi hanno gli Orientali: quello dell'aceto ordinario non la merita meno. *Sylvius de le boe* ha stimato difendersene per cotale mezzo, che sembra esser riuscito ugualmente ad altri molti. Ma non vi è cosa, che contribuisca tanto a preservarsi dalla Pestilenza, quanto l'animo tranquillo, l'intrepidezza, la sobrietà, e la pulizia: preferisconsi a questo tempo agli abiti di lana, quei di seta: parecchie persone si son fatte aprire dei cauterj, ed è sembrato che questo ripiego abbia avuto la sua buona riuscita. Nel trattamento medico di questo morbo, quando richiede, è ancor più, che negli altri importante l'entrar nelle mire della natura: queste sono oltremodo considerate nelle varie epidemie, e si può dire della Pestilenza, come di tutte le infermità popolari, che i prudenti, che ne son colpiti, posson esser le vittime della prudenza, come della temerità: tuttavia par cosa certa, che il veleno pestilenziale abbia un movimento determinato verso la cute, di pari che quel del vaiuolo, e che sia quasi l'unico mezzo, di cui servasi la Natura per sormontare questa crudele infermità: adunque non dovràssi ammettere, se non ciò, che dee secondare siffatta direzione, e schivare ciò, che può impedire un movimento contrario. Inutilissimo si è quel gran catalogo di rimedj proposti dagli Autori: non abbisognano che dei più semplici, e dei più comuni. Conservare la traspirazione, senza eccitarla soverchio, in questo caso è il punto più rilevante; e si è veduto co-

to volte , come quei , che non vi avevano impiegato , che il solo caldo del letto , avevano per lo più superata felicemente la malattia ; e che per lo contrario s'era veduta una riuscita funesta , allorchè era stata trascurata una tal cautela . Nulladimeno posson convenire al principio di questo morbo la *cavata del sangue* , l'*emetico* , od un *purgante* , quando non vi pongano alcuno ostacolo le eruzioni , e che lo permetta lo stato delle forze ; ma è cosa rarissima , che si possano amministrar nel corso della malattia . Deesi far moderato uso degli *allentanti* per non risvegliare lo scioglimento del ventre . I *temperanti* , i *nirofi* , gli *antiputridi* , e gli *assorbenti* , sono i rimedj , che pare , esser meglio riusciti . Egli è un pregiudizio universale , che i *cordiali* , e gli *al siterj* sieno gli antidoti della Pestilenza : veramente spessissimo vi convengono ; ma sarebbe un fallo majuscolo l'amministrargli indifferentemente : in molti casi sono stati riconosciuti abbrugianti ; e si procura di schifare questo disordine , allorchè si credono indispensabili , mescolandogli con gli acidi , sì vegetabili , che minerali . Il *giglio* , la *triaca* , e le altre confezioni , la *polvere ai vipera* , e l'*aceto triacale* , ec. sono state messe in opera più d'ogni altra cosa , massime nel primo dì del male , ove hanno mostrato di far meglio , che negli altri tempi . La *canfera* è un calmante , che può darsi con fidanza ; lo stesso non dee farsi degl' *Ipnotici* : questi son proficui allò scioglimento del ventre ; ma non si fa uso , che dei più leggieri , come del *diacordio* , del *diacodio* , ec. in tutti gli altri casi debbon esser sospetti ; tuttochè sieno stati amministrati nell' ultima Pestilenza con molta temerità . Non saprei disapprovar l' uso ricevuto di purgare sul fine della malattia . I *rimedj esternj* , se non vi si fanno entrare quei , che servono alla medicatura dei tumori , che noi rimettiamo ai loro proprj articoli , non debbon raggirarsi , se non se intorno ai *vescicanti* , e alle *coppette* . Il *Diemerbroek* faceva applicare dei sacchetti di vena calda ai piedi , all'anguinaja , e all'ascelle , per eccitare il sudore : questa pratica può avere i suoi vantaggi ; ma io non veggo , ch'ella sia stata abbracciata .

Tale si è il metodo di trattar la Pestilenza , che è stato il più adottato , ed anche il più felice ; nulladimeno i Medici più addottrinati , e che sono stati di buona fede , non ci hanno occultato d'aver veduto in questa calamità effetto sì scarso dai rimedj , che essi non sape-

le più ordinarie cagioni delle febbri intermittenti. I loro accessi, de' quali i primi son per lo più moderati, ma che in progresso prendon forza, e veemenza, vengono d'ordinario annunziati da sbadigliamenti, da allungamenti di vita, da stanchezze, e da dolori in varie parti: dalla pallidezza delle mani, e delle labbra, dal lividore dell'unghie, dal freddo del naso, e delle estremità, da rigori di freddo; e son terminati dal sudore. Ve ne sono però di quelli, che cominciano dal calore, senza preludio alcuno, e che terminano senza sudore. In alcuni le orine, nel tempo del sudore, e dopo di quello, sono di colore di matton cotto, cioè, ch'esse depongono una posatura, che sembra matton pesto. Gli accessi sono spesso burrascosi, non solo per la violenza del rigor freddo, che può durare due, tre, ed anche più ore per la veemenza della febbre; ma eziandio per dei dolori i più intensi di capo, pel sopimento, pel delirio, e per altri tristi sintomi. Ve ne ha delle *intermittenti*, come delle continue: veggionsene ogni dì delle *irregolari*; ma per poco, che vi si rifletta, si ridurranno agevolmente alle febbri note, delle quali o hanno prima avuto, o prenderanno dipoi il carattere. E' bene l'essere avvertiti, che queste febbri irregolari sono, per lo più, *sintomatiche*: tali sono le scorbutiche, quelle, che dipendono da alcuna suppurazione, e da altri sconcerti delle viscere, che terminano talvolta col freddo; le notturne, accompagnate da sudori copiosissimi, ed altre, delle quali ragioneremo altrove, e che non appartengono a questo articolo.

Le *intermittenti legittime*, che una rea medicatura non ha fatto degenerare, danno poco da temere: esse sono anche talvolta vantaggiose, come quelle, che fanno cessare anteriori infermità. Le febbri intermittenti, che principiano nel *Verno*, o nella *Primavera*, son le più corte, e le meno pericolose: la cosa non va del pari rispetto a quelle dell'Estate, o dell'Autunno, che sono più ostinate, e dan da temere di vantaggio. Le prime, il più delle volte terzane, che mostrano d'essere d'altra natura, si dileguano, allorchè compariscon le altre, e queste aspettano spesso il ritorno della Primavera. Nulladimeno le febbri vernine son più malagevoli a guarirsi, quando l'Estate è fredda, o piovosa: il calore per lo contrario, che si prova talvolta nell'invernata, mantiene le *autunnali*. Gli accessi più corti, quegli, che anticipano l'ora ordinaria, fanno sperar più

pronta la guarigione: cavasi lo stesso *pronostico* dal gonfiamento del ventre nei fanciulli, da quello delle gambe negli adulti, dalle bollicciattole, che fioriscono nella labbra, ec. Cessata la febbre, fa d'uopo aspettar qualche tempo, per assicurarsi della guarigione: il menore fallo nel governo, i purganti dati fuor di tempo, nebbie, il sereno, ec. posson farla tornare in iscena: ella torna sovente, senza alcuna cagione manifesta, a capo a quindici giorni, o a tre settimane: se gl' infermi, tuttochè liberi dalla febbre, non riacquistano il colore; se non torna l'appetito, se son molestati nella testa, se non ricovrano le forze, ec. dee aspettarli il ritorno della febbre. Il sopimento nei vecchi gli minaccia d'apoplessia: muojono di questa febbre nel rigido freddo. L'ostinata degenera bene spesso in itterizia, idropisia, od in qualunque altro mal cronico, e sovente mortale. Nella stessissima guisa, che le febbri continue si cangiano in intermittenti, queste seconde, singolarmente le autunnali, degenerano talvolta in continue ed anche di reo carattere. Osservansi ancora altri cangiamenti meno rilevanti: la terzana faasi terzana doppia, quotidiana, quartana, quartana doppia, ec. lo che par, che provi, che tutte queste febbri non sieno, che varietà, e modificazioni della medesima infermità.

Le *dissezioni* non ci manifestano se non il prodotto, o le conseguenze della febbre intermittente. Trovasi in quei tali, che sono stati portati via dal male nel tempo del rigor freddo, un sangue nericcio, e compatto: il cui cuore, i vasi grandi, e singolarmente quelli del polmone, sono ingorgati. In quei, che son morti in uno stato di languore, meno dalla febbre, che dalle sue conseguenze, veggionsi degl'imbarazzi scirrosi, degl'abscessi, singolarmente nel fegato, e meno comunemente nel pancreas, e nel mesenterio, le viscere alcuni sembrano inaridite, e abbrugiate. Lo stato della milza varia d'affai: ella è comparsa arida, e intaccata talvolta gonfiata a segno, che se n'è sfiancata la propria sua tunica: la sua sostanza in uno scioglimento putrido, che rendevala simigliante alle fecce del vino, e l'epilone in uno di putrefazione, ed in parte distrutto. La vena porta è stata trovata prodigiosamente dilatata dal sangue, che vi s'ingorgava: i vasi biliari son comparsi ugualmente stivati d'una bile nera, e verdastria. Sonosi trovate con assai frequenza delle pietre nella cistifellea, delle flatuosità, e degli strangolamenti ne-

intestini, dei tumori nel tessuto cellulare del peritoneo, per non parlare degli stravasamenti in tutte le cavità, e d'altri sconcerti comuni a tutte le malattie.

La *medicatura* della febbre intermittente dee esser semplice, e non precipitata: è cosa prudente il lasciar passare qualche tempo, innanzi di por mano agli specifici, non meno per accertarsi del carattere della febbre, assai volte somamente equivoco, che per far uso della *cavata del sangue*, allorchè vien giudicata necessaria, un *emetico*, o un *purgante*, di pari che gli *allentanti*, e gli *attemperanti*, che non vi debbono essere risparmiati. Il vomitivo amministrato a proposito è bene spesso vittorioso per se solo, massime allorchè tira seco molta bile porracea, e rugginosa, ch'è il fomite più comune di questa infermità. La cavata del sangue, e l'emetico non si convengono nel tempo dell'accesso, per quanto se ne dicano coloro, che praticano altrimenti: al più al più si può fare aprir la vena, qualora la febbre sia in estremo violenta, se il dolor di testa sia insopportabile, o se lo vogliano di mera necessità altri sintomi pressanti: è di pari permesso nel parossismo l'amministrare un vomitivo, quando le nausea tormentano i pazienti; ma fuori di queste circostanze fa di mestieri aspettare l'intermittenza, e nel tempo della febbre non far uso, che degli allentanti, dei temperanti, e dei nitrosi. La *China-china* dopo i rimedj generali è senza contraddizione il febrifugo migliore; ma non è dicibile nè a tutti i casi, nè in tutti i tempi: ella è rade volte necessaria per guarire le febbri vernali, che richieggiono poco più degli allentanti, e della dieta: bisogna per altro lasciare sventar la febbre, o lasciarle perdere una parte della sua forza, per amministrarla con sicurezza: quest'attenzione trascurata la rende spesso infruttuosa, e talvolta anche nocevole anche in guarendo la febbre. La *China* nell'accesso non è niente meno impropria, che la cavata del sangue, e l'emetico: certuni però l'amministrano sul principio, o poco tempo prima. Se alcuna volta in questa foggia è riuscita, ella è anche prodotto degli effetti perniziosissimi; ed il *Sydenham* ne cita due esempi. Si vede ogni giorno, che per condiscendere all'impazienza degl'infermi uno sollecita a prescrivere tal rimedio; si vede, io dico, che la febbre divien più malagevole a guarirsi, o passi degenerare in itterizia, o in asma, o in idropisia, in as-

fezione comatosa, o convulsiva; oppure in alcun' altra più rea infermità, che quella, che si pretende investire,, di maniera tale che si è bene spesso forzati a sospendersela, ed a bramare il ritorno della febbre. Si crede, che ajuti a produr questo effetto lo spirito di sale ammoniaco.

In evento, che per mezzo dei sudori facciasi una spezie di depuramento del sangue, e degli umori, come non vi è luogo di dubitarne, non può essere che pericoloso l'opporvisi, col fermar troppo presto la febbre, ch' è il mezzo, di cui serve la natura per domare la materia morbifica, che può produrre altri malori: e questo è il sentimento dei Pratici più riputati. Questa regola però dee avere le sue eccezioni nei casi, nei quali gli accessi sono sì terribili, ed i pazienti sì deboli, che si abbia motivo di temere per la loro vita: si giudica bene, che in queste circostanze non si potrebbe mai far troppo presto, con rischio di ciò, che potrebbe addivenire: ma nei casi ordinarij ella è cosa prudente il non dare la China, se non dopo tre, o quattro accessi. E' altresì importantissimo il regolarne la quantità, ed il non imitar quei cotali, che non si stancano di darne finchè dura la febbre; una, o due once di questa corteccia per l'intera medicatura debbon bastare, e non è mai indifferente l'inoltrarsi di più. Si vede pur troppo frequentemente, che coloro, che non conoscono altre arme per combatter la febbre ostinata, empiono i loro infermi d'ostruzioni, gli precipitano nell'Idropisia, nell'Emofisi, ed in altri malori cronici; di modo che, quando se n' è amministrata la dose ordinaria, e che se n' è rilevata l'inutilità, uno si dee rivolgere agli altri amari, ai marziali, ai fortificanti, alle acque minerali, ec. La China d'ordinario non fa effetto, quando gli accessi sono assai lunghi, quando ritardano l'ora ordinaria, come anche quando non son preceduti dal rigor freddo, o terminati dal sudore: i *Cicoracei*, e i *temperanti*, sono in questi casi i rimedj più appropriati: oltre la China, hannosi altri febrifughi, ai quali si dà sovente la preferenza, come il *sale ammoniaco* preso nell'acqua tepida, o la *serpentaria Virginiana*, infusa nel vino bianco, amministrate, o l'una, o l'altra, due ore prima dell'accesso. Si stima altresì il *sugo di limone* temperato coll'acqua, e collo zucchero, ovvero l'infusione della *salvia* nel vino, presa nel principio dell'accesso. Non fo parola della *Genziana*, della *Centaurea minore*, e delle altre.

pian-

piante amare, delle quali ci servivamo prima della scoperta della China: la *canfora* unita a quest'ultima è stata degna degli encomj dei più riputati Professori dell'arte nostra. Usasi in alcuni luoghi la *corteccia del frassino*, che si amministra col sale d'assenzio; ma non se ne può altri gran fatto fidare, di pari che a molti altri febbrifughi, dei quali altrove parleremo.

Quando in alcune circostanze i *rigori freddi* pongon la *vita in pericolo*, possono prevenirsi, o moderare con una bevanda calda, e copiosa, cominciandola due, o tre ore innanzi l'assalto: si servono colla stessa intenzione della ptisana di falsa pariglia, o d'ogni altro sudorifico: fassi ancora un'unzione alla regione dello stomaco coll'olio di garofani, di cannella, ec. E' necessario osservare, come il soverchio calore, o venga eccitato dai rimedj, o sia comunicato dall'abito del corpo, fa bene spesso degenerare le intermittenti in febbri continue: si dee temere altresì il freddo, che può interrompere il sudore, e render per accidente la febbre più ostinata, e più pericolosa, siccome hannolo molte e molte volte provato coloro, che per impazienza hanno lasciato il letto. Ha il *Sydenham* osservato, e lo conferma l'esperienza ogni giorno, che i *Purgativi*, che si mescolano comunemente con li febbrifughi, e de' quali veggionsene molto buoni effetti nel corso della febbre, che abbiamo alle mani, son tuttavia *dannosi*, quando la medesima è stata troncata, e che se n'è interrotto l'uso, perchè possono far tornare l'accesso: si è ancora provato questo disordine dai semplici lavativi: nulladimanco temonsi meno, sì gli uni, che gli altri, allorchè la febbre è cessata naturalmente. Si è pure osservato più volte, nella *febbre degenerata* in continua, o in remittente, che una cavata di sangue, e un purgante avevanle fatto riassumere la *prima forma*.

Siccome si stenta grandemente a far prender la China ai bambini, se ne prepara uno sciroppo, ch'essi mandan giù senza ripugnanza: si possono anche risanare con li *lavativi febbrifughi*. Si ricorre parimente a questi secondi per quegli adulti, che hanno una ripugnanza invincibile per la China; ma fa d'uopo, che gli usino per lo meno per quindici giorni continui: se ne fa entrare un'oncia in ciascun lavativo: non si deve impiegare meno d'una libbra e mezzo di questa corteccia, per assicurarsi della guarigione: se ne amministrano due, o tre per giorno,

finchè la febbre sia fermata; e in seguito si allontanano a norma del metodo ordinario. L'aglio infranto, e applicato ai due polsi, passa nello spirito di molte persone per un buon febrifugo. Son noti infiniti *rimedj* sì interni, che esterni, i più bizzarri, e i più straordinarj, che da un Medico non potrebbero esser suggeriti, tutto ch'ei sappia esser riusciti. Si potrebb'egli credere, che il buon effetto dei medesimi dipendesse dal grado di fidanza, che gli dà l'ammalato? Quanto a me, ho veduto un uomo, il quale dava da portare indosso una carta sigillata, ove aveva scritto con aria misteriosa ciò che gli saltava indifferente in capo, e che molte, e molte volte riusciva: si sa altronde, che l'allegria, la collera, il terrore, e una parola, tutte le passioni vivaci posson far venire la febbre, e guarirla: una caduta, uno schiasso, od alcun altro accidente, producono l'effetto stesso per mezzo dell'impressione, che fanno sullo spirito. Non si potrebbe altresì dubitare, che l'*immaginazione* non abbia una grandissima forza sopra gli agenti materiali dell'animale economia; ed è cosa accertatissima, che si ritraggono ogni dì da questa cognizione dei vantaggi grandissimi.

FEBBRE QUOTIDIANA.

Sebbene non crediamo, che la *quotidiana* non abbia il carattere delle altre febbri intermittenti, non lasceremo tuttavia di collocarla in questo luogo, per non dilungarci da un ordine quasi universalmente ricevuto. Questa è la più rara delle intermittenti, massime per quelli che fanno distinguerla da tante febbri sintomatiche, che ogni giorno, come quella, che forma il soggetto del presente Articolo, comparisce d'ordinario nella Primavera, ed è alcuna volta epidemica. L'ora *bastantemente costante*, la regolarità, e l'eguaglianza dei parossismi, distinguonla dalla terzana doppia, e dalla tripla-quartana; nella prima di queste due il terzo accesso per la sua violenza corrisponde al primo, come il quarto più mite corrisponde al secondo; nella seconda il quarto accesso corrisponde al primo, e così dei seguenti. Il *rigor freddo della quotidiana* è leggiero, il calore, e la frequenza del polso, sono moderati, e il sudore non è copioso. I suoi *parossismi* son corti, e rarissime volte doppij: vengono sulle sei, o sulle sette ore della mattina, e son talvolta accompagnati da cardialgia, da gonfiamento, ec. Questa febbre può durare più mesi,

un anno, e di vantaggio; poichè si fa menzione d'un uomo morto nell'età di 95. anni, che avevala portata indosso pel tratto di 60 anni. E' cosa sommamente rilevante l'osservare, che la quotidiana s'oculta bene spesso sotto la forma della cefalalgia, della colica, d'un attacco di gotta, di reumatismo, e simiglianti. Si pretende, che la febbre quartana spesso degeneri in quotidiana: ma non si farebb'egli presa per tale la tripla quartana? Confondesi anche con frequenza la quotidiana colla febbre isterica, come con quella, che soppravviene talvolta alla soppressione dei menstrui; queste ultime, di pari che quella, di cui parliamo, hanno delle vere intermittenze; ma i loro accessi vengono la sera, o in altre ore.

La quotidiana, che d'ordinario, dopo la quartana, è la più lunga, *non dà gran fatto da temere*: ella può tuttavia degenerare in febbre continua, o in febbre lenta. E' di maggiore importanza, ch'altri pensi il non precipitarne la medicatura: dalla pratica contraria se ne son veduti nascere dei gravissimi sconcerti. Questa sorta di febbre par, che abbia la sua sorgente nelle prime vie, o nelle viscere, che concorrono alle loro funzioni. La *cavata del sangue* vi è di rado necessaria; ma non si debbono trascurare gli *emetici*, ed i *purganti*. Gli *aperitivi*, i *marziali*, gli *stomachici*, ed i *tonici*, sono in questo impiegati con molta riuscita. Gli *amari*, e i *febrifughi* son meno propri di questa, che delle altre intermittenze; nulladimeno posson essere amministrati, come fortificanti.

F E B B R E T E R Z A N A .

E' questa la più comune delle intermittenze: i suoi accessi, che sono comunemente di sei in dodici ore, giungono talvolta fino a venti, ed anche trenta, singolarmente nei soggetti pletorici: vengono molto regolarmente all'ora medesima, oppure costantemente l'anticipano, più spesso avanti il mezzodì, ma più tardi, che nella febbre quotidiana. Il quarto parossismo è d'ordinario il più violento, e il più lungo; il quinto, e i susseguenti sono grado per grado più moderati, e più corti. Le intermittenze son più perfette a misura che sono più forti i parossismi: se questi a tal dato punto son deboli, il polso restasi perpetuamente febbrile. Il sudore è comunemente più copioso, quando è stato corto l'accesso: nei lunghi poi alcuna volta non compare del tutto. Abbiamo detto, che la *febbre maligna*
in

in certe epidemie cominciava da alcuni accessi di *febbre terzana*. Non si lascia di stare in guardia, allorchè gli accessi sono lunghissimi, e che il ritorno loro è irregolare, e massime se nelle intermissioni si lagnano i pazienti di dolor di testa, d'ansietà, e d'oppressione: ma quando mancano questi segni, siccome accade talvolta, vi vuol molta attenzione per non ingannarvisi. Si dee ancora osservare, come parecchie *febbri sintomatiche* prendono la carriera della *terzana*, come si vede con assai frequenza nella *febbre isterica*, nella *verminosa*, e in altre, di cui parliamo, le quali espongono coloro, che non ne sono istrutti, a prendere dei grossi equivoci. Abbiamo detto, che gli accessi della *febbre terzana* tornavano ogni due giorni, e che nella *terzana doppia* afferravano ogni giorno, o due volte il giorno, con un giorno d'intermissione: quanto alla *terzana tripla* (*febris semi-tertiana*) sembra esser composta della quotidiana, e della *terzana semplice*, di modo che vi è ogni due giorni un accesso doppio: nei nostri climi è sommamente rara, ma è comunissima in Italia, in Ungheria, ec. Può anche addivenire, che in due giorni s'abbiano quattro accessi, e la *febbre* sarà *Terzana quadrupla*: fuori dell'*Tulpio* io non so, che altri l'abbia osservata.

Fra tutte le intermittenti la *Terzana* è meno da temersi: si è anzi veduto, come più, e più volte liberava gl'infermi da molti malori abituali, come da ostruzioni, da enfiagioni, e perfino da convulsioni: cessa d'ordinario per se stessa nel settimo parossismo. Il sudore dee essere in questo luogo considerato, come un'evacuazion critica. Se accade, che uno l'interrompa, dee aspettarfi un accesso violento: il vomito, e la diarrea posson supplire le sue veci: dalle urine, sebben di rado, è stato procurato il vantaggio medesimo; le pustole, che fioriscono nei contorni della bocca, annunziano con più certezza il fine della *vernale*, che dell'*autunnale*. L'invecchiata, e quell'a, ch'è stata mal medicata, posson degenerare in *malattia di languore*. Abbiamo detto ciò, che si deve temere dei lunghi accessi, della loro irregolarità, delle intermissioni fastidiose, ec. La *terzana doppia* è di più malagevole guarigione, che la *terzana semplice*, perchè ci dà minor tempo per amministrare i rimedj. La *terzana tripla* è la più pericolosa, come quella, ch'è con frequenza accompagnata con infiammazione; lo ch'è in estremo raro nelle al-

tre intermittenti : le conseguenze di quella per altra parte son sempre ree , e le sue ricadute mortali . Le aperture dei cadaveri in quest' ultima non ci manifestano , che infiammazioni , corrompimenti , e cancrene .

La cavata del sangue , e l'emetico convengono a quasi tutte le febbri terzane : un purgante il giorno dopo l'amministrazione di quest' ultimo , è sovente efficacissimo , rendendo più perfetta questa indispensabile evacuazione . Si ferma la terzana molto comunemente nel quinto , o nel sesto parossismo . Oltre la *China* , e gli altri *febbri-fughi amari* , che s' addicono a questa infermità , vi s' impiega anche il *nitro* , i *tonici* , i *diaforetici* , i *diuretici* , e gli *aperienti* . Non si ha molto bisogno di questi ajuti per la *legittima* ; ma gli vuole perpetuamente l' irregolare . Quanto alla *maligna* , ben si conosce , ch' esce di questa classe , e bisogna usarvi la medicatura da noi esposta altrove ; vi si potrebbe di pari ricorrere per la *terzana tripla* , la quale dopo i rimedj generali richiede i *temperanti* , i *nitrosi* , e gli *antiputridi* , i *diaforetici* , gli *assorbenti* , i *purganti miti* , e gli altri compresi nell' articolo della febbre *maligna* , colla quale ha pure molta affinità la *terzana tripla* : da questo si deduce , che non si dee investire colla *China* , dalla quale in siffatta occasione non ne abbiamo veduto , se non se effetti perniciosissimi . Tuttochè questo *specifico* sia per la terzana , e per la terzana doppia , tutto quello , che possa usarvisi di meglio , io non ho lasciato di dare spessissime volte la preferenza all' *acqua pura* presa per totale alimento per tre , o quattro giorni : la *China* , siccome è noto , produce sovente dei rei effetti : l' acqua non fa mai alcun male . La *China* con frequenza sospende soltanto la febbre : l' acqua la guarisce radicalmente ; ma questo rimedio è troppo semplice e troppo comune , e perciò da non essere adottato , non essendo il Pubblico giammai portato a stimare ciò , che conosce . *Vult decipi* , dice Plinio , *decepiatur* .

F E E B R E Q U A R T A N A .

E' questa d' ordinario autunnale ; i melancolici , e quegli , che hanno delle ostruzioni , vi sono più degli altri soggetti . L' accesso , che torna il terzo giorno , ed investe per lo più dopo il mezzodì , non è violento , nè suole oltrepassare le sei ore : fassi anche col tempo più corto , e termina talvolta in un' ora . Il sudore in queste spezie di febbre è di rado copioso : il più delle volte

te tampoco non comparisce : tuttavolta veggionsene alcuna fiata dei notturni, che tornano ogni giorno : non cominciano d'ordinario avanti il settimo accesso, ed al più al più non oltrepassano lo spazio d'un mese. L'estremo appetito è quasi inseparabile dalla febbre quartana, e l'appagarlo rendela più ostinata. Il sangue tratto a questa sortita di febbricitanti si cuopre d'una materia giallognola, o bianchiccia a foggia di crosta: abbiain detto, che nella *quartana doppia* l'accesso veniva il primo, e il secondo giorno, e che il terzo era libero, e in seguito il quarto, e il quinto, e così degli altri: che nella *quartana-tripla* avevasi la febbre ogni giorno; ma bisogna aggiungere, che nell'uno, e nell'altro caso il quarto giorno corrisponde al primo, il settimo al quarto, ec.

E' noto, come la *quartana*, che fa talvolta perdere la pazienza, sì dell'infermo, che del Medico, può durare *più anni*: ella è tale nella maggior parte dei melancolici, e dei vecchi. Il Signor *Cluv* ci somministra l'istoria d'una febbre di questo carattere, che durò *intieri venti anni*. Si pretende con fondamento sufficiente; che non s'abbia *se non una sola volta in vita*: nulladimeno pel tratto del suo corso ella ha dei lunghi interrompimenti. Se ne fermiano anche gli accessi con sufficiente agevolezza: ma ne dobbiamo aspettare, o presto, o tardi la *ricaduta*, che accade talvolta, quand'altri se ne crede affatto liberato: il menomo fallo nel governo la può far tornare. Si è più volte osservato, che il parto, il flusso emorroidale, la peripneumonia, il vajuolo, e le altre gravi infermità l'avevano fatta cessare: ma se molte malattie guariscono la febbre quartana, questa con un regresso molto singolare ha liberato dall'epilessia, dall'affezione ipocondriaca, dalla nefritica, dalla gotta, e simiglianti. Si è anche osservato, che quelli, che avevano avuto la *febbre quartana*, vivevano più lungamente. Si muore di questa infermità nel rigor freddo; ma ciò accade di rarissimo. Nulladimeno questa spezie di febbre tira seco con frequenza delle *ree conseguenze*: tali sonol'itterizia, l'idropisia, gl'ingorgamenti scirrosi, la tosse cronica, l'asma, ec. La *doppia*, e la *tripla-quartana*, sono più da temere, che la semplice; ma esse sono *più lunghe*, e non si allontanano, se non hanno prima riassunto il tipo loro di semplice.

Pretende il *Sydenham*, che non si possa dilungare la febbre quartana in meno di sei mesi: io non so, se co-

si segua nel suo paese : ma è cosa certissima , che in Francia molti sonosene liberati in minore spazio di tempo . La *quartana* dee esser trattata *dolcemente* ; è sempre-
mai pericoloso il prenderla bruscamente di fronte , col somministrar con soverchia fretta la *China-china* : questo rimedio neppure è proprio , quando il fegato è intaccato , siccome accade sovente : ella non è niente più adattata alle *febbri quartane sintomatiche* , che dipendono dal mal francese , dallo scorbutto , dalla cachessia , e da altre malattie , che hanno la loro medicatura a parte . Quanto alla *quartana legittima* , la dieta , i rimedj generali , gli *allentanti* , e i *temperanti* , devono andare innanzi ai *febrifughi* : la *cavata del sangue* rade volte è necessaria ; ma l'*emetico* è indispensabile . Quando per mezzo di questo si è fermata la febbre , lo che , come si è detto , ottienasi molto agevolmente , si dee per lungo tempo far uso degli *aperitivi* , e degli *amari* , o ricorrere all'acque di *Vals* , di *Vichy* , di *Balaruc* , di *Borbone* , di *Barbon Lancy* , d' *Aix-la-Cappelle* , di *Vesoul* , di *Miers* , e d'altre *Minerali* , nate fatte non solo per impedirne il ritorno , ma ancora per guarirla radicalmente . La rucobetta marina ha più efficacia per questa febbre della *China* : è ancora stimata la *cannella* , l'*acoro* , la *salvia* , la *betonica* , la *triacca* , e gli altri *fortificanti aromatici* . S'impiega anche con riuscita l'*antimonio* , il mercurio dolce , ed altre *preparazioni mercuriali* , il *sale ammoniaco* , e gli altri sali neutri , la *magnesia* , e gli *assorbenti* , gli *amari* , e i *diaforetici* ; ed altri rimedj , che abbiamo uniti insieme altrove , che son propri egualmente per la doppia , e per la tripla quartana , accomodandogli alla circostanza della scarsezza del tempo , che la molteplicità degli accessi permette ai rimedj . Si ritrae anche del gran vantaggio dall'esercizio , dai bagni , dal mutar aria , ec. Del rimanente questa infermità lasciata in balla di se stessa , si dilegua più , o meno tardi senz'uso di rimedj : ciò di pari accade ben spesso , quando se ne usano : quindi hanno origine tante false osservazioni , delle quali son pieni zeppi i nostri libri , perchè non si è mai lasciato in quei tali casi d'ascriverne la guarigione a quei tali rimedj , che si amministravano , quando si è dileguata .

F E B B R E R E M I T T E N T E .

E' questa anche denominata *subentrante* , *Sinoca* , *continente* , ec. *febbre* , la quale , senza avere delle veraci inter-

intermittenze , conserva perpetuamente il carattere delle intermittenti . Si conosce all'ordine delle sue remissioni , e de' suoi esacerbamenti , tuttochè sovente molto irregolari , la quotidiana , la terzana , la quartana , ecc. Le *intermittenti* stesse degenerano con frequenza in *remittenti* , e queste in intermittenti : tanta si è la loro affinità . Il *freddo* , che va innanzi al parossismo della remittente , è poco sensibile : ma il sudore , che lo termina , è più rilevabile . Certuni hanno la salivazione , altri nel tempo dell'accesso rendono le urine ardenti , e che depongono nel tempo della remissione . Questa *febbre* , massime quando è *irregolare* , è spesso accompagnata dal vomito , dalla diarrea , dalla colera , da convulsioni , e da dolori , che sembrano simili alla colica , alla pleuritide , al reumatismo , e simiglianti .

La *Remittente legittima* non dee si temere gran fatto più della intermittente : non è però lo stesso dell'*irregolare* che fassi con frequenza infiammatoria , e degenera eziandio in febbre maligna . La *remittente* , che corrisponde alla *quartana* , è la più ostinata , e la più da temersi : le sue conseguenze ordinarie sono il marasmo , la febbre lenta , l'idropisia , ec. Il sudore , e la salivazione son bene spesso critici , e le urine depongono talvolta con del vantaggio .

La febbre , di cui ragioniamo , vuole un trattamento assai mite , e veggionsene ogni giorno i rei effetti cagionati da una pratica contraria : la *cavata del sangue* è appropriatissima nel principio del male ; vi è di più sommamente proficuo il *vomitivo* ; quindi gli *allentanti* , i *temperanti* , gli *amari* , ed alcune volte gli *acidi* , gli *Stomachici* , e i *carminativi* , come altresì i leggieri *diaporetici* , sono i rimedj , che pongonsi in pratica con più riuscita . La *Ghina china* non vi è sempre adattata , e dee altri singolarmente farsene paura , quando si è trascurato di rimondare le prime vie con dei lassativi , e con dei replicati clisteri : questa corteccia opera con minor pericolo amministrata in apozzema , e unita ai temperanti . E comparso alla luce non ha molto un Trattato Latino sopra le febbri intermittenti , e remittenti , che appagherà pienamente quei tali , i quali credessero , che questo nostro Articolo non fosse esteto a sufficienza .

LA PLETORA.

La vita delicata , o l'intemperanza , un sonno soverchio lungo , e l'inazione , ingenerano la *plethora* : può
la

la medesima altresì esser l'effetto del troncamento di perdite di sangue abituali, tanto naturali, che artificiali, ed anche d'alcune infermità, che son mezzi, dei quali serve bene spesso la natura per ristabilir l'equilibrio, che dee trovarsi fra i liquidi, e i vasi loro. *Queste cagioni* note posson esser considerate per li primi indizj della pletora, che si manifesta in progresso dalla *pienezza del polso*, e dal *gonfiamento delle vene*, che i varj gradi di grossezza rendono più, o meno rilevate; dal *color rubicondo* della cute, e dal *calore* di tutto il corpo, dal volto infiammato, e dagli occhi rossi, dalla disposizione alla febbre, alla flogosi, e all'emorragie, dal sopore, e dal dolore oppressivo del capo, dalle stanchezze, e dal torpore delle membra, dall'oppressione al menomo moto, che un faccia, ec. La grassezza è un segno sommamente equivoco, veggendosi bene spesso, che molte persone pingui reggono meno, che molte magre, alle perdite del sangue. Il color rubicondo della cute, sì del volto, che delle altre parti, non è un segno più certo, potendo dipendere dal temperamento, di pari che dalla pienezza dei vasi: fa d'uopo altresì distinguer dal sangue soverchio copioso, quello che non è che rarefatto dalla febbre, dall'ardor del Sole, dall'esercizio violento, dallo stravizzo di liquori spiritosi, o da ogni altro accidente. Senza esaminare in questo luogo, se la *pletora* debba collocarsi nel numero delle malattie, e soltanto aver luogo nella classe delle *cagioni*, dirò, come questo stato può risvegliare i più gravi *sconcerti*, come vertigini, convulsioni, l'apoplessia, la cefalalgia, e la più ostinata oftalmia, la febbre, degl'ingorgamenti infiammatorj, l'emoftisi, il catarro soffogativo, e molti altri malori, i quali, tuttochè in sembianti d'un carattere differentissimo, non cedono però, se non se agli ajuti medesimi, che posson far soltanto variare alcune circostanze.

Allorchè la sovrabbondanza del sangue, o della sua massa contenente la materia di tutti gli umori, non ha per anche prodotto dei pericolosi ristagni, non abbiamo altri rimedj da opporre, che la *dieta*, o l'*astinenza*, la *fatica*, o l'*esercizio*: senza lasciar di richiamare, per quanto è possibile, le abituali evacuazioni, che posson esser troncate. Si pensa bene, che negli altri casi la *cavata del sangue* la più sollecita è il rimedio migliore: tuttavia si dee temere d'inoltrarla soverchio: imperciocchè si è con gran frequenza osservato, che
il

il frequente suo uso faceva perdere ai vasi una porzione del loro tuono, e questi opponendo allora minor resistenza al volume dei liquidi, possono soffrire dei maggiori dilatamenti; siccome con grandissima frequenza si vede accadere ad alcuni di quei tali, che hanno contratto l'abito di farsi cavar sangue. Gli altri rimedj, che possono adoperarsi, debbon esser riguardati come accessori, che possono esser renduti necessarj dalla complicazione, dalla natura dei sintomi, e dalle altre circostanze della malattia: tali sono i *purganti*, e gli altri *evacuanti*, dai quali dobbiamo prometterci dei buoni effetti, allorchè avremo fatto precedere la dieta, e le cavate del sangue.

IL RISCALDAMENTO.

Questa *malattia*, intorno alla quale gli Autori sono stati in un profondo silenzio, non lascia d'essere *comunissima* fra i giovani, massime fra quelli, che sono vivaci, ardenti, e laboriosi: potrebbe esser considerata, come il *primo grado della febbre efemera*, e se le dà sovamente, come a questa, la vaga denominazione di rapprensione, o d'infreddatura. La gente volgare la riferisce perpetuamente al sangue riscaldato, e infiammato; ma i Medici informati non ignorano, che i nervi hannovi la parte principale. Le *vigilie*, l'esercizio trasmodato, l'*eccessiva fatica*, sì del corpo, che dello spirito, lo *stravizzo*, l'abuso degli *alimenti calorosi* del vino, e dei liquori, ne sono le sorgenti primarie. Gl' infermi, i quali per lo più non credono d'esserlo, si lagnano d'*oppressione*, di *mal di testa*, di *vigilia*, o d'un sonno travaglioso, ed inquieto: sentono un *ardore alla testa*, e *nelle viscere*: questo calore di rado si manifesta nell'abito del corpo; e altri s'ingannerebbe a partito, se volesse rilevarne il grado per mezzo dell'applicazione del termometro: la lor *lingua* è talvolta *aridiccia*; ma tale aridezza non è sempre congiunta colla sete: il loro polso non trovasi nel suo stato naturale, ma non è febbrile. Certuni hanno dei calori e dei sudori notturni: hanno altri lo scioglimento del ventre, e fanno le orine ardenti. Alla maggior parte di costoro manca l'appetito, stentate sono le digestioni, singolarmente disturbano il riposo della notte. La cute è talvolta coperta d'abbronzature, e d'altre fioriture. Osservansi ancora delle emorragie, l'orina sanguigna, degli sputi pure sanguigni, e similianti.

Quantunque il *riscaldamento* (*æstus morbosus*) non esse-

effere considerato, come dicemmo, pel primo grado della febbre efemera, tuttavia *desiderarsi* di vantaggio; imperciocchè sembra, che in tali circostanze la febbre sia salutare, vale a dire, un mezzo, di cui si serve la natura per dileguare la prima infermità, la quale, senza un tal cambiamento, è perpetuamente più lunga, ed anche più pericolosa. Un tale stato trascurato, o conservato per via d'una prava condotta, può degenerare in qualunque sorta di febbri, in infiammazione, ec. Non ignorano gli attenti Pratici, che ne vengono da questa prevenute per la maggior parte le infermità acute.

La *cavata del sangue*, e i *miti purganti* in questo caso servono di preparativi agli altri rimedj: tuttavia non sono sempre necessarj, massime se lo spossamento, come il più delle volte accade, trovasi unito alla malattia, di cui parliamo. Gli *umettanti*, i *rinfrigiscanti*, i *temperanti*, e i *depuranti*, sì in ptisana, che in appozzema, il brodo, o l'emulsione, sono in tal caso i rimedj più efficaci. I *cicoracei*, i *nitrosi*, e gli *acidi*, vi sono più che altro posti in opera: il *latte*, il *siero*, l'*acqua* di Vals, di Monfrin, del Meno, di Santa-Regina, di Vesoul, e altre *minerali* fredde dell'indole stessa, non sono di lieve soccorso. I *calmanti*, ed anche gl'*ipnotici*, bene spesso sono necessarj; ma non si possono amministrare con sicurezza, se non se dopo i rimedj generali, e dopo parecchi giorni di dieta. Ritraggonfi pure dei rilevanti vantaggi dai bagni, e dall'uso frequente dei lavativi.

LO SPOSSAMENTO.

Questa malattia ha molta affinità colla precedente. incontransi anzi bene spesso unite: con tutto ciò il buon metodo non ci dà libertà di confonderle: le *cagioni* della prima sono più attive, e più spediti ne sono gli effetti; dove per lo contrario quelle della seconda sono più lente, ed i loro effetti più tardi. Lo *spossamento* (*vires exhaustæ*) è per altro più pericoloso, e richiede altri ajuti: non bisogna di pari confonderlo colla debolezza, che appartiene alla sincope, e alla paralisi, malattie, che riconoscono altra origine, ed un diverso carattere, benchè possano essere la conseguenza di quelle, che fa il soggetto di questo articolo. L'astinenza soverchio inoltrata, le gran perdite di sangue, i lunghi scioglimenti di ventre, l'eccessiva fatica, lo studio trasmodato, l'abuso delle donne, e soprattutto l'*onanismo*,

vizio il più vergognoso, e il più micidiale, aprono il varco a questo male. Ha questo stato molti gradi: egli alcuna volta assai leggiero; ma sovente gravissimo, ed anche mortale. La semplice cognizione delle cagioni da noi mentovate può manifestarlo; ma se ne trae miglior contezza dai sintomi, che l'accompagnano, o dalle più gravi infermità, che ne sono la conseguenza.

L'*oppressione generale* è il segnale primario, che caratterizza lo spoffamento: le gambe non reggono sotto ginocchia, i sensi sono bene spesso immensurati, e gli *ammalati* pajono *mentecatti*. La maggior parte d'essi hanno la febbre, talvolta efemera, ma sovente più lunga, e irregolare, accompagnata da svenimenti, dal delirio, e da altri sintomi più gravi. Il *respiro* è inceppato, e interrotto: il ventre è d'ordinario indurito, e le secrezioni sospese, e questo lagrimevole stato vien terminato bene spesso dalla morte: alcune volte una *sincope* ha portato all'altro mondo quest'infermi, prima che si fosse saputo, che fosser tali. Alcuni menano una languida vita, il cui evento è dubbiosissimo. Ve ne sono di quelli, che hanno delle *mortali emorragie*: io ne ho avuta alle mani una per la verga, che mise l'infermo all'agonia. Quello, che ho detto non, ha rapporto che all'ultimo grado di spoffamento: si dee supporre, che ve ne abbiano molti a questo inferiori, i cui accidenti sono meno formidabili: per altro la natura della cagione, che produce lo spoffamento, lo rende più o meno pericoloso; sicchè una tale infermità dee comparire in iscerena con delle gran varietà, e si stenterebbe grandemente a rilevarla, se non si fosse al fatto di ciò, che l'ha preceduta.

Lo *spoffamento* vuole una molto mite medicatura: non pensi altri di richiamar le forze con dei cordiali, o con degli analeptici, nè con altri rimedj: l'arte dee operarvi meno che il tempo, e la natura, fiancheggiati dal *riposo del corpo*, e dalla *tranquillità dello spirito*: può anche contribuirvi molto il mutar aria. Non occorre, ch'io dica esservi necessarj *buoni alimenti*; ma la febbre, e lo stato dello stomaco non ne permettono sempre l'uso; di modo che dobbiamo applicarci a dileguare il primo incomodo, e a ristabilire, e ricovrare le funzioni dell'altro. Appunto in questo caso posson convenire i più miti *purganti*, e gli *stomacici*: per trovar de' buoni alimenti niuno trovan imbarazzato: tutti conoscono le

gelatine, i consumati, i sughi estratti, il cibo bianco, ec. ma pochi fanno il modo di distribuirgli adeguatamente, con rapporto alle diverse cagioni, che han prodotto lo spostamento, e alle circostanze, che l'accompagnano. Si giudica rettamente, che non debbonfi trattare nella stessa guisa quei, che sono estenuati, e quelli, che hanno conservata la loro grassezza: i primi temono qualsivoglia evacuazione, ed i secondi vi resistono meglio: i primi debbon per lungo tempo far uso d'un buon nutrimento: i secondi non abbisognano che d'uno leggero. I medicamenti noti sotto la denominazione di *fortificanti*, sono spesso incendiarij, nè convengono ai primi, nè ai secondi, qualor non fosse per riparare ad alcuni accidenti forestieri alla malattia: fa d'uopo eccettuarne la *China*, ed i *Marziali*, quando una tal malattia è stata contratta per una soverchia emissione spermatica: se ne troverà la prova nel dotto Trattato datici dal Signor Tiffot, sopra l'*onanisme*. La cavata del sangue non è meno da bandirsi: nulladimeno segue talvolta, che lo stato della testa, la violenza della febbre, o l'emorragie, la richieggano; ma uno non dee praticarla, se non con estremi riguardi. Non vi si addicono gran fatto di più i *purganti*; ma tuttavia vi si dee ricorrere, quando si è dato luogo col soverchio nutrimento a delle indigestioni; le quali in queste circostanze posson esser micidiali, siccome si è pur troppo provato. È inutile il dire, che quando questa infermità dipende da stravizzo, da eccessiva fatica, ec. non si può guarirla, se non con una condotta contraria.

L' A N E M I A .

Questa infermità (*anemia*) che si può prendere per lo spostamento dei vasi sanguiferi, e di cui non se n' è fatta quasi dissi, menzione alcuna dagli Scrittori, tuttochè ella sia molto comune, non si manifesta, che per l'*apertura dei cadaveri*. Le occasioni, che mi si sono offerte, d'osservarla, non mi permettono di porla in silenzio; ed io son tanto più disposto a favellarne, appunto perchè altri cercherebbe indarno d'illuminarsene altrove. Ella non è agevole a conoscersi: si può sospettarla con fondamento bastevole dopo le *lunghe astinenze*, o dopo le *grandi perdite di sangue*, non meno per la flebotomia, che per l'emorragie: ma simiglianti apparenze alcuna volta ingannano, vedendosi assai sovente, come la man-

canza di nutrizione in alcune costituzioni, ove le secrezioni trovansi come sospese, non isfianca i vasi sanguiferi, e che sonosi anche in tale stato sofferte delle cravate di sangue, che si è stati forzati d'opporre alla febbre, la quale sopravveniva talvolta con molto empito: rispetto alle perdite del sangue, anzichè diminuir sempre il volume di questo liquido, esse danno luogo alcuna fiata, come accennammo, alla pletora, per la sopraprendente prontezza, colla quale in alcuni soggetti può il sangue rigenerarsi. E' ancora più malagevole il conoscere lo stato, di cui parliamo, allorchè non è stato preceduto, nè dall'astinenza, nè da alcuna perdita di sangue, e che riconosce la sua origine in un vizio degli organi della digestione, o della sanguificazione; siccome io l'ho osservato in alcuni cathetici, singolarmente in fanciulle, che per lungo tratto di tempo erano state soggette al pallor dei colori, col troncamento delle regole; circostanza, che merita d'essere osservata.

Questo è ciò, che mi è venuto fatto di raccogliere dai segni di questa malattia confermata coll'ispezione anatomica. I pazienti per la maggior parte trovansi in uno stato di languore, e di debolezza, che a stento permette loro lo stare in piedi: l'appetito manca loro totalmente: hanno comunemente lo scioglimento del ventre, oppure il diabete: alcuni sudano enormemente di, e notte. Tutti hanno frequentissimi svenimenti, ed anche delle sincope il più delle volte mortali. Il lor volto, e tutta la cute son d'un color cadaverico; le lor gambe si gonfiano, e seguono degli stravasamenti di serosità in diverse cavità. I pazienti vivono d'ordinario inquietissimi rispetto alla lor sorte, ed abbandonansi ad un'invincibile malinconia. Alcuni sentono dei fischj entro le orecchie, e dei disturbi nell'animo, che non gli permettono la menoma applicazione. Se aggiungasi ai divisati segni l'istoria di ciò che è preceduto, si può avere con molta certezza qualche contezza di questo morbo: ma bisogna confessarla, questi segni, e questi forieri non s'incontran sempre, e non trovansi tampoco alcuna volta sopra che fondare una semplice congettura.

Quei tali, che non son versati nell'ispezione anatomica, stenteranno a credere fino a qual segno i vasi possono esser vuoti di sangue: io ho veduto dei cadaveri, di quali si era aperta la testa, il petto, e il basso ventre così aridi, come fossero stati di cera: i mezzani, ed i pic-

piccioli vasi non contenevano goccia di sangue, i grossi erano mezzo vuoti: sì negli uni, che negli altri vedevavisi molta aria, ch' era singolarmente manifestissima nei vasi del cervello, più disimpegnati, e più diafani di quelli delle altre parti: pareva, che non avessero contenuto sangue in una ragazza, che morì d'improvviso; e che, non so per qual ragione, era stata sottoposta a più di cento cavate di sangue nel decorso d'un anno. Il più sorprendente caso di questo genere, che siammi passato per le mani, è quello d'un uomo di 45. anni, che morì d'una sincope, quando altri meno se l'aspettava: gli era stata fatta una prodigiosa cavata di sangue per una malattia acuta, che aveva provato un mese prima: dopo questo tempo erasi trovato in uno stato di languore, ed il suo stomaco non faceva le sue funzioni a dovere: tuttavia mostrava di ricovrar le forze e il colore, quando questo accidente, che non fu preceduto da alcuna fumata, lo tolse dal mondo: a stento vi troviamo alcuni vestigi di sangue nei vasi del cervello: il cuore non ne conteneva goccia, e tutte le incisioni si fecero a secco.

Non merita il pregio il mentovare tutti i *rimedj*, che si son dati a coloro, che son morti di questa infermità. Lo stato della maggior parte di quelli, che sono stati salvati, non è stato confermato con certezza: non vi sono stati che alcuni casi, nei quali non è stato pur anche permesso il dubitarne: sopra lo stato di questi ultimi, singolarmente io ho potuto giudicare, che bisognava bandire tutti i *rimedj*, a riserva di quelli, che son più acconci a ristabilire le digestioni, ed a fortificar gli organi. Ho veduto dei buoni effetti dal *rabarbaro*, dai *marziali*, e da altri *tonici*; ma il punto principale consiste nel fare una retta *scelta degli alimenti*, che abbiamo proposti nell' articolo dello Spoffamento, e nel regolarne la quantità a proporzione della forza dello stomaco. L'*esercizio piacevole*, i viaggi, e il *divertimento*, per quanto n' è capace l' infermo, mi son sembrati appropriatissimi a questo stato. Fa d'uopo osservare, che questo male di rado è semplice, e ch'è quasi sempre complicato: lo che offre delle difficoltà, che non si possono formontare, se non a forza di gran cognizioni, e di molta sagacità.

SCOLI SORPRESSI, E FIORITUNE CUTANEE RIENTRATE.

Non vi ha malattia più comune di quelle, che fanno

il soggetto di questo Articolo : esse meritano l'attenzione più intensa; poichè e chi sa, che il *corso troncato delle naturali iscrezioni*: il *seccamento degli sgorgi marciosi*, e altri: il *regresso delle fioriture cutanee*, o d'altra natura costituiscono uno stato miserabile, che può esser seguito dai più funesti accidenti? E' noto, che la traspirazione impedita apre il varco alla febbre, il più delle volte esserale, a dolori, a flussioni, a scioglimenti di ventre, a infiammazioni, e perfino a cancrene: che gli sputi soppressi, tanto nelle infermità acute, che nelle croniche espongono i pazienti ai più gravi pericoli. Noti sono gli sconcerti cagionati dalla soppressione delle orine: siamo perfettamente instruiti delle stragi, che d'ordinario producono la bile distorta dalla propria sua strada. Non s'ignora somigliantemente, che ci dà grandemente da temere il cessamento de' *menstrui*, de' *lochj*, delle emorroidi, delle abituali emorragie, delle suppurazioni stabilite, come di diversi scoli, e stillamenti degli occhi, del naso, della bocca, delle orecchie, dell'ano, delle parti genitali, della testa, delle ascelle, dei piedi. ec. Accade pertanto ogni giorno, che si trattino gli accidenti che dipendono da questi stati, senza pensar gran fatto alla cagion principale, la qual sola dee riunire tutte le cure nostre. Tuttochè ci proponghiamo di rimettere ad altri Articoli ciò, che riguarda la traspirazione rattenuta, il ventre indurito, la soppressione degli sputi, il troncamento delle orine, della bile, de' *menstrui*, dei *lochj*, dell'emorroidi, ec. non lasceremo però di collocare in questo luogo alcune osservazioni intorno ai casi meno comuni, o che non appartengono agli Articoli pure ora indicati: tali sono il cessamento delle emorragie abituali, il *seccamento delle ulcere*, sì naturali, che artificiali, e la soppressione di *varj scoli*, stabiliti in parti diverse.

La cessazione delle emorragie abituali apre sovente il varco a delle febbri acute, alla cefalalgia, all'oftalmia, a mali di gola, all'angina, alla resipola, all'oppressione all'emoftisi, alle infiammazioni interne, massime alla pleuritide, e alla peripneumonia, e ad altre più gravi infermità, che si possono prevenire rimediando alla plethora con li da noi additati mezzi. Le ulcere seccate espongono a conseguenze, le quali, sebben più lente, non riescono meno funeste, qualora per mezzo dei rimedj più familiari, non si richiami la suppurazione, che il tempo ha

ha renduta necessaria all'animale economia , o se non vi si supplisce speditamente per mezzo di nuove ulcere artificiali : per questi mezzi notissimi si può dilungare il trasferimento della materia purulenta verso il fegato , il polmone , il cervello , ec. Le *cavate del sangue* , i *purganti* , i *diuretici* posson pure metter altri al coperto dei divinati accidenti , essendosi talora osservato dei buoni effetti dalle emorragie , e sonosi assai spesso vedute le fecce , e le orine cariche della materia marciosa . Non ci dà tanto da temer la *soppressione degli altri sfoghi* , che non sono nè sanguigni , nè purulenti : tuttavia è pur troppo noto , che posson produrre molte stragi , le quali si prevengono per via delle più familiari evacuazioni ; vale a dire , le *cavate di sangue* , i *purganti* , i *diuretici* , i *sudorifici* , ed i *salivanti* : ma il mezzo di tutti il più sicuro si è quello di richiamar l'umore verso la parte , alla quale si portava per innanzi ; avvegnachè gli altri mezzi sieno per lo più infruttuosi , siccome si è più , e più siate veduto in coloro , che si son voluti liberare imprudentemente del sudor de' piedi , e che in questa occasione hanno provato delle vertigini , dei tintinni d'orecchie , della difficoltà di respiro , delle cardialgie , delle intensissime coliche , dei dolori vaghi in tutte le membra , ed altri accidenti , che non è stato caso di far cessare , se non se richiamando il sudore a quella parte , ove usciva per innanzi . Il caldo del letto , e la dieta , con alcuni *allentanti* , e *diaforetici* , bastano il più delle volte per rimediare agli sconcerti , che risultano dalla *traspirazione troncata* . Finalmente il trattamento , che si addice ad ogni sorta di scolo abituale soppresso , non consiste che nel ristabilirlo nella parte medesima , o nel supplirvi con altre evacuazioni . E' pure sommamente proficuo l'uso dei *depuranti* , perchè può soddisfare le mire medesime . La *cavata del sangue* è incontrastabilmente necessaria nella soppressione delle emorragie : lo stesso non è degli altri casi ; tuttavia siamo forzati a farne assai frequente uso per riparare agli accidenti , che possono accompagnarli .

Ciò , che detto abbiamo , può a un di presso applicarsi alle *fioriture cutanee* , e ad altre : si sa , che il loro regresso nelle infermità acute , come la rosolia , il vajuolo , la febbre resipelacea , la scarlattina , la porpora , e simiglianti , minaccia degli accidenti , i più terribili , se altri non si prende cura di prontamente richiamare

queste fioriture, con dei *diaforetici*, dei *bagui caldi*, devescicanti, ed altri mezzi noti. Quanto alle *eruzioni croniche*, come la rogna, la tigna, le volatiche, ec. tuttochè il seccamento loro non esponga ad un pericolo così imminente, non si lascia però d'esserne grandemente inquieti, poichè si sa pur troppo, che ne seguono molti accidenti, i quali in alcune circostanze possono esser funesti; poichè sonosi in tale occasione vedute delle febbre d'un reo carattere, delle convulsioni, l'epilessia, l'oppressione, dolori di testa, e d'intestini, la cecità, la sordità, ec. Laonde si procura di prevenire siffatti malori per mezzo, non meno d'*evacuanti*, di *depuranti*, e d'altre tri rimedj interni, che coll'applicazione dei *cateretici*, quali richiamando alla cute la materia, che aveva l'uso di portarvisi, l'involano alle parti interiori. Non parleremo in questo luogo della gotta rimontata, e di alcuni altri casi, i quali potrebbonsi collocare sotto questo titolo: noi gli riserviamo per altrettanti articoli particolari, ch'è più naturale il consultare.

I DOLORI.

Sa chicchezza, come i denti, le orecchie, lo stomaco, gl'intestini, i reni, ec. provano i più acuti dolori; che il fegato, il polmone, la milza, e le altre viscere, sono la sede di dolori, che non fanno sentirre colla violenza medesima: che quelli, i quali occupano le parti carnose, e membranose, sono il sintoma più familiare della gotta, del reumatismo, del mal francese, dello scorbutto, della cachessia. ec. Si sa altresì, che distinguonsi i dolori dal diverso senso, che eccitano, come quello di gravezza, di pulsazione, di pungimento, d'erosione, di calore, di prurito, ec. Il *dolore aggravativo* investe con frequenza la testa, e le viscere del basso ventre, ma singolarmente i reni: la testa è ancora la sede dei *dolori pulsativi*; ma accompagnano più particolarmente la formazione della marcia; e i lanciamenti, che provansi in tal circostanza, manifestano la malattia meglio di qualsivoglia altro segno: i *pungitivi* afferrano le parti membranose, e sono tanto più vivi, quanto più tesse trovansi queste parti: la pleuritide, la sciatica, la colica, le *spine ventose*, ec. ce ne somministrano bastanti esempi; il *dolor corrodente* ci annunzia le esulcerazioni: le budella, e la matrice ne sono attaccate con più frequenza: l'*abbrugianie* è osservabilissimo nelle respo-

le: il *pruriginoso* appartiene singolarmente ai malori della cute. Vi ha pure dei *dolori ottusi*, che più frequentemente investono le parti dei precordi, sotto la denominazione d' *ansietà*. Non vi ha cosa più comune dei dolori d' *intirizzamento*, e di *granchio*: le *inquietudini notturne*, che fanno sì principalmente sentire nelle inferiori estremità: i dolori di *solletico*, che sentonsi vivamente alle piante de' piedi, al contorno cartilaginoso della cassa del petto, ec. per non parlare di quelli, che vengono dalla pressione, dalla contusione, dal distendimento, dalle piaghe, dalla scottatura, dal freddo, ec. Tutte queste varietà, com' è agevole il rilevare, dipendono, tanto dalla struttura della parte, come dall' indole della cagione irritante.

Il *dolore*, siasene quale esser si voglia la sede, di rado è essenziale, o indipendente da ogni altro stato; ma d' ordinario il sintoma d' alcuna malattia acuta, o cronica. Se nella prima i dolori sono continui, sì nel petto, che nel basso ventre, si dee temere l'ingorgamento, l'infiammazione, la suppurazione, e la cancrena: non segue lo stesso di quei, che occupano le parti esterne di queste cavità, e che talvolta possono annunziare un moto critico nel corso della malattia. Gli uni, e gli altri, che non sono nè permanenti, nè fissi, dipendono da una semplice affezione dei nervi, che si è creduto bene d' appellare *spasmo*: fa la sua parte, non solo nelle infermità croniche, ma eziandio nella sanità più perfetta. Importa molto il non dimenticare, che i dolori più frequenti, i quali accompagnano i morbi abituali, dipendono il più delle volte da quattro principali malattie, che non debbon si perder d'occhio: tali sono il *reumatismo*, la *gota*, lo *scorbuto*, e il *mal francese*, delle quali si vedranno indispensabilmente gli Articoli. Questa però non è la sola sorgente de' dolori vaghi, e irregolari: possono i medesimi essere risvegliati dalle passioni d' animo, dalle affezioni convulsive, da quelli, che nascono dalla traspirazione troncata. ec. S' incontrano altresì nei morbi cronici dei dolori, che dipendono da ostruzioni, da tumori, e da altri sconcerti dei solidi, come anche dalla presenza d' un corpo eterogeneo, ec.

Non vi è cosa più malagevole del formare un retto giudizio intorno alla natura di certi dolori. Si stenta bene spesso a decidere della sede degl' interni, e talvolta sono impenetrabili le loro cagioni: nulladimeno si
fa,

sa , che si debbano poco temere nel tempo della febbre : dolori , che occupano la testa , il dorso , e le estremità che quasi sempre dileguansi , allorchè si dilegua la febbre : sono anche i medesimi talvolta di buono augurio : se s'imbattano nel tempo della concozione : quegli , cagion d'esempio , delle tempie , del collo , e degli occhi , annunziano un'emorragia critica . I vaghi per tutte le parti interiori presagiscono alcuna fiata delle evacuazioni , e delle eruzioni salutari : è noto , che quei dei lombi precedono lo sgorgo dei menstrui , delle emorroidi , ed il flusso d'orina : i dolori di testa , che sono violenti , e continui , vanno talvolta a terminare nel soporimento , e nel delirio . Abbiamo detto , che i *dolori interni* accompagnavano comunemente gli stivamenti , le flogosie , le suppurazioni , e la cancrena : deesi soprattutto temere quest'ultimo accidente , allorchè un dolore intenso cessa in tronco , senza manifesta cagione . Gli *intermittenti* sono perpetuamente manco pericolosi , che i *continui* : si teme ancora meno di quegli , i quali cambian luogo , che de' fissi : fa però d'uopo eccettuarne gli esterni , che si gettano sopra le viscere , come segue talora nella pleurite , de spuria , nella gotta , nel reumatismo , ec. fa anche di mestieri osservare , che *la sede del dolore* non è sempre quella del male : si fa , che quel della testa dipende assai fiata dal pravo stato dello stomaco : che le ostruzioni del basso ventre eccitano talvolta dei dolori al collo , ed al petto : che l'irritamento della vescica si fa sentire alla punta della verga : che alcune affezioni delle budella lontanissime dall'ano danno sovente il tenesmo , ec. Le osservazioni anatomiche confermano tutti questi fatti .

La medicatura dei dolori offre alcuna volta molta difficoltà , allorchè vuolsene rintracciar la cagione , e investirela : ma rare volte uno si dà a fare simigliante ricerca , e non si ha cura che di palliarli , o di sopirgli , fino a che il tempo , e la natura abbiano fatto il rimanente . Gli *addolcenti* , gli *umettanti* , i *rilascenti* , i *calmanzi* , e i *narcotici* , producono questo effetto : ma questi ultimi non s'addicono , nè agli stivamenti , nè alle infiammazioni , ed ancor meno quando si ha motivo di sospettare la cancrena : non se ne dee tampoco far uso nella gotta , e nel reumatismo , anche esteriormente . Non ne è lo stesso degli altri , che sono somnamente proficui in tutte le sorte di dolori , o se ne faccia uso interiormente ,

te, o s' applichino eternamente: abbiain detto altrove, come i dolori intermittenti regolari potevano esser medicati coila China, e con gli altri febrifughi: ma altri non vi si dee determinare leggiermente, perchè uno vi si può ingannare. La *revulsione*, che ha per oggetto il richiamare in altra parte il sangue, gli umori, o la materia delle sensazioni, è di più molto in uso, e accompagnata da grandissima riuscita: questa si effettua coll' evacuazione, e coll' irritamento: la *cavata del sangue*, l'applicazione delle *mignatte*, le *copperte a vento*, e a taglio, i *vescicanti*, e i *caustici*, sono i mezzi per lo più messi in opera, ed i più approvati. Il *Moxa*, quel rimedio tanto vantato, e sì trascurato fra noi, può pure far gran bene in questo caso. Si può ottenere il vantaggio stesso dalla semplice *immersione de' piedi* nell' acqua calda, o colle *fregagioni delle gambe*: si vede talvolta, che in eccitando queste leggiere sensazioni si dileguano dei mali di testa, che hanno deluso i rimedj più potenti. Nulladimeno fa d' uopo, per quanto è possibile, investigar la sorgente, assaiissime siate *occultissima*, dei dolori: esaminare, se dipendano da vizio locale, che esiga altri ajuti, se partecipino delle infermità principali da noi già nominate, finalmente se s' aspettino alla chirurgia, come nelle lussazioni, nelle fratture, negli storcimenti, nell' ernie, nelle piaghe, e simiglianti.

FLUSSIONI CATARRALI.

Note sono a chiccheffia le flussioni, che si gettano sul capo, e sul collo, nel naso, e nelle orecchie; alle labbra, ai denti, e alla gola; sulla laringe, su i bronchi, e sul polmone: ma la maggior parte non sa, che hanno altre sedi, lo che tanto più importa il saperli, quanto sono perpetuamente, sebbene sotto diversi aspetti, accompagnate dalla medesima sorta di febbre, che il più delle volte si medica, senza tampoco sospettarne il carattere. Le *flussioni* cominciano d' ordinario da vicende di freddo, e di caldo: la febbre dura più giorni con maggiore, o con minor violenza: ora ell' è continua, ora intermittente, e accompagnata da oppressione, da ansietà, e da disgusto: i dolori, che fanno sì sentire alla parte affetta, par, che si spargano per tutto il corpo. Formansi in tali circostanze degli stivamenti, e delle infiammazioni: oppure stabiliscono degli scoli, e delle evacuazioni più, o meno copiose. Le flussioni degli occhi, del-

del naso, delle labbra, e della gola sono patenti alla vista: dal suono della voce, e dalla tosse si argomenta ciò, che segue nella trachea-arteria, e nel polmone. La relazione dei pazienti svela i dolori del capo, del collo, delle orecchie, ec. Veggionsi ancora dei tumori e delle deposizioni nel volto, nel collo, e nella bocca. Tutte queste spezie di flussioni non debbonfi gran fatto temere, tuttochè molto reo sia alcuna volta il primo loro periodo; ma questo tempo non arriva allo spazio di due intieri giorni: la febbre però può persistere di vantaggio, edeziandio prolungarsi fino al duodecimo, o al decimoquarto giorno. Tali sono le *flussioni semplici*, e le più note: ma ve ne sono di quelle, che mostrano d'esser d'altra natura, per non parlare dei mali di gola cancerosi, e delle febbri catarrali maligne: veggionsi bene spesso delle angine, delle infiammazioni nel polmone, e nella pleura, delle resipole nel volto, dei reumatismi, e perfino degli attacchi apopleatici, che riconoscono l'origine stessa, tuttochè non vi si faccia d'ordinario la menoma attenzione: eppure importa sommaramente l'esserne avvertiti, avvegnachè una tal contezza debba grandemente influire sopra il trattamento, di cui la *febbre catarrale*, perpetuamente la stessa, è l'oggetto principale. Diremo anche di passaggio, che non si dee porre nella classe delle flussioni il catarro soffogativo, il quale, ad onta della sua denominazione, non ha la menoma affinità colle infermità, delle quali parliamo.

Si è generalmente persuasi, che la *traspirazione troncata* dall'azione dell'aria fredda apra il varco a tutte le flussioni; ma non sembra deciso, che non s'insinuino per le porosità della cute una materia eterogenea, più atta a produrre gli effetti varj, de' quali abbiamo favellato, di quello lo sia un semplice umore imprigionato, che può fuggirsene con molta facilità, come lo ci dimostra ogni giorno l'esperienza, per le strade delle urine, del secesso, o per altri scolatoj. Eppure non si vede, che le flussioni, tuttochè più frequenti, e più ree nel verno, corrispondano al grado del freddo, che ci viene additato dal termometro: non vi è chi non sappia, che si va ogni giorno acquistando al sole, negli appartamenti più caldi, e nello stesso letto: è noto altresì, ch'elleno son più comuni in un luogo, che in un altro, indipendentemente dalla temperie dell'atmosfera, e che dominano alcuna volta nelle stagioni più belle

le con estrema violenza . Sembra adunque evidente , che le flussioni dipendano da una *particolare costituzione dell'aria* , che non riconosce nè il freddo , nè il caldo : vero è , che il primo rende più attiva questa materia , ed i suoi effetti d'ordinario più lunghi , e più rei . Finalmente la malignirà , che sovente accompagna i mali di gola , come le flussioni sopra il polmone , non lascia luogo di dubitare , ch' esse non vengano da una cagione straniera al grado del calore dell'aria , e che non v'abbia minor parte la traspirazione troncata , che l'insinuamento d'una materia venefica , valevole a produrre i più gravi sconcerti . Coloro , che vorranno prendersi la briga di studiare la storia , che ci è stata dritesa di varie *epidemie* relative al nostro soggetto , non prenderanno questa nostra asserzione per una ipotesi ; ma la riceveranno per lo contrario , come un risultato delle più meditate osservazioni , e dei fatti più accuratamente verificati .

Se le flussioni dipendono dall'*insinuamento della materia eterogenea* per le porosità della cute , o del polmone , come sembra , che segua da ciò , che abbiamo divisato , si dee presumere , che l'evacuazione , che si farà per la medesima strada , sarà la più atta a depurare la massa degli umori : così ci fa vedere ogni dì l'esperienza , come il sudore , o il *sudore* contribuiscono più di qualsivoglia altra cosa alla *guarigione* di questo male . Provansi di pari de' buoni effetti dall'evacuazione , che si fa pel ventre , sia ella naturale , o procurata per mezzo di clisteri , e di lassativi ; ma si dee condurla in guisa , che non frapponga un ostacolo all'altra . Si è anche talora veduto , che lo scioglimento di queste malattie seguiva per le orine , le quali facevanfi allora sommamente cariche . Gli *addolcenti* , gli *al-lentanti* , gli *umettanti* , ed i *miti diaforetici* , secondati dal caldo del letto , e dalla dieta , sono i rimedj i più appropriati a questo male . Allorchè si è bene stemprato il sangue , si può far uso della *iriaca* , e delle altre *confe-zioni* cordiali , e calmanti , delle quali in alcune epidemie sonosi veduti prodigiosi effetti . Vantaggiosissimo è pure l'uso dei *narcotici* : ma questi debbon trovar libere , e sbarazzate le prime vie ; e debbonsi bandire , quando la testa è pesante , e che l'infermo ha il ventre indurito , o se trovisi in età avanzata . Vi sono dei grandissimi dubbj rispetto alle *cavate del sangue* : si è più fiate provato , come non solo non vantaggiavano la gua-rigio-

rigione di questo male, ma che anzi lo prolungavano: si è anche rilevato in alcune epidemie, che riuscirono mortali. Tuttavia, siccome non vi ha regola senza eccezione, non si potrebbe fare a meno di non ricorrervi, allorchè lo vogliono assolutamente la veemenza della febbre, gli stivamenti infiammatorj, l'oppressione, ed altri accidenti: ma se ne dee sempremai far un uso discretissimo. Facciamo di meno di parlare in questo luogo di parecchi rimedj, i quali convengono soltanto ad alcune specie di flussioni, mentre ne parleremo nei loro articoli rispettivi.

LA CACHESSIA.

E' questa la più comune, e per avventura la meno schiarita di tutte le croniche infermità: vien ella riguardata, come il *depravamento degli umori*, di cui par, che sieno la principal sorgente le digestioni viziate. E' noto, come l'aria cattiva, e gli alimenti grossolani, possono spianar la strada alla *Cachessia*, che in tal caso è indipendente da ogni altro morbo: ma ella è comunemente l'effetto, o il prodotto dello scorbutto, degli stivamenti scirrofi, dei corrompimenti, delle deposizioni purulente, o anomale, e d'altri sconcerti, sì nel petto, che nel basso ventre. Ella è altresì la conseguenza dell'eccessive emorragie, o delle frequenti cavate di sangue, della soppressione di sgorgi di sangue abituali, della febbre quartana, e d'altre ostinate intermitenti, o mal medicate. L'affinità, ch'ella mostra d'avere colla leucostemmazia, non è stabilita, che sopra la disposizione, in cui uno trovasi, di passare dall'una nell'altra: i colori pallidi non debbon confonderli colla *Cachessia*: si fa, che il matrimonio risana da questo male, e che rende più reo il secondo: molto male a proposito pure, vien riguardata l'itterizia, come la *Cachessia*: diversi sono i loro caratteri, potendosi guarir l'itterizia in brevissimo tratto di tempo; dove per lo contrario la *Cachessia* vera non piega la testa, se non ad una lunghissima medicatura: molti ancora prendono lo scorbutto per l'ultimo grado della *Cachessia*; eppure veggonsi molti scorbutici, che non hanno alcun segno di questo morbo. La *faccia livida*, verdastria, o piombina, il *pallore* di tutto il corpo, la *magrezza*, o una leggiera *enfagione* più rilevabile nel volto, nelle palpebre, ed alle estremità, caratterizzano a sufficienza la

Cachessia : il polso è allora lento , e picciolo , bene spesso febbrile verso la sera : al menomo esercizio provansi delle oppRESSIONI , e delle palpitazioni : gl' infermi cadono nella *svogliatezza* : dopo il pranzo son molestati da flatuosità , i loro ipocondrij sono elevati , e tesi , e le loro urine torbide , e bianchicce . La stanchezza , e la debolezza , che provano , dispongonli all'ozio : son molto suscettibili del freddo : il loro *spirito* è *torpido* , ed il loro sonno d'ordinario profondo : verso la sera gonfian loro le gambe , ed alcuna volta l' edema non si dilegua ; finalmente soppravvengono ad alcuni delle floriture cutanee di natura diversa .

Questa malattia , siasi ella primitiva , o la conseguenza d'alcun altro morbo , si sana con molta agevolezza : ma non è lo stesso di quella , che vien mantenuta dal reo stato delle viscere . La *Cachessia* è tanto più *ostinata* a cedere agli ajuti ordinarij , quanto più lentamente si è avanzata : per lo contrario ella piega in brev'ora , allorchè si è presentata bruscamente : è inutile il dire , che la natura del morbo , di cui ella è il sintoma , ne rende la guarigione più , o meno malagevole , ed alcuna volta impossibile . Quando ella è un accidente della febbre quartana , o d'ogni altra intermittente , non vi è cosa , che la dilegui con maggior felicità , del ritorno della febbre . L'atrofia , massimamente nei vecchi , lo scorbutico , e l'idropisia , sono le ordinarie conseguenze della *Cachessia* , la quale , indipendentemente da queste infermità , occulta i più atroci sconcerti interni , e quasi sempre funesti .

Le *dissezioni anatomiche* , ove noi facciamo entrare tutte le nostre osservazioni , hanno manifestato un sangue colloso , fisso , e riarso , e che talvolta compariva ghiaroso nei vasi del fegato : le viscere aride , lacere , scirrosc , in uno stato di putrefazione , cariche , di pari che i loro vasi , di tubercoli scirrosc , e d'idatidi , di deposizioni purulente , di tumori anomali , con delle carie alle costole , e alle vertebre ; degli stravasi serosi , fetidi , e purulenti . Osservansi comunemente questi sconcerti nel basso ventre , talvolta nel petto , di rado nella testa . Trovasi con frequenza il fegato bianchiccio , livido , piombino , chiazzato , la sua superficie piena di tubercoli , e bernoccolata , il suo volume , o diminuito , o enormemente ingrossato , con delle deposizioni entro la sua sostanza piena d'idatidi . La cistifellea è piena
affai

affai spesso d'una bile nera, o di concrezioni biliose: si è anche trovata piena d'una dolcigna serosità. La milza si è trovata ora d'un volume mostruoso, ora ridotta alla grandezza d'un uovo di colombo, indurita, pietrosa, e lacerata. L'epiploon si è trovato putrefatto, distrutto, o scirroso, con maggiore spessezza: il pancreas, e il mesenterio stivati, e suppurati; ed il primo si è perfino trovato inaridito, e totalmente distrutto. Sonosi pur vedute delle suppurazioni, dei contrompimenti, delle pietre, e della renella nei reni. Nel petto sonosi scoperte, oltre gli sconcerti cagionati dalla marcia, delle fortissime adesioni, non meno fra il polmone, e la pleura, che fra il cuore, e il pericardio: in alcuni questo sacco conteneva una gran quantità d'acqua, oppure un liquore sanioso. Il petto ci ha pur presentato il cuore d'una prodigiosa grossezza, i suoi ventricoli rifeccati, o pieni di concrezioni polipose, di durezza petrose negli orifizj arteriali, e nelle loro valvole. Ultimamente si sono trovati nella testa, sebbene di rado, degli stravasamenti di sangue, e con maggior frequenza delle inondazioni serose, e saniose.

La Cachessia mantenuta dalla presenza d'un altro morbo, dee essere riguardata soltanto come un accidente: che si dileguerà, allorchè si farà posto riparo alla cagione, che lo mantiene; ma quella, che n'è la conseguenza, o ch'è primitiva, vuole una medicatura particolare. Quando ella dipende dalla soppressione menstruale, dalle emorroidi, o d'altri sgorgi abituali di sangue, non si può vincerla, se non se dopo avergli richiamati, od avervi supplito con delle cavate di sangue. Nel caso contrario, cioè, se l'emorragie eccessive hanno fatto precipitare in questo stato, più dee aspettarsi dal tempo, e dalla natura, secondati da alimenti bene amministrati, che dall'uso dei rimedj. Se il regresso della ragione, o d'alcun'altra eruzione l'ha cagionata, si ricorrerà a quei rimedj, che poc' anzi abbiamo additati.

Non vi ha cosa, che tanto contribuisca a ricovrarli gli umori depravati, quanto l'attenzione, che uno fa alle digestioni, amministrando a dovere gli *emetici*, *purganti*, sieno questi miti, sieno idragoghi, ed i *fortificanti stomachici* fiancheggiati da un ben inteso governo, da un esercizio piacevole, dalla mutazion d'aria, qualora quella, in cui si vive, sia sospetta: e vi sono anche proficue le fregagioni. Dopo questi preliminari,

nari, i Pratici costumano d'amministrare i *temperanti*, gli *epatici*, e gli *amari*: non si trascura in simigliante occasione il rabarbaro, il cremor di tartaro, l'*arcanum duplicatum*, ec. Gli *aperitivi*, i *diuretici*, ed i *sudorifici*, vi posson essere impiegati, di pari che i *depuranti*, e gli *antiscurbutici*: molti servono con riuscita dell'*antimonio diaforetico*, oppure dell'*anti-ettico* del Poterio. Quanto ai *marziali*, ed ai *fortificanti*, non si potrebbero mai raccomandar quanto basti, dopo che si son fatti precedere gli altri rimedj. Le acque di Crausfac, di Vichy, di Bagnieres, di Coterès, di Sant'Amando, d'Aix, de la Motte, ed altre *minerali* a queste analoghe, sono in questo caso d'un ajuto grande, di pari che le *ferrate*, come quelle di Forges, di Passy, ec. Del rimanente non sono in verun conto da imitar coloro, i quali, formandosi una falsa idea di questo male, e seguendo ostinatamente i loro principj, non conoscono altri mezzi curativi, che i purganti, e i diuretici: rimedj, i quali, tuttochè sieno talvolta proficui, non lasciano però d'essere bene spesso in estremo dannosi. Vuole finalmente la Cachessia una *medicatura saggia*, e moderata: conciossiachè non ci dobbiamo dimenticare, ch'ella dipende assai volte incontrattabilmente da un vizio locale, al quale non si potrebbe riparare in alcun modo; e che i rimedj, che ciecamente si danno in questo caso, altro far non possono, che precipitar gli ammalati.

L O S C O R B U T O .

E' questa una specie di *cachessia putrida*, la quale nella maggior parte dei paesi settentrionali, e nei luoghi umidi e bassi è epidemica: è comune fra i marinari, fra i soldati, e le persone plebee, che si nutrono d'alimenti grossolani, ed alle quali mancano le cose più necessarie alla vita. Tuttavia quei tali, che vivono colla maggior delicatezza, ed i fanciulli di tutti gli stati, non ne vanno al coperto. I Letterati vi sono grandemente sottoposti: è ancora la conseguenza delle gravi infermità, di pari che della tristezza, e della melancolia, inseparabili dall'affezione ipocondriaca, di cui lo scorbutto passa per l'ultimo grado, tuttochè siane spesso indipendente, massime quando il contagio, o altre cagioni accidentali vi danno luogo, per non parlare dei fanciulli, ai quali non si può rimproverare d'essere stati ipocondriaci. *Engelero* avrebbe voluto da-

re ad intendere, che la massima parte degl' infermi partecipassero dallo scorbutico, o che ne avessero la sorgente occulta: molti Medici, che hanno adottata la contraria opinione, sperimentano per cosa molto comoda il riferire a questa tutte le infermità da essi non conosciute; ma il Signor Lind altro famoso Autore, e quelli, che a molta dottrina uniscono la buona fede, negano, che lo scorbutico effere così comune, come vuole quel prevenuto Scrittore. Potrebbe ancora formare un dubbio ragionevole rispetto a quella semplice, e leggiera *affezione scorbutica*, di cui è stato il primo a parlare, s' non m'inganno, il Riviera, ch'è tanto familiare fra le persone, che godono tutti gli agi della vita, e vivono in mezzo all'abbondanza di tutto: è egli verisimile, che questa malattia non sia tutt'altra da quella che domina sul mare, e dalla quale uno si libera prendendo terra? Se non se ne giudica, che sulle apparenze, cioè, dall'affezion della bocca, e dagli esantemi, si potranno certamente prendere per mali medesimi; ma ci facciamo ad esaminare con più attenzione questi due stati, e soprattutto le cagioni evidenti, che vi danno luogo, vi rileveremo grandissima differenza, tuttocchè sembri essere appropriati ad entrambi questi mali specifici stessi: lascio in tronco una siffatta questione, come quella, che m'imbarcherebbe in discussioni, quali mi dilungherebbero d'affai dal piano proposto. La divisione moderna dello scorbutico in caldo, e in freddo, par, che non abbia altri fondamenti, che le circostanze dell'età, e del temperamento: chiamasi caldo in coloro, che sono di temperamento bilioso, e nei giovani: se gli dà il nome di *freddo*, quando s'incontra con un temperamento melancolico, o colla vecchiezza: si giudica dirittamente, che i rinfrescanti saranno proprii agli uni, che agli altri, tuttochè sembra che la lor malattia sia la medesima.

Oltre i principali segni dello scorbutico, tratti dallo stato della bocca, dalle macchie, dal peso delle gambe, e dai dolori vaghi, e lancinativi, ve ne sono altri infiniti, che imprendiamo a noverare. La tristezza sembra inseparabile da questo stato: molti hanno degl'intensissimi dolori di capo; altri delle alternative di sonno, e di vigilia, degli affideramenti, e dei tremori. Il viso in questo morbo è pallido, ed enfato, la bocca puzzolente, i denti vacillano, le gengive fan far

gue, son gonfie, e stendentesi sopra i denti, son livide, esulcerate, e putride: la saliva infetta cola sovente in copia a motivo del prurito, e dell'erosion della bocca. Il polso in tali circostanze è lento, disuguale, e spesso febbrile; ma la *febbre* non ha alcun tipo: le macchie, che l'accompagnano, prendonsi da alcuni ignoranti per la porpora maligna: dileguansi in brev'ora per l'azion della febbre, ch'è sottoposta a molte vicende, e con frequenza accompagnata da vertigini, da ansietà, e da altri sintomi: questa *febbre*, che si può nominare *scorbutica*, non è di durata; ma ell'ha dei frequenti ritorni, e segue talvolta la carriera delle intermittenti irregolari. La *putrefazione della bocca* può comunicarsi al polmone, ed aggiungerè al primo fetore il fiato puzzolente; molti trovansi soggetti a delle incopi, alle palpitazioni, ed al ferramento del petto: provansi dei dolori allo sterno, o al lato, che imitano la pleuritide. I rutti, ed anche il singhiozzo sono assai frequenti. Si ha, ma di rado, della difficoltà ad ingojare non meno i solidi, che i fluidi, che rispintonosi dall'esofago. La regione dello stomaco, ed anche tutto il ventre, dopo il pasto si gonfiano. Provasi un dolor aggravante verso la milza, dei dolori di viscere abituali, la colica più intensa, che fa talora rientrare il bellico: imita sovente la nefritica, ed è seguita dalla paralisi, come segue della colica detta del *Poitou*. Laguansi i pazienti di dolori lancinanti, e atroci agli ipocondri: lo scioglimento del ventre patrido, e talvolta dissenterico, rende lo stato loro più rincrescevole, e tristo: fanno delle orine di color di matton cotto, e stercenti, e i loro sudori offendono bene spesso l'odorato. In simigliante stato i dolori vaghi all'estremità, massime alle gambe, son comunissimi: prendon questa forza maggiore nella notte, come i venerei; e sono anche più intensi nel tempo della febbre: è piaciuto ad alcuni Scrittori di chiamargli gotta vaga scorbutica: altri gli hanno riferiti al reumatismo, ugualmente con pochissimo fondamento. Perdesi con frequenza l'uso delle gambe, non meno per la debolezza, e pel gonore del ginocchio, che per lo stiramento dei tendini legatori: il primo accidente è familiare ai fanciulli: intesi in molti uno sgretolamento nelle articolazioni, e fino delle vertebre. E' cosa rara il non avere in questo stato delle tacche rosse, o porporine, livide, o ne-

re, della forma delle petecchiali fino alla grandezza della palma della mano: queste son con frequenza molto più grandi nelle gambe: ne sono efenti il volto, e le mani. Sono ancora affai comuni le *pustole* alla cute, massime fra i fanciulli, come i pruriti nei vecchi. Veggonsi pure dei piccioli *tumori* indolenti, e delle resipole, il cui ritorno è frequente: delle ostinatissime ulcere alle gambe, le quali non ispurgano, che della sanie, producono delle carni bavoſe: la cancrena alle orecchie ec. Alcuna volta sopravvengono delle *emorragie*, tanto dalle ulcere, che dal naso, dalla bocca, dallo stomaco, dagl'intestini, ec. le quali si tenta spesso moltissimo fermare. Bisogna osservare, come il sangue, ch'essi perdono, o loro si cava, è livido, verdastro, o nericcio, e che si tenta a levar le macchie, ch'ei fa nelle biancherie. Tali sono i *segni* caratterizzanti lo scorbutico, o se si voglia, i *sintomi*, che l'accompagnano: è agevole l'avvisarsi, che gli uni, e gli altri diversificati poco da quelli del malfrancese; dal che forza è concludere, essere spesso malagevole nella Pratica il distinguere questi due morbi, ed è pur troppo noto, che vi trovano spesso imbarazzati i più esperti. Tuttavia si può arrivarvi, non solo coll'esame degli antecedenti, ma ancora coll'ispezione della bocca diversamente affetta nell'una, e nell'altra infermità. Abbiamo detto, che lo scorbutico investiva i denti, e le gengive: il malfrancese per lo contrario si scaglia su l'ugola, sulle mandorle, e sul palato; d'altra parte è agevole l'osservare, che i dolori son più vaghi, e meno profondi di quei del malfrancese: che nello scorbutico il ventre trovasi perpetuamente più, o meno affetto; dove il malfrancese attacca d'ordinario la testa, e l'estremità; e che finalmente le ulcere scorbutiche sono più umide di quelle del malfrancese; ma l'imbarazzo è maggiore, come altri ben vede, quando imbattonsi nello stesso soggetto tutt'e due questi mali, lo che è comunissimo.

Quei, che hanno avuto per le mani molti scorbutici, fanno benissimo, che questo morbo si comunica facilmente: nè io so vedermi, perchè alcuni Medici vogliano dubitarne; si è perfino osservato, come lo scorbutico acquistato per contagio era d'ordinario più triste. Egli è tanto più malagevole a guarirsi, quanto più è invecchiato, o complicato col malfrancese. Si domanderà difficoltà, quando è sopraggiunto per accidente; re-

è in-

è incomparabilmente più ostinato, se è ereditario, o la conseguenza del temperamento, come quello delle affezioni melancoliche, e isteriche. Le *macchie*, purchè non sieno livide e nere, son riguardate, come propizie; e son riputate vantaggiosè anche l'emorragie. L'*oppressione* è uno de' più tremendi sintomi: lo scioglimento del ventre è da temersi, tuttochè si pretenda, che alcune volte abbia dileguata felicemente la malattia: i dolori di viscere intensi, e continui minacciano gl'intestini di sfacelo. Può lo *scorbuto* precipitare nell'idropisia, nell'atrofia, nella tifichezza, nell'apoplessia, nella paralisi, nelle convulsioni, ed anche nell'epilessia. I *tumori*, i cui accrescimenti, e scemamenti sono istantanei, minacciano la paralisi: ostinate sono le *ulceri scorbutiche*: si stenta grandemente a rimediare alla contrazione delle ginocchia: la disposizione già manifesta alla *cancerena* è difficile a divertirsi: finalmente quegli scorbutici, che hanno delle *sincopi* frequenti, muojono in un subito.

I costoro *cadaveri* incontanente si corrompono, e son talora coperti d'esanteri, che non si son fatti vedere, che dopo la morte: si scuoprono per l'*apertura anatomica* dei grandi *sconceri nel basso ventre*, e talvolta nel *petto*: si son vedute delle concrezioni tartarose nella milza, e nel fegato: si è spesso trovata questa viscera riarsa, ripiegata, scirrofa, e la sua superficie piena di tubercoli: la milza si è veduta nella maggior parte di costoro contratta, callosa, in uno stato di putrefazione enfiata, ed anche d'un prodigioso volume: tuttavia non è questa viscera, come si crede comunemente, sempre intaccata. Trovasi anche con frequenza il *mesenterio* stivato, scirrofo, suppurato, ed i suoi vasi varicosi: l'*epiploon* putrefatto, e distrutto: è anche cosa rara, s'io posso credere alle proprie mie osservazioni, il trovar quest'ultimo sano. Osservasi eziandio talvolta lo stomaco, e le budella sfacelate, degli stravasamenti saniosi, ec. per non parlare dei medesimi *sconceri nel petto*, che sono molto più rari. Ma ciò, che le *ispezioni anatomiche* ci presentano in questo caso di più particolare, riguarda *le ossa*: vedesi in quelli, che hanno avuto dei *crocchiamenti*, le articolazioni inaridite, le loro epifisi staccate, i ligamenti corrosi, le coste scollate dalle loro cartilagini, le ossa slogate, ec. Si è pure scoperto, sebben più di rado, le ossa molli, e pieghevoli, ammorbidite, e disciolte: questo accidente

è comune al mal francese; ma quest'ultimo eccita frequentemente delle esoftosi, e delle carie, che sono in estrema rare nell'afezione scorbutica.

S'è bisognasse far parola di tutti i rimedj dagli Autori proposti, o che richieggono dai sintomi innumerevoli di questo male, non ve ne sarebbe alcuno per avventura, che non potesse aver luogo in questo caso. Conosce ognuno il crescione, la coclearia, e gli altri *antiscurbutici*, de' quali parlano tutte le materie mediche. Questi meritano a buona equità la denominazione di *specifici*, ma non son sempre impiegati con rincontro: molti non possono tampoco soffrirne l'uso, a segno che siamo forzati a ricorrere ad altri mezzi: tali sono gli *allentanti*, o l'acqua presa in gran copia, i *temperanti*, il *tartaro vetriolato*, i *nitrosi*, massime nel caso d'emorragia, la *bardana*, i *cicoracci*, il *femiglerio*, e gli *amarici* per non parlare del governo, che dee contrariarsi per che tutti i rimedj. Gli *acidi vegetabili*, come il sugo di limone, ed altri, non solo sono altissimi ad investire questa malattia; ma ne sono altresì i preservativi migliori, siccome ogni giorno si sperimenta nel mare. Il *diaporetico minore*, l'antitrico del fior rio, il tal volta utile di succino, lo spirito di sale ammoniac, e l'*Elixir proprietatis*, sono stati talvolta messi in opera con felice evento: i diaforetici più ch'ogni altro son proficui per li dolori, e per gli eritemi. Si celebra grandemente l'acqua di lattuga; ma farsi maggior uso del polloncello delle tinte fenicelle d'abate: i *marziali* possono esser amministrati dopo gli altri rimedj; ma si è osservato che non riescivano, quando le viscere sono stivate. Si fa anche un buon uso nelle acque minerali fredde, del latte, del uero, ec. In questa medicatura altri non potrebbe far di meno dei *purganti*; ma debbonsi scegliere i più miti, e moderarne l'uso. Produce sovente de' buoni effetti la *china*; ma dee anche usarsi con molta circospezione, essendosi osservato che il lungo uso di questa corteccia nelle febbri intermittenti aveva alcuna volta precipitato nell'afezione scorbutica coloro che non ne erano prima attaccati: vero si è però, che questo malore può esser di pari ascritto alla febbre che alla China; ma è sempre vero il dire, che questo rimedio non gli ha da ciò difesa. Pericolosissimo si pure l'uso dei *calmani*: non debbonsi praticare senza riserva grande, e per breve tempo, nel solo caso, in cui

cui la violenza dei dolori, e le vigilie ostinate ciò esigano. Non s'addice per niun conto a questo male nemmeno la *cavata del sangue*; ma dannosi degli accidenti, che ci forzano a praticarla. E' alla medesima infermità sommamente contrario anche il *Mercurio*, massime allorchè portasi alla bocca: è stato però preteso da alcuni Autori d'aver guarito per cotai mezzo lo scorbutico: ma non può egli essere, che essi sienosi ingannati rispetto al carattere della infermità? Finalmente segue dello scorbutico, come dell'affezione ipocondriaca: i rimedj vi sono bene spesso intruttuosi, e nocevoli: si vede anche ogni giorno, come i pazienti non migliorano, se non se dopo avergli abbandonati, per limitarsi al solo governo fiancheggiato da un bever copioso, il quale, come abbiain detto, può in questo luogo operare come un gran rimedio. Allorchè il mal francese trovasi innestato collo scorbutico, bisogna cominciare dal medicare il primo, senza però trascurare i palliativi del secondo. Pochi sono i rimedj eterni, che ammetta lo scorbutico, se se ne eccettuino i *gargavismi* deterfivi, astringenti, e antiscorbutici, che sono d'un uso grandissimo: favvisi spesso entrare l'allume, e gli altri acidi minerali: molti usano soltanto l'acqua d'orzo col miele: altri si contentano di masticar del cretione, o della coclearia. Sono stati sovente proficui nel declinar del male i bagni caldi. Le macchie non vogliono alcuna applicazione; poichè ci ha più fiate fatto veder l'esperienza, che il loro tornare in dentro nell'applicare i *topici* era stato dannosissimo, ed anche mortale. L'uso esterno della *canfora* è sommamente raccomandato, e specialmente nel caso, ove faccia d'uopo opporsi alla cancrena: l'uso della vermicolare, o picciola giubarba, sì interno, che esterno, ha prodotto dei grandi effetti nella contrazione delle membra. L'applicazione calda del sal marino è riuscita altresì utilissima per istafare le gambe edematose.

I L M A L F R A N C E S E .

Eccovi una infermità, cui stenteremo a rinchiudere fra i limiti, che ci siamo prescritti: tanto numerosi, e diversificati sono i suoi segni, e suoi sintomi! Ella si mostra sotto l'aspetto di quasi tutte le altre malattie, anche le più schisose. Tuttavia il *malfrancese*

(*lues venerea*) sembra, che ai dì nostri siasi mitigato ed è cosa sommamente rara, che si veggia accompagnata da quei gravi sintomi, de' quali parlano tutti i nostri Libri; e ciò sia, come certuni hanno preteso, perchè il tempo gli abbia fatto perdere la primiera sua energia, e la sua malignità: o sia perchè essendo più comune, e più addolcita, o più familiare la sua medicatura, questa non lo lascia più radicare, com'io credo più verisimile. Questo morbo non è comune, che da circa 300. anni in qua; e vi è ragione per sospettare che prima di questa epoca passasse per la lebbra, che sembra aver ceduto il posto al malfrancese: questo bene spesso cova lungo tempo, prima di prodursi in iscerena; e si è spessissimo osservato, che l'uso, sì interno che esterno delle acque termali, lo ha manifestato: non dee altri tuttavia fidarsi a siffatta prova.

Il primo segno di questa infermità dee esser cavato dalla confessione del commercio avuto con una persona infetta. D'ordinario veggionsene dei seguali poco tempo dopo; ma talvolta non si manifesta, se non se dopo molti anni. nel primo caso provasi incontanente un calore alle parti genitali, con un brugiore d'orina: la *gonorrea*, di cui favelleremo altrove, spunta in capo a due, o tre giorni il prepuzio s'infiamma sovente, e più di rado tutta la vagina, la quale viene allora minacciata di cancrena: veggionsi altresì in queste, di pari che alla vulva, dei porri, delle pustule, delle ulceri, e tomiglienti. Lo *stivamento dei testicoli* è pure un accidente molto frequente: nel progresso apre questo il varco a degl' idroceli, a dei varicoceli, ec. Osservansi all' ano dei porri, o verruche, dei condilomi, o sieno escrescenze callose di carne, delle spaccature, e talvolta la fistola: l'emorroidi s'infiammano, suppurano: le medesime fanno sì callose, e cancerose. Nientedimeno la gonorrea, le *pustule*, le *ulceri*, lo *stivamento dei testicoli*, e gli altri morbi locali, non son sempre segni del malfrancese; ma si posson considerer come tali, qualora facciano testa ai rimedj ordinarij; oppure s'e' risoriscano dopo essere stati distrutti, senzachè abbia dato motivo alcun commercio sospetto. Talvolta è un sintoma del malfrancese la *febbre*: questa è allora sempre irregolare, siasi pure acuta, o lenta, continua, o intermittente, poichè si presenta sotto tutti i divisati aspetti: parecchi provano ancora un calore inquietante, non meno alle palme delle mani, che alle piante.

La *testa* è la parte , ove fa il malfrancesè le stragi maggiori : avvegnachè noi sappiamo , che v'ingenera delle *cefalalgie* , delle affezioni convulsive , delle vertigini , dei tremori , e delle paralisi . Alzansi sulla fronte , sull' ale del naso , nell' attaccatura delle labbra , delle *pustule* , che manifestano al mondo tutto questo morbo : stendonsi queste sulla pelle del cranio , ove compariscono ancora dei tumori infaccati , che investono l'osso , che loro serve di base ; sopravvengono delle ostinatissime *oftalmie* , la lippitudine , ed altri malori degli occhi d'ogni generazione : il tintinno delle orecchie , la sordità , o dei dolori , e delle ulcere in quest' organo . Veggionsi quasi in tutti delle *ulceri* al palato , alle mandorle , all'uvola , e ad altre parti della bocca : non ne sono esenti nemmeno le gengive : nel naso vi si osservano dei polipi callosi , delle ulcere cancerose , delle carie alle ossa circonvicine , massime alla volta del palato , che ne riman traforato : tutti questi sconcerti , com'altri ben vede , rendono il *fiato puzzolente* ; ma quelli , che giungono ad intaccare il petto , annunziati dalla raucedine , dall'emoftisi , dalla tifichezza , ec. lo cagionano altresì : alcuni son soggetti a palpitazioni , e perfino a sincopi . Il veleno si scaglia con minor frequenza sopra le viscere del basso ventre , se se ne eccettuin la matrice , e le altre parti interne d' ambi i sessi , destinate alla generazione . Le glandule del collo , e delle ascelle si stivano , come quelle dell'anguinaja , ma più di rado : ne risultano dei *bubboni* , de' quali parleremo altrove : sopravvengono anche dei gozzi sopra tutte le membra . Provansi dei *dolori nell' estremità* , i quali s'infieriscono in tempo di notte : pare , che le ossa ne sieno alcuna volta la sede , tanto sono questi profondi : sono questi fissi , o vaghi ; ma molto impropriamente vengono affomigliati a quelli della gotta . L'*esostosi* più , o meno dure , e sensibili , che menan seco la putrefazione delle parti adjacenti , sono in questo caso assai comuni , di pari che le *carie* precedenti , o annunziate da deposizioni alle parti , che le ricuoprono . Osservanzi eziandio dei *tumori* ai tendini , ed ai ligamenti , delle spaccature alla palma della mano , e alla pianta del piede , dei paterecci , la caduta delle unghie , come quella dei capelli , delle ciglia , ec. Veggionsi finalmente delle macchie porporine , o livide , di tutte le grandezze , la rogna , le volatiche , ed altre
spe-

specie di pustule secche e umide , ulcerate , e callose , delle ulceri fordide , e somiglianti .

Abbiamo esposto nell' Articolo precedente i *segnali* distintivi dello *scorbuto* , e del *malfrancesse* : a questi bisogna aggiungere , che questo secondo vien quasi sempre preceduto da bubboni , da cancri , da pustule , e da altri vizj , che fanno sì dall' intraccar le parti , che hanno contratto , come appunto si vede nelle nutrici , e nei bambini esposti a questo contagio : si sa , che se il bambino è infettato , le prime ad essere investite dalle ulceri , dalle pustule , ec. sono le mammelle ; e che nel caso contrario la bocca del bambino , che riceve le prime impressioni del veleno . Non può negarsi essere il *malfrancesse* bene spesso ereditario ; ma si possono formare dei dubbj ragionevolissimi sopra tutte le altre maniere di prenderlo . E' inutile il dire , che i segni , ed i sintomi da noi riferiti , se si eccettuano quelli , che riguardano le parti genitali , son comuni ad ambi i sessi ; ma importa l' osservare , che le femmine ne provano degli altri , come il cauro alle mammelle , il troncamento , o il flusso trasmodato dei mestrui , gli scirri , le ulceri alla matrice , ec. La maggior parte sono sterili , o fanno degli aborti : i loro figliuoli nascono con una specie di risipola universale , ovvero la loro cute è coperta di rogni , di pustule , d' ulceri , e somiglianti .

Il *malfrancesse* è più , e meno da temersi relativamente al numero dei sintomi , che l' accompagnano , alla natura delle parti offese , e alle varie complicazioni . Si cura con somma difficoltà , quando s' incontra collo scorbuto , o colle scrofole ; quando è invecchiato , o che gli sconcerti , che sono giunti alle viscere , si sono a un dato segno avanzati . E' più da temersi nei fanciulli , e nei vecchi : le donne *regolae* non ne vengono incomodate gran fatto ; ma il termine di questa loro evacuazione perniciosa è il principio dei lor patimenti . Il *malfrancesse* trascurato va a finire assai fiate nell' idropisia , o nel marasmo .

L' apertura de' cadaveri , a norma di ciò , che se n' è scritto , e che per noi stessi abbiamo osservato , fa vedere dei muscoli inzuppati d' una materia pituitosa , di pustule in maggiore , o minor numero sopra le viscere , e le membrane , degli ivamenti d' ogni specie , degli stravasamenti serosi , e saniosi in tutte le cavità . Scuopransi delle carie nel cranio , nelle ossa della faccia , e delle

delle orecchie , delle tuberosità nell' interna faccia del cranio , dei tumori nella dura madre , e ne' suoi allungamenti , degli stivamenti poliposi nei vasi , delle varici , e delle idatidi nel plesso corioide , delle suppurazioni , ec. Il petto ci offre dei tubercoli , delle ulceri , e degli stivamenti scirrofi nel polmone , la vomica , l' esulcerazione dei bronchi , e della trachea arteria , del timo , e dell' esofago . Si rilevano nel basso ventre le glandule , principalmente quelle del mesenterio , stivate , callose , ed esulcerate , i vasi linfatici sommamente manifesti , delle idatidi , delle deposizioni anomale , e purulente . Il fegato , la milza , e il pancreas ci presentano alcuna volta gli strazj medesimi ; ma sono più familiari nella matrice , nelle ovaje , nelle vescichette femminali , e nelle prostate , ove si ravvisano degli stivamenti , delle infiammazioni , delle suppurazioni , delle ulceri cancerose , degli scirri , delle callosità , e simiglianti . Le ossa del tronco , e dell' estremità sono spesso cariate fino al midollo , ch' è similmente infiammato , ed esulcerato : sonosi veduti talvolta ammorbiditi , sebben di rado , come la cera , e come disciolti , i loro tendini , e i loro ligamenti son comparsi tumefatti , od intaccati d' altra guisa . Si è finalmente trovato in coloro , che son morti nel tempo della cura ordinaria , del mercurio scolante dal cranio , dalla capsula delle articolazioni , ed anche dalla cavità delle ossa .

E' noto , il *mercurio* essere ai dì nostri quasi il solo *rimedio* , che si ponga in opera contro il malfrancese , od introducasi per la pelle per mezzo delle fregagioni , dei fumi , e degl' impiastri , od amministri internamente , mascherato sotto cento forme , come in ptisana , in liquore , in polvere , in pillola , in gocce , ec. In tutti i metodi non si tratta , che di fare scorrere pel corpo il mercurio per lungo tratto di tempo , e di maneggiarlo in guisa , che non ecciti la salivazione , nè lo scioglimento del ventre : avvegnachè provi una lunga esperienza evidentemente , che il ptialismo , che un tempo riputavasi necessario , non solo è inutile , ma anche dannoso . Si prepara per le fregagioni , alle quali senza esitare dassi la preferenza , il paziente colla *cavata del sangue* , coi *purganti* , coi *temperanti* , col *latte* , col *siero* , coi *bagni* , ec. Siffatta preparazione (per la quale scegliesi la bella stagione) , che dee per lo meno durare una quindicina di giorni , non è meno neces-
sa-

faria per gli altri metodi , i quali talvolta fallano per esser la medesima stata trascurata . Si mette in opera in *fregagioni* per l'intera medicatura intorno a seion-
ce di *pomata*, che contiene due once di mercurio : bene spesso se ne può dar meno , ed è ben raro , ch' e' ne bisogni di più: se ne distribuisce la quantità divisa in dodici, o in sedici fregagioni , che fanno nello spazio di 40. , o di 50. giorni . Ognun fa , che non si frega, che il dorso , e l'estremità : che la prima fregagione si fa al piede , la seconda alla gamba , la terza al ginocchio , ec. e che in tutto questo tempo il paziente non si muta di biancherie . Se il mercurio ascende alla bocca , o risveglia alcun altro accidente , si sospende il rimedio , si fa mutare il paziente delle biancherie , e se gli dà un purgante . Nelle donne si dee schivare il tempo dei mestrui ; e si dee formarli , se fioriscono nel tempo della medicatura . La dieta bianca è per la maggior parte il governo più adattato . E' noto , che possonsi risanare i bambini lattanti medicandone la lor nutrice : quanto alle donne gravide , si dee aspettare a medicarle dopo il puerperio .

Allorchè lo stato della cute non permette il farvi le fregagioni , si può far uso dei *fumi* , prendendo le necessarie precauzioni per difenderne la testa : il cinabro , l'etiope minerale , il mercurio ammorzato collo zucchero , o qualunque altra mercuriale preparazione , possont esservi messe in opera : alcuni vi mescolano dell'incenso , del succino , lo storace , il mastice , la trementina , ed altre resine , colle quali si formano delle tavolette , dei trochisci , e simiglianti . Ciascheduna fumigazione , secondo le forze dell'infermo , dee essere dai tre , o dai quattro minuti fino a un quarto d'ora : di questi fumi se ne danno da otto a dodici , e si frappongono , come nelle fregagioni , alcuni giorni d'intervallo : per cadauna fumigazione impiegasi uno , o due grossi di cinabro , e circa due once per tutta l'intera medicatura , che non deve esser più breve di quella delle fregagioni . Questo metodo è meno sicuro , e più pericoloso del primo : tuttavia si è più volte veduto , aver risanato dei mali di questa natura , che avevano fatto testa alle fregagioni amministrate nella forma migliore del mondo : la fumigazione rimedia a maraviglia agli sconcerti , che il malfrancesse produce nella cute ; ma non ha l'efficacia stessa per li vizj ed intacchi interiori : non
s'ad-

s' addice alle persone magre , e deboli , nè a quelle , che hanno intaccato il petto , per quanta cura altri si prenda per impedire il respiramento del fumo .

Si è assai sovente osservato , come quei tali , i quali erano stati la prima volta medicati senza effetto , o coll' uno , o coll' altro dei metodi ordiſivati , non erano stati più fortunati nel ſecondo , ed anche nel terzo tentativo . In tal caſo fa d' uopo rivolgerſi da un altro lato ; vale a dire , o dando il *mercurio internamente* , o facendo uſo dei *sudorifici* . Appunto in ſiffatte occaſioni veggionſi ogni dì dei Ciarlatani con li loro liquori , colle loro ptiſane , colle lor polveri , o pillole , riuſcir meglio dei Medici ſoverchio timorofi in ſimiglianti circottanze . Non è già , che queſti ſecondi non abbiano contezza di molte preparazioni mercuriali , come della *panacea* , del *mercurio dolce* , del *turpito minerale* , dell' *arcano corallino* , del *precipitato roſſo* , e d' altri , i quali , preſi interiormente , poſſono perfettamente riſanare dal malfranceſe , ed hanno per avventura più valore di tutte le miſterioſe preparazioni dei Ciarlatani , le cui riuſcite fanno bene ſpeſſo toccar con mano , che biſogna ſaperſi con frequenza allontanare dalla via ordinaria . La foggia di dare la *panacea* , ch' è ſtata ſempremai la preparazione meſſa in opera più delle altre , conſiſte nel farne prendere ogni giorno una doſe graduata , cominciando dai cinque in ſei grani , fino a uno ſcrupolo , che poi ſi va inſenſibilmente diminuendo , per terminare nella prima doſe più picciola : fanno di biſogno per tutta la medicatura circa a ſei groſſi di *panacea* . Deſſi , come in tutti gli altri metodi , ſchivare la ſalivazione , regolandone le doſi , ſoſpendendole , o amminiſtrandole , ſecondo le oſſervazioni della bocca , che ſi dee riſguardare come la buſſola , che impediſce , che altri ſi ſmarrisca . Queſta medicatura non dee eſſer minore di quella delle fregagioni , e dei fumi , e vuole i medeſimiſſimi preparativi . Fa di meſtieri oſſervare , eſſere impoſſibile il determinare a capello la quantità del mercurio , che richiede l'eſtinzione del veleno gallico , come altresì gl' intervalli , che debbonſi far paſſare fra queſte operazioni , o queſte preſe , ed il tempo , che biſogna farle durare ; concioſſiachè il mercurio nei differenti ſoggetti operi con maggiore , o minor prontezza , e queſto morbo ha un' inſinità di gradi , che rendono più , o meno ribelle ; di modo che in tale incertezza non

non si potrebbe uno meglio regolare, che osservando la cessazione dei sintomi, e i disordini, che possono essere ingenerati dal mercurio relativamente alla bocca, ed al ventre.

I *sudorifici* più comuni, come il *guajaco*, lo *zafferano*, la *cina*, e la *falsapariglia*, dei quali un tempo facevasi grandissimo uso, ai dì nostri son totalmente trascurati: ma e perchè avranno eglino perduto la virtù, che allora avevano? Si può egli dubitare dopo tante osservazioni, ch' e' sieno attissimi a distruggere il lievito del malfrancesese, o a procurarne l'espulsione? Non è egli noto altresì, aver essi spessissimo guarito, e guarire anche ai dì nostri i morbi di questa natura, che hanno resistito al mercurio, ed essere i medesimi l'unico ripiego, che possiamo prendere in questi casi? Il *guajaco* sopra ogni altro si è sperimentato il più sicuro, e se gli è data d'ordinario la preferenza. La foggia d'usarlo consiste nel darne ogni giorno per cinque, o sei settimane: due, o tre bicchieri del suo decotto, osservando in tutto questo tempo una severissima dieta, e standosi a letto. Del secondo decotto di questo legno uno se ne serve per la bevanda ordinaria, che si continua ancora nella convalescenza, la quale dee si prolungar per un mese. Le persone magre stentano a sopportar l'uso dei sudorifici: in tal caso se ne diminuiscono le dosi, e si compensa col tratto più lungo del tempo ciò, che manca alla quantità.

E' bene il sapere, che alcuna volta accade, che sussistano tuttavia alcuni accidenti dopo la medicatura più regolare di questo morbo; ma questi si dileguano col tempo, e quegli, che ne hanno dell'esperienza, non se ne prendono più che tanto pensiero. La *gonorrea* è uno di quelli, che più resistano; ma in tal caso si guarisce molto facilmente col latte, e con gli altri addolcenti, coll'uso delle *acque minerali*, sì acidule, che ferrate; e finalmente con li *balsamici*, e con li *fortificanti*. Dopo la guarigione sussistono talvolta anche i *catoni*; ma in progresso si dileguano: il latte, i temperanti, e le acque minerali, anche in questo caso sono sommamente proficui: fa d'uopo unirvi i *diaporetici*, per non parlare delle unzioni anodine, e rilassanti, che possono essere d'alcun vantaggio. Quanto alla *rogna*, alle *volutiche*, alle *ulceri*, alla *carie*, e ad altri sintomi, è cosa rara, ch' e' non pieghino la testa al mercurio: tuttavia, quando ciò accade, non abbisognano d'altra medicatura, che di quella, la quale vi s'applicherrebbe in qua-

qualunque altra circostanza. Quei, che brameranno instruirsi più fondatamente in questa materia, per avventura in questo luogo soverchio ristretta, consulteranno il dotto Trattato del Signor *Astruc*, Opera, di cui ammirasi con ragione l'ordine, e il metodo, e che dovrebbe servir di modello a tutti gli Scrittori.

L E S C R O F O L E.

Addivienne del *lievito scrofoloso*, come di quello dello scorbutico, e del malfrancesco: resta questo sovente occulto, es'unisce talvolta ad altre infermità, che cagionano delle complicazioni oscurissime, e sommamente perniciose. Le *scrofole* mostrano di non dilungarsi gran fatto dall'indole celtica, od esserne un rampollo, essendosi cento volte osservato, che i fanciulli, i cui genitori erano infetti di tal morbo, o scorbutici, divenivano per lo più scrofolosi: oltredichè le preparazioni mercuriali, ed i sudorifici, che a buona equità son riputati gli specifici del malfrancesco, sono i rimedj, che impiegansi con miglior riuscita contro le *scrofole*, per non far parola di parecchi sintomi, e prodotti, che sono comuni ad ambedue questi morbi. Tuttavia non si potrebbe rievocare in dubbio, che i cattivi alimenti, le acque crude, e fangose, il latte d'una nutrice gravida, o inferma, bene spesso non le ingenerino: è noto altresì, che le *scrofole* possono acquistarsi pel contagio. Questa infermità non si manifesta d'ordinario, se non per mezzo di tumori esterni, detti dalla volgar gente *umori*, o *tumori freddi*: tuttavia ella non la perdona alle parti interne, e singolarmente alle grandule del mesenterio: l'affezione scrofolosa prende talora l'aspetto d'un'altra malattia, prima d'essere smascherata dai tumori: investono questi per lo più le grandule linfatiche, le salivari, e la tiroide: s'impadroniscono eziandio delle adiacenze delle articolazioni, e delle parti esterne del cranio, ove ingenerano delle carie: veggionsene nel collo, vicino all'orecchie, sotto il mento, sopra la trachea arteria, che ne rimane talvolta caviata: alle ascelle, all'anguinaja, alle labbra, e alle mammelle; al gomito, ai gartretti, al ginocchio, alle mani, ai piedi, e singolarmente alle dita, e al dito grosso de' piedi: s'attaccano alle membrane, ai tendini, ai ligamenti, ed alle stesse ossa, che fanno gonfiare, e cariarsi, con dolori così acuti, che si è data a questo morbo la barbara denominazione

ne di *spina ventosa*. Gli occhi, il naso, le labbra, ecc. sono altresì esposti al fermento scrofoloso.

I *tumori scrofolosi* sono per lo più fissi, e immobili: presentano sovente delle dilatazioni, e mostran d'essere inflati, o formare delle corone intorno al collo: la lor durezza non è talvolta minore di quella pietra. La cute nel principio non ne patisce alcuna alterazione: s'infiammano, e suppurano con difficoltà; ma le *ulceri*, che ne risultano, sono d'un reo carattere; e poco diversi dai cancerosi: i loro contorni sono spesso callosi, roversciati, e dolorosi: ultimamente divengono talora fistolosi. I tumori scrofolosi sono anche sovente infaccati, e pieni d'ogni generazion di materie, e talora d'un'acqua limpida: il *bronccele*, che può aver luogo in questa classe, ha la sua sede nella tiroide, il cui volume intriga talvolta la trachea arteria, e l'esofago: nulladimeno tutte le buose non sono, come molti pretendono, scrofolose, non avendo questo carattere più di quello abbianlo gli altri gozzi, i quali, tuttochè talora sintomi della malattia, di cui parliamo, sono il più delle volte il prodotto di tutt'altra cagione. Si pongono altresì in conto di scrofole molte flussioni che piombano sopra le articolazioni, gli edemi articolari delle braccia, ed anche delle gambe, le ulcere fistolose, la rachitide, la tigna, ed altri morbi, i quali, a dir vero, possono riconoscere un fermento scrofoloso, ma che riconoscono comunemente un'altra sorgente. Il *veleno*, di cui parliamo, produce eziandio dei tumori sotto la lingua, alle mandorle, dei *polipi* al naso, e delle *ulceri* alla sua membrana pituitaria, dell'*oftalmie*, degli egilopi, ed altri mali d'occhio ostinatissimi: scagliasi talvolta sul petto, e v'ingenera dei tumori poliposi nella trachea-arteria, l'emoftisi, la *rispettezza*, l'*asma*, e somiglianti. Nel basso ventre quasi sempre duro, e tumefatto, il mesenterio non è la sola parte intaccata; ma bene spesso ne sono offesi il fegato, la milza, l'epiploon, ec. Tutti questi sconcerti ravvegliano la *febbre lenta*, dalla quale rarissime volte sono esenti gl'infermi, allorchè il male si è a un dato punto avanzato; e finalmente il marasma, o l'idropisia, che in brev'ora conducono al sepolcro.

Le *scrofole*, che s'ingenerano dall'acque, dagli alimenti, dal contagio, o da qualunque altra evidente cagione, ci fanno molto sperare la guarigione; ma quan-

do sono ereditarie, è quasi impossibile lo fradicarle. Queste non investono per lo più che i giovani, dall'età loro di quattro anni fino al tempo della pubertà, ch'è il termine più ordinario della loro guarigione: elleno son rare nelle altre età; ma di molto più *malagevole guarigione*, ed alcuna volta degenerano in gotta. Si è osservato, che i fanciulletti, che hanno il discernimento innanzi tempo, e lo spirito vivacissimo, vi sono soggetti. S'investono con riuscita i tumori scrofolosi molli, e recenti, i mobili, gl'indolenti, e senza alterazione nella cute: i flemmonici suppurano agevolmente; ma i fissi, gli scirrofi, i dolorosi, i lividi e invecchiati, sono ostinatissimi; si temono soprattutto quelli, che sono aderenti alle ossa, ai tendini, ai ligamenti, ai vasi grossi, e alla trachea-arteria; come quelli altresì, che hanno l'aspetto di cancro. Le ulceri, che risultano da tutti questi tumori, sono saniose, e virulente: si stenta grandemente a cicatrizzarle, e questo anche quasi sempre senza frutto, avvegnachè se ne formino in brev'ora delle nuove. In una parola il *pronostico* di questa infermità deve esser tratto dalla sua vecchiezza, e dalla natura delle parti offese: la carie di malleoli, delle ossa del tarso, di quelle del polso, ec. rendono la disperata: finalmente vien riputata incurabile, quando ha fatto precipitare il paziente nel marasmo, e nell'idropisia.

Dalle *dissezioni* ci vengono manifestati gli sconcerti interni, che corrispondono agli esterni. Veggionsi negli adjacenti dei tumori esterni, una specie di grasso, che si può affomigliare al lardo, e dagli strascichi di glandulette, ch'erano germogli sempremai pronti a svilupparli. Nel *basso ventre* trovasi il mesenterio perpetuamente intaccato; veggionsi delle glandule della grossezza d'una nocciuola, d'una noce, ed anche d'un pugno: sono queste callose, scirrofe, pietrose, oppure contengono una materia sebacea, caciosa, o purulenta. Il canale toracico, ec. è talvolta scirrofo, o in diversa maniera intaccato. Veggionsi delle appendici polipose sopra lo stomaco, e le budella, di pari che nella loro cavità; e non ne rimane al coperto la stessa vescica. Il fegato ora compare lacero, e disseccato, ora d'una mostruosa grossezza, suppurato, scirrofo, granelloso, pietroso, e fuor di luogo; sonosi osservati i medesimi sconcerti nella milza: si è questa veduta eziandio in uno stato di putrefazione, o intieramente distrutta: l'epiploon, il pancreas,

creas, la matrice, le ovaje, ec. sono esposte agli stessi accidenti. Si giudica a ragione, che tutti i divisati strazj, confermati quasi tutti dalle nostre osservazioni, apran la strada a dei stravasamenti serosi, saniosi, purulenti, e feridi, che trovansi comunemente nella cavità del basso ventre. Il petto non n'è più risparmiato, che l'addome: il timo in quasi tutti i soggetti è scirroso, ed il suo volume è talvolta grandissimo, stendendosi fino alla tiroide: trovasi pure la membrana, che involupa il polmone, ispessita, e callosa: scirroso la sostanza di questa viscera, piena di tubercoli, suppurata, putrida, e talvolta in parte distrutta, trovandovisi in vece di quella una materia bianchiccia, e gessosa: veggionsi pure dell'erosioni ulcerose alla pleura, al diaframma, al pericardio, ch'è bene spesso aderente alla superficie del cuore, e delle inondazioni fetenti in tutte le cavità. Non faremo parola del gonfiamento delle ossa, della loro lussazione, della loro carie, e d'altri sconcerti, che si svelano bastantemente nel corso della malattia.

I rimedj interni più essenziali si raggirano sopra i *destruenti*, gli *squaglianti*, i *sudoriferi*; ma non dee altri comprometterli della riuscita, qualora dopo i rimedj generali non si preparano per lungo tratto di tempo i pazienti col *fiero*, con li *temperanti*, con li *depuranti*, con gli *antiscorbutici*, e con gli *aperienti leggieri*. Può essere altresì impiegato il latte con sommo vantaggio; ma non si addice a tutti. La radice dell'*agrisoglio minore*, della *scrofolaria*, e del *polipodio*: le foglie di *russilagine*, di *tutamuraria*, di *crecione*, e di *coclearia*, sono state amministrate con buona riuscita. I *contingambe*, e i *marziali*, le *gomme*, i *saponacci*, la *magnesia*, il *mercuro dolce*, la *panacea*, l'*etiope minerale*, e le altre preparazioni mercuriali, che s'amministrano in picciole dosi, e che si continuano lungo tempo, sono i *deostruanti*, e gli *squaglianti* più usati: la più leggiera acqua di *calcina* ha in molti casi prodotto buono effetto: le *viperi*, il *saflafras*, l'*antietico del Poterio*, ed altri *sudorifici* sono parimente efficacissimi rimedj. Si è pure in molte occasioni trovato grandissimo ajuto nelle acque di *Plombieres*, di *Barges*, di *Digne*, ec. Non si dee passar sotto silenzio la *spugna calinata* riguardata da molti, come uno specifico: se ne dà un *grossa* mattina, e sera per lungo tratto di tempo; la *pietra pomice*, e
fors'

forſ' anche tutti gli altri aſſorbenti hanno la ſteſſa proprietà . Vantaſi finalmente il *rimedio di Rotrou* ; ma la ſua preparazione è ſoverchio malagevole , e troppo com- poſta , ſicchè vi ſi poſſa ſovente ricorrere . I ſintomi di queſto morbo non vogliono , che una medicatura ordina- ria : ſi va per eſempio , incontro all' oſtalmia colle ca- vate del ſangue , colle mignatte , con li veſcicanti , col- le coppette , e con altri rimedj indicati nel ſuo pro- prio articolo .

La *medicatura dei tumori eſterni* merita ogni più ſeria attenzione : ſi dee tentare il loro ſciooglimento , o la lo- ro ſuppurazione ; e in diſetto di queſto , la loro eſtir- pazione . Le foglie di leccio cotte ſotto la cenere , i cataplaſmi fatti colla radice , e colle foglie di cocomero ſalvatico , la radice di *brionia* , ed altri riſolventi , ſi pongono in opera più , che ogni altra coſa . La fo- menta coll' acqua di calcina , i profumi d' incenſo , di carabè , e di *tacamabaca* , ſono grandemente in uſo . Servonſi altreſi del diachylon gommato , dell' empiatro di Vigo , di quello di cicuta , del diabolano , ec. Quan- do vi è alcuna apparenza di ſuppurazione , vi ſi appli- cano dei cataplaſmi emollienti , e digeſtivi i più noti . Ma non deeſi altri dar fretta d' aprire gli aſceſſi , per dare alla marcia il tempo di diſtruggere le durezza ſcro- ſoſe , che vi ſ' incontrano . Medicati poſcia l' ulcera coi deterſivi , col digeſtivo , e con li cateretici , dei qua- li ſi fa uſo vicendevole , ſecondo che richiegga lo ſta- to della piaga : ma uno non dovrà mai prenderſi la briga di cicatrizzarla , fino a che colla ſuppurazione non ſienoſi per intero diſtrutte tutte le durezza : la ſolu- zione del ſublimate corroſivo nell' acqua di piantaggine in queſto caſo è d' un' efficacia grandiffima . Allorchè queſti tumori , o queſte ulceri , hanno preſo un *carattere canceroſo* , è coſa pericolosa l' accoſtarvi la mano , ſe ciò non foſſe per applicarvi alcun rimedio palliativo . L' *eſtir- pazione* , sì col ferro , che per mezzo della legatura , è rade volte praticabile , nè può altri adoperarla , ſe non per le glandule libere , e mobili : quanto alle aderenti , e alle profonde , allorchè ſonoci investire indarno con li riſol- venti , e con li maturanti , può altri con prudenza ſer- virſi del *cauſtico* . Del rimanente rileva molto il ſaperſi , che la medicatura delle ſcroſole dura alcuna volta de- gli anni intieri , e che ci poſſiamo anche molto vanta- re , quando queſta ſia riuſcita a buon fine .

LA LEBBRA.

Questa malattia famosa per la sua antichità, è ai nostri sì rara, che alcuni hanno creduto di poter negare, che abbia mai esistito: io però l'ho più volte veduta, tuttochè, per dir vero, non l'abbia medicata; ma mi sono approfittato di ciò, che mi hanno fatto sapere Medici illuminatissimi, ch' esercitavano la loro professione in luoghi marittimi, ove sembra, che questo morbo si sia confinato: vi ho aggiunto quello, che ho potuto ritrarre dagli scritti d'alcuni osservatori, che hanno saputo conoscere il malfrancese, e che non hanno confuso, come il più dei Medici hanno fatto, queste due malattie. Quella, di cui parliamo, è la più schifosa di quante ve ne abbia: a non giudicarne, che pel testimonio dei sensi, sembra, essere un composto dello scorbutico, del malfrancese, e delle scrofole; e per avventura ne partecipa: certuni hannola considerata, come l'ultimo grado della rogna scorbutica: altri non vi hanno saputo rilevare, che un celtico trascurato, ed invecchiato: vi è stato altresì chi ha voluto porla nella classe delle volatiche maligne, senza riflettere, che nella lebbra le viscere non trovansi in migliore stato delle parti esteriori. Molti finalmente la confondono coll' *esantiasi*, di cui ragioneremo a suo luogo, la quale è diversa da questa, non solo perchè investe le sole gambe fino al ginocchio; ma ancora per essere accompagnata da prurito, e da dolore, lo che non provasi nella lebbra confermata.

La lebbra non si manifesta a dovere, se non dopo aver fatto le maggiori stragi nella cute, e nelle parti più prossime; ma i suoi avanzamenti son lenti, e nei primi tempi non comparisce, se non sotto la forma delle volatiche, della rogna, e d'altri morbi cutanei comunissimi. La faccia, le mani, ed i piedi d'ordinario esibiscono i primi segnali di questo male: allora la cute è scagliosa con macchie di color vario: veggionvisi delle *pustole* secche, umide, ed *esulcerate*: delle croste *furfuracee*, e scagliose; ma importa osservare, che la medesima in questo primo periodo conserva tutta la sensibilità, e che provansi anche dai pazienti dei vivacissimi pruriti: in progresso divien più ruvida, callosa, e untuosa, tumefatta, e screpolata; ultimamente fredda, e senza senso: allora si può pun-

gerla, o scottarla impunemente; ed i pazienti non si lamentano, se non quando si passa l'ago oltre gl'integumenti; lo che non s'accorda con quello, che hanno scritto quasi tutti gli Autori, i quali in ciò pare che sieno l'un l'altro copiati: conciossiachè ci asseriscano, che si può penetrare fino ai muscoli, e ai tendini, senza che l'infermo se ne risenta. La *faccia* in tal malattia ci presenta un color livido, o paonazzo: ella è spesso piena di bernoccoli, e di tubercoli, che la sfigurano: lo sguardo divien feroce: alzanfi dei *tumori* sopra la fronte, sulle guance, e sul mento: ingrossa il naso: le labbra gonfiano, e si roversciano: la lingua si stiva: spuntano dei tumori sopra tutte le parti della bocca, e la voce si fa roca. Piombano quindi delle *flussioni* sopra i gomiti, e le ginocchia, che perdono anche talvolta il lor moto: si gonfiano le gambe, e fanno varicose: le mani, e i piedi si screpolano. Formansi in varie parti dei tumori, i quali degenerano in *ulceri virulente*, putride, e fagedeniche, che talora son vermicose, e penetrano fino all'osso, che ne riman cariato. Il *fiato* dei lebbrosi è *fetente*, e da tutto il corpo loro esala un odore sì tristo, che altri stenta a soffrirlo. In siffatto deplorabile stato quasi tutti vengon tormentati da un *priapismo* eccitato da una immaginazion riscaldata: e questo ha dato motivo ad alcuni Autori di descriver questo morbo sotto la denominazion di *Satiriassi*. La *caduta* finalmente dei sopraccigli, dei peli, e dei capelli: quella del naso, delle dita, della mano, e del piede, e talora delle mani, e de' piedi stessi, ricolma di miseria il deplorabile stato di questi infelici: i pazienti hanno orrore del proprio stato loro, e s'involano ad ogni società, aspettando con ismania, che la *lenta febbre*, e la *consunzione* porti loro la sospirata morte.

La *lebbra* in tutti i tempi è stata considerata *contagiosa*: allorchè nel suo primo periodo non ha lavorato per anche oltre la cute, e le parti più vicine, si può guarirla, sebbene non senza difficoltà; poichè si è più volte creduto d'averla distrutta nella bella stagione, e inaspettatamente si è veduta risorgere nella seguente inverno: *vano* si è l'*investirla* nell'ultimo suo periodo, che è quanto dire, allorchè il morbo si è insinuato nelle parti interiori. Quantunque non abbiamo gran contezza di ciò, che segua in esse parti, essendosene rarissime volte fatte le dissezioni; non temiamo tuttavia d'ac-

certare, non meno sull'esempio delle precedenti malattie, che sopra alcune *ispezioni anatomiche* riferite dalli nostri Autori, che il veleno lebbroso vi produca le più orride stragi. Si è trovato il cuor sano, ma sonosi veduti dei disseccamenti, degli scirri, e delle putrefazioni in tutte le altre viscere del petto, e del basso ventre; si è anche osservato una grande aridità nella trachea-arteria, e nei bronchi.

La medicatura, ch'è stata applicata a questo morbo, è poco diversa da quella, ch'è esposta nei tre Articoli, che vanno innanzi a questo: gli *squaglianti*, e i *sudorifici* ne sono la base principale; ma non si debbon porre in opera, se non dopo i rimedj generali, ed un lungo uso degli *umettanti*, degli *addolcenti*, dei *vinifrescanti*, dei *temperanti*, e dei *depuranti*. Il latte, il siero, i farinacei, i cicoracei, le piante acide, la pazienza, la samaria, e l'erbe antiscorbutiche, possono secondare tutte le divise mire: vi si uniscono le polastre, il vitello, la tartaruga, i granchi, e le rane: non sono stati nemmeno trascurati i *bagni domestici*. Dopo una siffatta preparazione si dà mano agli *squaglianti*, come al *mercurio dolce*, alla *panacea*, e somiglianti; oppure ai *sudorifici* ricavati dai legni, dall'antimonio, e dalle vipere. In molti casi è riuscito l'uso interno dello zolfo: è stato altresì grandemente vantato il decotto della scorza d'olmo; ma io temo, che questo riposi sopra la fede di quel solo, che fu il primo a proporlo. Ci possiamo accostare con maggior fidanza all'uso interno, ed ai bagni delle *acque termali*: parecchi li hanno abbracciato, e sembra, che l'abbiano indovinata. Ultimamente vien proposta la *castrazione*, come il mezzo più certo per estirpar questo morbo: e si è pure costantemente osservato, che i castrati n'erano esenti. Eternamente si è fatto uso delle fregagioni fatte con esporre il corpo ai vapori dello zolfo; e sonosi adoperati tutti i topici, che sono appropriati alle volatiche, e alla rogna. Quanto ai rimedj esterni si opera a norma delle regole ordinarie: ma tuttochè non sieno questi d'ordinario nulla più che meri palliativi, nulladimeno non ci è sempre permesso il porgli in opera.

LA GOTTA.

Ognuno conosce la *gota* (*arthritis*) alle mani, e ai piedi, allorchè la rivelano e la gonfiezza, e il dolore;

lore ; ma negli attacchi leggieri ella è sommamente equivoca, e quei soli, che hannola più volte provata, non si possono in ciò ingannare: la medesima è anche più occulta, quando si scaglia su le altre parti, massimamente sopra le viscere, ove prende le apparenze di un'altra infermità, che assai volte anche vien medicata, senza aver la menoma ombra di sospetto del suo carattere. Non la perdona la gotta nè ai fanciulli, nè alle donne; ma sì gli uni, che le altre ne sono affaliti molto di rado: le fanciulle dal color pallido talvolta ne sono investite, di pari che le donne isteriche, e le opilate: gl' ipocondriaci, e quei tali, ai quali si è troncato il corso dell' emorroidi abituale, vi sono più che ogni altro soggetti. Per altro l' *inazione*, la *crapula*, il *vino*, l' *uso venereo*, ne sono le più ordinarie cagioni: è noto, che i divisati stravizi dispongono al calcolo, e che questi due morbi mostrano di riconoscere l'origine stessa, avvegnachè investano il soggetto medesimo in tutte l'età alternativamente, ed assai comunemente s'incontrino insieme nei vecchi. Il *reumatismo*, e la *sciatica* hanno pure una grande affinità colla *gotta*; e questi tre morbi pare, che spettino assai sovente all' affezione scorbutica, o per meglio dire, i dolori scorbutici si presentano talora sotto le apparenze d'essi morbi.

Non vi ha chi non sappia, che la *gotta* assalta d'ordinario i piedi, le ginocchia, le mani, ed i gomiti, e che ha la sua sede nei ligamenti di quelle articolazioni, ovvero nella guaina dei loro tendini. Vien questa per *parossismo*, e nei primi giorni dell'attacco si ha d'ordinario la febbre: il tumore, che s'unisce d'ordinario al dolore, ora è rosso, o leggermente infiammato, e ora edematoso, ed enfiato: una tale differenza ha dato luogo alla distinzione della *gotta in calda*, e in *fredda*: il dolore varia infinitamente: in alcuni è ottuso, ed in altri acuto a seño, che i pazienti non possono soffrir tampoco il peso delle più leggiere coperte: placasi d'ordinario la mattina: hannosi anche talora nel decorso della giornata delle vere intermissioni: il moto può rinnovarlo: alcuna volta muta luogo, passando cioè, dall'uno all'altro piede, alla mano, ec. Ai dolori succede d'ordinario il pizzicore, e termina il parossismo. Gli accessi della *gotta ai piedi* sono di circa quattordici giorni, quando l'infermo è giovane, e di buona costituzione: sono poi di più mesi nelle perso-

ne deboli, e nei vecchi: la loro durata in alcuni soggetti è assai costante; ma possono farla variare infiniti accidenti. Rispetto al loro ritorno non vi ha regola, ma è per lo più fissato a un certo dato tempo dell'anno, se la collera, o qualche fallo nel governo non li accelerano. Quando la gotta è *invecchiata*, i dolori fanno continui, o danno cortissime tregue: i calori dell'estate ne procurano di due, ed anche di tre mesi. La gotta, in invecchiando, perde della sua energia; ma talora priva del moto loro le dita, e sforcele in varie sogge per mezzo di tumori, che vengono mantenuti dalla materia cretosa, che vi viene deposta: segue anche talvolta, che questi tumori s'aprano, e diano l'uscita a queste concrezioni. Quando la gotta investe i vecchi per la prima volta, ella non è mai molto violenta, e molto irregolari sono i suoi periodi: nelle altre età mostra d'unirsi spesso col reumatismo, e allora i dolori non son confinati alle articolazioni; ma rade volte la gotta è malattia dominante.

Sono i gottosi soggetti a tutti, a flatulenze, alla costipazione, all'emorroidi, alle urine ardenti, ec. Sono altresì esposti a più tremendi accidenti a motivo del *cambiamento di luogo della materia artritica*, che abbandonando le articolazioni minaccia tutte le altre parti. Se si porta *alla testa* può ingenerarvi delle cefalalgie, il delirio, le vertigini, il letargo, l'apoplezia, la paralisi, dei tremori, per non parlare dell'oftalmia, del dolor d'orecchie, di denti, ec. Se piomba sul petto, o sulle sue adiacenze, produce l'angina, dei catarrhi, degli stivamenti infiammatorj, l'emoptisi, la tifichezza, l'asma, delle anghie, la sincope, ec. Se si fissa *nel basso ventre*, ce ne danno l'indizio la cardialgia, l'ardore, ed il dolore il più acuto di stomaco, la colica, il dolor nefritico, ec. Provansi eziandio in tali circostanze il disgusto, le nausea, il vomito, la diarrea, ed anche la dissenteria: le urine depongono talvolta una posatura gessosa: i vecchi gottosi provano un ferramento agl' ipocondri, alle anche, e spesso dei dolori di viscere abituali. Non è malagevole il distinguere tutti i divisati prodotti della gotta, allorchè seguono da vicino la cessazione istantanea dei dolori dell'estremità: ma si è sommamente imbarazzati, quando questi compariscono senza che alcun accesso prossimo di gotta vi abbia dato luogo: lo che non è raro in un'età

età avanzata ; ed importa moltissimo l'esserne avvi-
sato .

La *gotta* ereditaria, e *invecchiata* è *incurabile*: quella, che dipende da una cagione accidentale, e ch'è recente, si guarisce con estrema difficoltà . Il *Sydenham*, che l'ha descritta così bene, tuttochè troppo da Filosofo, e ch'era il Pratico migliore del tempo suo, non ha lasciato d'esserne tormentato per intieri trent'anni. I dolori vivaci annunziano un parossismo corto, e un buono intervallo; dimodochè vengono considerati, come un rimedio preparato dalla natura, del quale però i pazienti ne soffrono con istento grande l'amarezza; l'enfiammazione dee similantemente considerarsi, come una deposizione critica, e salutare, osservandosi costantemente, che gli accessi sono più lunghi, qualora la parte non sia nè rossa, nè tumefatta: hanno di più i Pratici osservato, come le orine torbide, e grosse, erano salutarì in tutte le malattie degli articoli; e perciò usavano una somma attenzione nell'esaminarle.

La *gotta*, come abbiain detto, s'infievolisce invecchiando; ma allora ella non ha appena intermittenza, e soprattutto non lascia mai più i piedi. Si è con assai frequenza osservato, che se sopravviene all'idropisia, all'asma, e alla febbre quartana, è vantaggiosa, e che i vecchi gottosi vivono lungo tempo: ognun sa, che la *gotta* all'estremità dà poco da temere, e che diversamente passa la cosa, quando portasi al tronco, alla testa, o che piomba sulle viscere. E' inutile il dire, che quella, che investe il cervello, il cuore, e i polmoni, è la più orribile. Si stima poco, allorchè eccita il vomito, la diarrea, ed anche la dissenteria, essendosi più volte osservato, essere state proficue le divise evacuazioni.

L'*ispezione anatomica* ci manifesta nelle articolazioni, che sono state inceppate, una spezie di tufo, o di materia cretacea, la quale cuopre non solo le ossa, le quali talvolta fa uscire del loro luogo, ma ancora le membrane, e i ligamenti: tuttavia non si trova nemmeno un atomo di questa materia nella capsula delle articolazioni. Sonosi vedute delle petrificazioni nel cervello, nel cuore, nel polmone; della renella, e più spesso delle pietre entro gli organi urinarij, per non parlare dei reni laceri, o disseccati, della milza indurita, del fegato granelloso, ec.

Non mancano palliativi per la *gotta*; ma è in estre-
mo

mo difficoltoso il curarla radicalmente. Il *parossismo* non vuole alcun rimedio, se non fossero cotali *topici addolcenti*, e *rilasianti*, colla più severa dieta. Per far uso in tal caso della *cavata del sangue*, bisogna avere delle molto buone ragioni: fanno i più sperimentati esserne assai fiate derivati dei gran malori, massime se non venga praticata nel primo instante dell' *invasione*, e che il paziente non sia *pletorico*: nulladimeno si pretende, che l' *emissione del sangue dal piede offeso* abbia *spessissimo fatto cessar la gotta*, come per incanto: ma una tal pratica non ci dà ella da temer cosa alcuna? I *purganti* altresì non debbono amministrare senza necessità, tuttochè non debban si temer tanto; ma è permesso il conservar libero il ventre con dei clisteri. Pericolosissimi in questo luogo sono i *narcotici*, e rendono perpetuamente per lo meno il male più lungo: tuttavia il *Sydenham* gli praticava, allorchè ve lo costringeva la violenza del dolore. I *topici*, che si propongono per la gotta, non sono indifferenti: sono veduti dei pessimi effetti dai *ripercussivi*, e dai *narcotici*, per le funeste *metastasi*, alle quali han dato luogo: possiamo al più al più servirci dei fiori di sambuco, o di camomilla, o della midolla di pane fatta bollire nel latte: molti sentonsi sollevati colla sola applicazione della cenere calda, e delle foglie di bardana. Vantasi grandemente il *Moxa* dei Chinesi sul principio dell' *attacco*; ed in mancanza di questo, può altri mettere in opera il lino, del quale si serviva *Ippocrate*, o qualsivoglia altra cosa combustibile, che possa far la funzione di *cauterio attuale*: da siffatte scottature ne ho veduti parecchi buoni effetti; ma alcune volte sonosene prodotte delle piaghe, che non son guarite, se non dopo lunghissimo tempo. Possiamo anche servirci colla mira medesima dei *vesicanti*, che ci danno poco da temere; ma l' *evento* sembra meno sicuro.

Quando il paziente è liberato dal *parossismo*, si deve operare per impedirne il ritorno: vi si può giungere per mezzo d' un buon governo, oppure colla *dieta bianca*, la quale è senza contrasto superiore a tutti i rimedj, e quello, che fa meno fallire le nostre speranze. Vi si può unire l' *uso del sapone*, del quale veggionsene alla giornata dei grandi effetti. E' *incontrastabilmente utilissimo l' esercizio*: tuttavia non ci difende per sempre. Sono grandemente raccomandate le fregagioni, e l' *uso*

l'uso della fanella ; ed uno si dee difendere con somma cura dal freddo, e dall'umido . Gli *amari* , gli *stomachici fortificanti* , e i *juvifici* , sebbene di minor efficacia del sapone, possono terminar felicemente questo morbo: la China, la *calamandrina*, o querciola, il camedrio, la pittima, la triaca, e la preparazioni antimoniali, son quelli, da' quali pare, cheiasi ricavato maggior vantaggio . Le *aque termali* prete per bocca, ed usate per via di docciatura, e di bagno, vengono assai commendate, e meritano d'esserlo, di pari che il bagno *delle vinacce*, ch'è uno dei migliori fortificanti, che possansi usare in questa occasione . Sonosi veduti pure degli ottimi effetti dall'applicazione dello spirito di tale mescolato coll'olio di trimentina . No fo parola dei rimedj generali, il cui prudente uso è accessorio a tutte le medicature .

Abbiamo detto, che il freddo, l'applicazione dei ripercussivi, e dei narcotici, l'eccedere nel bere, e nel mangiare, le passioni d'animo, ec. aprivano sovente la strada ad una *trasposizione della materia gottofa* alla volta del capo, del tronco, o delle viscere: questo è ciò, che addimandasi *gotta irregolare*, o volgarmente *rimonzata* . Il cervello, il polmone, lo stomaco, gl' intestini, ed i reni, sono le viscere, ch' ella investe più d'ordinario: in tutti i divisati casi deesi far tutto per richiamarla all' estremità . E' raro il potere in questo caso far di meno della *cavata del sangue*, massime di quella del piede, la qual sola determina bene spesso la gotta a portarvisi: questo fatto, ch'è noto a chicchessia, giustifica i nostri timori rispetto alle conseguenze di questa operazione praticata nel tempo del parossismo . I *purganti* sono sommamente necessari, e posson supplire al ritorno della gotta: conciossiachè abbiamo osservato, che il corso del ventre nel tempo stesso del parossismo era sovente salutare . I *cordiali*, e i *diaforetici*, la *noce moscada confettata*, la *xedoaria*, gli *amari*, la *china-china*, l'*alcol marziale*, ed altri *fortificanti*, in questo caso vengono amministrati pure con riuscita . I *calmani*, singolarmente le goccioline anodine, posson esser mescolati con li rimedj precedenti, quando non è investita la testa, e ch' è libero il respiro . Non parliamo d'altri infiniti rimedj, che si possono applicare ai diversi accidenti a norma delle regole generali . I *varj scioglimenti di ventre* essendo in questo caso più van-

tag-

taggioli , che nocevoli , ci dovremo guardare dal fissargli: si può anche allora far di meno di *richiamar la gotta all' estremità*; ma in tutti gli altri casi non bisogna perdere un momento, e procurare di divertir la tempesta minacciante la testa, o il petto, indirizzando alla volta dei piedi il moto della materia, che può risvegliarla. I mezzi, per li quali si può secondar con certezza questa mira, sono l' applicazione dei *sinapismi*, della *pece di Borgogna*, e simiglianti: si deve anche ne' casi urgenti servirsi dei *vescicanti*, il cui effetto è più spedito. Molti si contentano di tenere i *pie di in molles nell' acqua calda*, d' involupargli in una pelle di castratto, o di qualunque altro animale scorticato di fresco: le semplici fregagioni con una fanella calda hanno sovente prodotto l' effetto: ma quando vanno falliti tutti questi mezzi, lo che segue per lo più correndo stagione fredda, non rimane cosa migliore da farsi dell' insistere con li *purganti*: l' applicazione delle mignatte ai vasi emorroidali può essere anche in tali circostanze sommamente proficua.

IL REUMATISMO.

Noi abbiamo già fatto osservare, come questa infermità aveva dell' affinità molta colla descritta qu' innanzi, nè gli Antichi da quella tampoco la distinguevano; ma con tutto questo una è più curabile dell' altra: i dolori reumatici hanno la sede loro ne' involuppi, nelle aponeurosi, e nei tendini dei muscoli, dove la gotta investe per lo contrario i ligamenti: eppure la cagione mostra d' esser la stessa: laonde si vede, come il meno equivoco *reumatismo* degenera in verace gotta; oppure che questi due morbi confusi danno luogo a ciò, che addimandasi *reumatismo gotoso*. Il *reumatismo* attacca i muscoli dell' estremità, del collo, del dorso, delle mascelle, delle spalle, del petto, e del basso ventre: questo è *universale*, o *particolare*: qualora questo secondo investa i muscoli del collo, addimandasi volgarmente *torcicollo*: dicesi *pleuritide spuria*, se piombi su i muscoli del petto: *lombaggine*, s' ei si fissi nei lombi; e *sciatica*, se s' impossessi dell' anca, e della coscia. L' impressione del freddo, quando uno è riscaldato, le abitazioni umide, e fabbricate di fresco, la vita sedentaria, l' abuso del vino, e delle donne, il troncamento de' *menstrui*, dell' *emorroidi*, o di qualunque altro sgor-

go di sangue abituale, il regresso delle fioriture cutanee, ec. ne sono le più ordinarie cagioni: il *Sydenham* ha preteso, che disponga a questo morbo l'uso grande della china-china: ma non avrebb'egli quel grand' uomo attribuito a questo rimedio ciò, che aver potrebbe tutt'altro principio?

E' noto, che il *reumatismo* ha varj gradi, come la gotta: quando i dolori giungono a un certo dato termine, n'è sospesa l'azione de' muscoli, perchè il loro moto accresce il tormento. Coloro, che hanno voluto distinguere il *reumatismo in caldo*, e in *freddo*, non si sono fondati, che sulla presenza, o la lontananza della febbre. Comincia questo male comunemente con rigori di freddo, e colla febbre: quindi, vale a dire il secondo, od il terzo giorno, i dolori fanno più, o meno intensamente sentire: mutan luogo con frequenza, ed investono successivamente diverse parti, singolarmente nei giovani. La *febbre reumatica*, dalla quale vanno esenti gli attacchi leggieri, non ha alcun tipo: ora ella è debole, ora veemente, continua, o intermittente: questa termina d'ordinario in breve tempo; ma i dolori continuano di più, talvolta anche con violenza maggiore: assai comunemente persistono quei trenta, o quaranta giorni, alcuna fiata dei mesi, degli anni, ed anche per tutta la vita: i recenti posson essere accompagnati da rossezza, e da tensione della parte offesa, come nella gotta. Fa di mestieri osservare, come i *dolori reumatici*, non meno *fissi*, che *vaghi*, che fanno col moto più acuti, raddoppiano ancora in tempo di notte, e che quanto a questo punto, assomigliansi ai celtici, ed agli scorbutici: son meno violenti di quei della gotta; ma quei dei lombi sono intensissimi, e prendon talora per nefritici: il vomito però non si unisce alla lombaggine. Se talvolta si osserva la complicazione di questi due morbi, non ce ne dobbiamo maravigliare, attesa l'analogia, che passa fra la gotta, il reumatismo, ed il calcolo. Abbiamo già parlato del *reumatismo gotoso*; sicchè osserveremo soltanto in questo luogo, che il medesimo muta sovente la sua stazione, e per tal ragione è stato da molti chiamato *gota vaga*, denominazione per altro, di cui fanno altre applicazioni. Importa il non ignorare, che nella maggior parte dei *reumatismi cronici*, con qualche attenzione si scuopre una mescolanza di celtico, o di scorbutico, e che

ta-

talora accade, che si prendano per dolori reumatici quelli, che appartengono unicamente all'una, o all'altra di queste malattie. Non dobbiamo nemmeno tacere, che si cava nel reumatismo un sangue, che si cuopre d'una crosta verdastria, e che s'assomiglia grandemente a quella della pleuritide: quindi si è giudicato, che fosse infiammatorio; e si è da tale ipotesi concluso, che le sole copiose cavate di sangue potevano abbattere questo male..

Il reumatismo rade volte è pericoloso, qualora non si renda tale con una rea medicatura, o con alcun disordine nel governo, onde la materia morbosa s'incammini alla volta delle viscere, e singolarmente del cervello, e del polmone; dal che nascono degli accidenti niente meno formidabili di quelli della gotta rimontata.

L'universale il più delle volte si dilegua per li sudori, e talvolta con una fioritura alla cute: in alcuni segue un'evacuazione critica per le orine, per li menstrui, e per l'emorroidi. *Il reumatismo particolare* è d'ordinario più ostinato dell'*universale*, ma dà meno da temere: se l'uno, o l'altro vengono per parossismo, piegano più agevolmente la testa ai rimedj. *Il reumatismo invecchiato* inchioda tutte le membra; ed alla foggia stessa della gotta, storce, rovescia, e annoda le dita delle mani, e de' piedi, che ne rimangono contraffatte, e storpiate, e forma delle anchilosi nelle articolazioni stesse. Abbiamo detto, che si vedeva più felice il termine del reumatismo, che della gotta; poichè e chi non ha osservato, ch'è cosa più ovvia il trovar questa invecchiata, tuttochè quello sia più frequente?

L'apertura dei cadaveri manifesta sopra i muscoli, e le loro aponeurosi una concrezione, ora gelatinosa, ora di tufo, più, o meno abbondante, oltre gli altri prodotti della gotta da noi additati nell'articolo precedente; ma è agevole il giudicare, che questi sconcerti non debbon essere molto sensibili, se non quando queste malattie sono state invecchiate.

Nella febbre reumatica non si può per avventura fare a meno della cavata del sangue, massime quando v'è rossezza, e tensione nelle articolazioni; ma questa non è utile, se non se nei primi giorni del male: si è cento volte osservato, come dopo il settimo giorno rendeva la cavata del sangue il male più ostinato: non dee tampoco esser prodighi di sangue nel tempo additato: tre, o quattro cavate sono per lo più sufficienti, per quan-

quanto se ne dicano coloro , i quali pretendono , che si debba continuare a cavar sangue fino a che persistono la febbre , e i dolori , essendosi essi persuasi dall'inspezione del sangue esser questa un' infermità infiammatoria . Il Signor *Marquet* dice d' aver usato , come gli altri , le cavate del sangue , ma ch' essendosi avveduto , che tiravano in lungo la malattia , prolungandola per mesi , e per anni , le abbandonò poscia assolutamente , per limitarsi ai purganti , e ai sudorifici ; e che dopo d' aver mutato questo metodo , siffatte infermità non duravano nelle sue mani più di quei sette , od otto giorni ; il che merita d' esser bene osservato . Egli è talora necessario il far vomitare i pazienti dopo la prima cavata di sangue : quanto ai purganti non se ne dee far uso senza buone ragioni , se non verso il declinare del male ; ma importa assaiissimo il tenere il ventre libero in tutti i tempi , non meno coll' ajuto dei clisteri , che per quello dei più blandi lassativi . Gli allentanti , i rinfrescanti , i temperanti , i depuranti , e i diaforetici , i leggieri diuretici , ed anche gli aperienti , sono i rimedj , che si pongono in opera colla maggior felicità nel tempo del parossismo : allora si fa un uso grandissimo del siero : si stimano altresì i nitrosi , e la polvere temperante . La trementina , l' antimonio diaforetico , lo spirito di corno di cervo , quello di vipere , e tutti gli altri riscaldanti , che si amministrano assai familiarmente , vogliono grandissima circospezione , allorchè la febbre è energica ; essendosi più volte veduto , che ha degenerato in febbre infiammatoria . I calmanti ipnotici non s' addicono meglio al reumatismo , che alla gotta : posson questi divertire quelle spezie di crisi , che d' ordinario vengon dietro ai loro più violenti accessi ; oltredichè rendono tutt' e due questi mali più ostinati , e talvolta gli determinano verso il cervello : la canfora è il solo calmante , che si possa amministrare con sicurezza , e da cui sonosi provati costantemente de' buoni effetti : gli occhi di granchio , il corno di cervo preparato , e parecchi altri assorbenti in alcuni casi riescono utilissimi . Si raccomanda ancora il *rabarbaro* , e la *china* , la radice di bardana , e le coccole di ginepro , il *mercurio dolce* , e le pillole di *sapone* ; ma tutti questi rimedj non appartengono più che al reumatismo cronico , per cui si è data ancora talvolta con molta riuscita l'acqua di lattuga . Finalmente tutti quelli , dei quali abbiamo fatto men-

zio-

zione nell'articolo precedente, possono riferirsi a questo: ma non vi è cosa più atta ad impedire il ritorno di questo male, del latte, dell'acque minerali, e dei brodi di vipera.

Quanto ai rimedj esterni, si propongono i bagni freddi: se ho a dire la verità, io non ne ho veduto da una tal pratica rei effetti; ma non mi è mai sembrato, che ne producano dei così prodigiosi, come ci hanno voluto dare ad intendere. I topici più adoperati sono, il grasso umano, il grasso d'orso, il midollo di cervo, l'unguento d'altea, l'olio di lombrichi, di camomilla, e di lauro, la midolla di pane, e simiglianti. Si applicano parimente delle vesciche piene di latte, delle palle di stagno piene d'acqua calda, degli animali vivi, ec. Finalmente ricorriamo al balsamo tranquillo, e ad altri calmanti per ammansare i dolori intensi; ma l'uso loro è sempre paruto sospetto. Quando i dolori accompagnati da tensione, e da rossezza non hanno ceduto alle cavate di sangue, e agli altri rimedj, si propone d'applicare le mignatte alla parte, ed anche i vescicanti, ed un tal metodo produce felicissimi effetti. Il reumatismo cronico richiede altri ajuti: tali sono l'uso della fanella, le stufe, o i bagni di vapore; i bagni delle acque termali, come di Plombieres, di Vichy, di Bourbon-l'Archambot, di Balaruc, di Digne, d'Aix-la-Chapelle, ec. i bagni di vinacce, l'applicazione dei fanghi minerali, le fregagioni con tovaglioli, o con fanella calda, per non parlare dei cauterj, dei setoni, dai quali non possiamo prometterci, se non buoni effetti. Finalmente non è a mia contezza cosa più efficace pel reumatismo confinato a qualche parte, dell'azione dei muscoli, che ne sono la sede: un siffatto rimedio è veramente penoso; ma è egregio. Rispetto al reumatismo del collo, non addimanda, se non il calore, ed i profumi coll'incenso, e il Karabè ec. E' inutile il dire, che quando la soppressione d'alcuno sfogo, od il rientramento di qualche eruzione, hanno prodotto questo male, prima di tutto, si dee procurare di richiamargli; ed in queste circostanze non abbisognano d'ordinario altri rimedj.

AFFEZIONE IPOCONDRIACA.

La denominazione di questo morbo è cavata, come è noto, dagl'ipocondrj, che credonfi esserne la sede principa-

capale: alcune in apparenza ben fondate congetture lo stabiliscono nelle vene, che concorrono alla formazione della Porta. Comunque ciò sia, questa malattia compare tutta *spasmodica*, e n'è ugualmente, o tors'anche più attaccato lo spirito, che il corpo: quindi è, che il nome *ipocondriaco* è divenuto ingiurioso, e perciò i Medici, che amano di piacere alla gente, schivano d'usarlo, e col nostro volgo danno a una tale affezione il nome insufficiente di *vapori*. Questo male è comune dall'età dei venti anni fino ai cinquanta: quindi cede d'ordinario il posto allo scorbutico, o alla gotta. Sembra, che le flatuosità compagne indivisibili di questo stato disturbino tutte le funzioni delle viscere del basso ventre; sconcerto, che in brev'ora si comunica alla testa. Gl'ipocondriaci per lo più son persone di talento, ed hanno un'invincibile inclinazione al meditare: soprattutto è quasi impossibile il distoglierli dal riflettere sul loro stato, e lo staccargli dall'amore alla solitudine. Una disposizione ereditaria, l'*avversità*, i *disgusti*, l'*applicazione soverchia*, lo *spessamento* del corpo, e dello spirito, la vita molle, e voluttuosa, l'abuso dei vomitivi, dei purganti, e dei narcotici, lo sperma ritenuto, la soppressione della gonorrea, del flusso emorroidale, dello scioglimento abituale del ventre, il cessamento straordinario della febbre intermittente, ec. sono le più *ordinarie cagioni* di questo male, il quale, come diremo in seguito, non differisce essenzialmente da quello, che nelle donne dicesi *isterico*.

L'*affezione ipocondriaca* si manifesta colle ventosità, che agiscono principalmente sopra lo stomaco, e l'esofago, colla svogliatezza, con la cardialgia, o coll'ardore di stomaco, colla *tumefazione degl'ipocondrij*, e col rigonfiamento anche di tutto il basso ventre. I vomiti in questo caso son frequenti, e s'accostano talora alla passione iliaca: molti vomitano delle ghiare fetenti, delle materie acri, o acide, dalle quali rimangono offesi i denti. Sentesi in alcuni la pulsazione della ciliaca: quasi tutti sentono dei *dolori sotto le coste spurie*, o nelle altre parti del basso ventre: ne provano talora dei lanciativi, e dei più acuti nelle viscere, che s'affomigliano alla colica epatica, all'intestinale, e alla nefritica; ma questi non vengono, che per parossismo. E' cosa rara, che in questo male non si provino dei *vut- ti acidi*, ed un frequente sputo di mucchi; e talvolta

non è disgiunto da *ansietà*, e da *svenimenti*. Le orine sono bianchicce; e si prova anche una frequente voglia di renderle, e spesso del bruciore in rendendole. Provano i pazienti un serramento di petto, che non si può rilevare, che per la loro relazione: le *palpitazioni*, e i tremori del cuore, con frequenza son manifesti. Sofrono degli aggravativi dolori di capo, ed hanno degli *stordimenti*, e delle *vertigini*: il sonno poi, o manca loro del tutto, o hannolo interrotto, ed inquieto. *Terrori panici*, che non si dileguano in faccia alla ragione, la tristezza, un'orrida malinconia, ed uno *spavento* grande per lo stato loro, turban loro sovente l'immaginazione, e la guastano. Le *convulsioni*, il tremore, l'*intorpidimento* di tutte le membra, la palpitazione dei muscoli, sono altresì comunissimi sintomi. Lagnansi ancora d'uno scampanio alle orecchie, che diminuisce l'udito, degli strangolamenti alle faringi, e all'esofago, che impediscono il deglutire. Alcuni hanno una *febbre erratica*: altri si lamentano d'una vicenda di freddo, e di caldo, e provano ancora dei brividi: il polso è lento, piccolo, e intermittente. Provanfi dei *calori alla palma della mano*, e *alle piante*, dei *sudori notturni*, dei *dolori vaghi*, i quali quando sono al petto, diconsi *puncture di lato*. L'*emorroidi* aride, e grondanti, son parimente una conseguenza di questo stato, il quale precipita insensibilmente nel marasmo. Ultimamente un tal morbo ha dei *parossismi*, che fan gran paura, rispettivamente alla testa, e al basso ventre: spessissimo è complicato, e la maggior parte degli Scrittori non han lasciato d'addossargli tutti i sintomi, che spettano a tutte quelle malattie, che a questa s'uniscono: quindi hanno avuto origine quelle descrizioni sì vaghe, e sì caricate; come altresì l'opinione, che si ha, che questa affezione comparisca in iscena sotto tutte le forme di morbi, lo che non s'accorda sempre coll'osservazione esatta, e riflessa.

L'affezione ipocondriaca fa più paura, di quello sia pericolosa: l'inviechiata fa testa a tutti i rimedj, e stanca alla perfine la più flemmatica pazienza dei Medici, e degl'infermi. Precipita nello scorbutico, nella cachessia, nell'idropisia, nell'asina, nella febbre lenta, e nell'atrofia: taluni finalmente divengono maniaci. Si è osservato, come il flusso emorroidale aveva fatto cessare questa infermità con frequenza: sonosi anche veduti dei
buoni

buoni effetti dal vomito sanguino, tuttochè da principio facesse paura grande: si è di pari osservato, che gl' ipocondriaci trovavansi molto al coperto delle malattie epidemiche, e perfino dalla pestilenza; ma questo passeggero vantaggio non gli compensa della truce amarezza, onde riempie questo morbo tutta la loro vita.

Veggionsi in quasi tutti i *cadaveri* degli stivamenti, e delle *dilatazioni varicose* nelle vene, che concorrono alla formazione della Porta: io ho trovato questi stessi vasi sì enormemente dilatati, che sarebbonsi potuti prendere per intestini. Si osservano anche comunemente delle *ostruzioni*, degli scirri, delle suppurazioni, delle putrefazioni, e degli sfaceli, al fegato, alla milza, al pancreas, all'epiploon, al mesenterio, e perfino alle capsule atrabiliari. Veggionsi con frequenza delle pietruzze nella cistifellea. La *milza* comparisce più, o meno tumefatta, e talvolta mostruosa, non meno pel suo volume, che per le sue appendici: talora si è trovata sì picciola, che non pesava più d'un'oncia: in un soggetto si pretese perfino, che mancasse totalmente: non vi è dubbio, che questa parte non sia frequentemente attaccata; ma è di pari certissimo, che la medesima non lo è sempre, e che molte volte si è trovata sanissima, quantunque le altre parti fossero somminamente straziate: lo che non s'accorda coll'opinione di coloro, che la risguardano per la principal fucina di questo morbo. In un gran numero di costoro si è osservato il piloro scirroso, e strozzato, lo stomaco pieno zeppo d'una materia nericcia, e fetente, estremamente dilatato, di pari che il colon: sonosi scoperti pure nel basso ventre dei tumori anomali, aderenti al mesenterio, o ad altre parti. Il *petto* ci ha fatto vedere i polmoni inariditi, stivati, e aderenti alle parti vicine; il cuore secco, e inaridito, incollato al suo pericardio, i suoi ventricoli contenenti un sangue nericcio, e fisso, seroso, e fetente, delle concrezioni polipose, degli abcessi alle auricole, degli aneurismi all'aorta, ec.

Il *cervello* finalmente ci ha presentato i vasi stivati d'un sangue nero, e fisso, delle putrefazioni, e suppurazioni, degli stravasamenti serosi, saniosi, mucosi, ec. per non parlare delle altre idropisie, e dei prodotti, che debbonsi riferire alle malattie, che vengono dietro a quella, di cui ragioniamo.

Le mire principali, che debbonsi avere nella medica-

tura, si riducono ad irrorare il sangue, o stemprarlo a rimediare alla tensione dei solidi, e singolarmente dei nervi, ed a ricovrare lo smarrito spirito degli ammalati. La *cavata del sangue*, qualora non la richieggano accidenti stranieri al male, in questo caso è del tutto inutile, ed anche pericolosa. I *vomitivi*, e i *purganti* sono indubitabilmente necessari; ma dee schivarsene l'abuso, nè discendervi ogni volta che tali infermi lo vorrebbero; poich' ella è cosa certissima, che i medesimi con gran frequenza intristiscono tutti i sintomi; oltredichè danno benissimo i Pratici, che questi non vengono alla costipazione, e che rendono la sempre più ostinata: le *prugne secche* in questo caso possono usarsi: i *sali a' Epsom*, e di *Sealitz* presi in quantità abbondevole d'acqua sono i più adattati all'afezione ipocondriaca. Si fa un uso grande degli *allentanti*, e dei *temperanti*, come del siero, dei cicoracei, dei capillari, della fumaria, del crescione, e dei gamberi. Utilissima si è bene spesso la *dieta bianca*, di pari che il latte tagliato con l'acque di Seltz. Gli *aperienti*, i *marriziali*, e gli *amari*, come i centogambe, il polipodio, il rabarbaro, la china, ed anche l'aloe, di cui fanno un uso così familiare, non s'appropriano, che a pochissimi soggetti. La *magnesia*, e gli altri *assorbenti*, che si possono mescolare con li purganti, producono in alcune circostanze effetti assai buoni. Le radici d'enullica campana, di valeriana, e di peonia, le foglie di melissa, e di menta, i fiori di tiglio, e di quaglia-latte, la rucobetta, il cascium, l'acqua di fior d'arancio, l'estratto di ginepro, la polvere di guttera, ed altri *stomachici*, e *antispasmodici*, sono rimedj, che si possono amministrare con riuscita. Gl'*ipnotici* tanto bramati da alcuni infermi debbon darli con riserva, e la *canfora* può vantaggiosamente supplirvi. Le acque di Vals, di Montfrin, di Passy, di Forges, di Cransac, di Spà, di Sedlitz, di Miers, di Sant-Amando, ec. sono state sovente più efficaci d'ogni rimedio. Non debbonsi trascurare, sì nelle remittenze, che nei parossismi i *lavativi*, essendo ugualmente importantissimo nell'uno, e nell'altro caso il mantener libero il ventre. Sono altresì molto raccomandati i *bagni domestici*, nè l'ipocondriaco potrebbe mai rientrarvi tanto che bastasse. Dirò altrove ciò, che dee pensarsi del preteso elleboro delle nostre botteghe, che molti sulla fede degli Antichi vogliono

porre in opera in questo caso. Si rimedia finalmente ai *parossismi* coll'odore, col vapore, o fumo delle droghe, e delle composizioni fetide, con li bagni caldi alle gambe, colle fregagioni, ec. Si amministra in questo caso la *canfora* per bocca, la *tintura di castoreo*, le *gocce d'Inghilterra*, lo *spirito di sale ammoniaco*, l'*acqua dilueta*, i *sali volatili*, ed altri, che si applican tuttora all'affezione isterica.

Dopo d'aver proposto tanti rimedj, quantunque non facciano, che una parte di quelli, che s'amministrano alla giornata contro l'affezione ipocondriaca, io crederai d'operar contro ai miei lumi, ed alla mia stessa coscienza, s'io tralasciassi di palesare, come molti pazienti dopo d'averne fatto uso in tutti i tempi, in tutte le maniere, sono stati alla perfine forzati ad abbandonargli tutti; e che quest'Epoca è stata il principio della loro convalescenza. Un governo beninteso, le copiose bevande, l'esercizio gradevole, e moderato, il divertimento, e più d'ogni altro, il dilungamento da qualsivoglia applicazione seria, sono quasi tutto quello, che si addice a questo morbo: ma quei tali, che hanno la disgrazia d'esserne infettati, hanno anche l'altra di prometterli tutto dai Medici, e si può riguardare anche questa mania, come un vero sintoma di questa stravagantissima infermità. Mi è assai volte toccato a combatterla col dare ai pazienti il consiglio del *Montano* (*Fuge Medicos, & Medicamina*); consiglio, che molti hanno avuto gran piacere d'aver seguito, massime quando si ha il coraggio d'acquietarsi.

L' I D R O P I S I A .

Conosce ognuno l'*idropisia*, che occupa tutto l'*abito del corpo*: si manifesta bastantemente quella del basso ventre: quella del peritoneo, delle ovaje, ed altri insaccamenti, che hanno acquistato un certo volume, si possono scuoprire senza gran malagevolezza: ma è in estremo difficile il ben giudicare di quella del cervello, e della spinal midolla; di quella del petto, del pericardio, massime quando non si mostra al di fuori alcuno edema. Parleremo altrove di tutte queste idropisie particolari, non essendo questo articolo destinato, che alla generale. L'*idropisia* investe con più frequenza quelli, che menano una vita sedentaria, o che abitano in luoghi umidi, i bevitori, le donne, ec. Viene ancora in

seguito d'alcune malattie acute: tali sono la febbre maligna, e l'ardente, la rosolia, il vajuolo, ec. e quasi tutte le malattie croniche, come le ostruzioni invecchiate, la cachessia, l'itterizia, lo scorbutico, la gotta, la febbre quartana, ec. Le perdite grandi di sangue, gli antichi scioglimenti di ventre, ed altre trasmodate evacuazioni, ne sono pure la sorgente: espone al pericolo stesso la loro soppressione, quando queste sono antiche. La *ragna*, e le altre eruzioni tornate indietro, le ulceri, e le *fistole seccatesi*, possono precipitare nello stesso morbo, per non far parola degli scirri, dei tumori, degli abcessi, delle ulceri, e putrefazioni interne, le quali terminano per lo più nell'idropisia.

La *leucostemmazia* primitiva comincia sempre mai dalla cachessia, dall'enfiagione dei malleoli, che si dilegua la mattina; in seguito si prova una leggiera difficoltà di respiro, e talvolta la tosse, e la sete. Tuttavia l'enfiagione si stende sopra la gamba, sul ginocchio, e va prendendo tratto tratto possesso di tutte le altre parti; ma l'*edema delle gambe* non è sempre un segno dell'idropisia: è noto, come la maggior parte di coloro, che stanno spesso, e per lungo tempo in piedi, o che fanno dei lunghi viaggi a cavallo: che le donne incinte, le fanciulle dal color pallido, e finalmente i vecchi, vi sono grandemente soggetti, senza però divenire idropici. Quando l'ascite, o alcuno sconcerto, si nel petto, che nel basso ventre spianan la strada alla *leucostemmazia*, l'edema può investire il ventre, i reni, il petto, il volto, e le braccia, prima di piombare ai piedi. Lo scroto nell'uno, e nell'altro caso può enormemente gonfiarsi, di pari che la verga, la quale si torce, e s'oppone anche talvolta allo sgorgo dell'orina, la quale in questo male è d'ordinario bianca, ed in poca quantità: comparisce talora d'un colore di matton cotto, quando vi è stravaso nel basso ventre, o che sia intaccato il fegato. Quanto al sudore, manca assolutamente, od in estremo raro.

Si sana senza gran difficoltà la leucostemmazia, che sopravviene dopo una gran perdita di sangue, e dopo qualsivoglia altro accidente: ma quella, ch'è conseguenza d'un'evacuazione abituale troncata, d'una fioritura cutanea rientrata, ec. è più ribelle. Non se ne ha sommo timore, qualora sia il prodotto d'una malattia acuta, della febbre intermittente, ed anche dell'asma: si

spera altresì, se il paziente è giovane, e d'una buona costituzione: ma vien considerata mortale, quando succede a un morbo cronico, mantenuto da un vizio delle viscere: si tiene eziandio per incurabile nei vecchi; e se in tutti i casi divisati si giunge a dileguarla, ci dobbiamo prometterne il ritorno. Contuttociò per giudicar dell'evento, uno si regola sul grado d'aridità della lingua, sulla frequenza della tosse, sul respiro più, o meno libero, sullo stato delle forze, e del polso: importantissimo si è pure in questo caso l'esame delle urine. Si prende buono augurio dalla diarrea, che si stabilisce sul principio del male; ma è pericolosa nell'idropisia invecchiata, massime se non procura alcun sollievo: lo che è molto ordinario in quei tali, che hanno le viscere offese: in tali circostanze ella non impedisce l'inondazione del petto, e del basso ventre. Abbiamo detto, che non dovevamo temer gran fatto dell'enfiagione delle gambe, che sopravviene per accidente: quella dei convalescenti si dilegua col ricoveramento delle forze: finalmente non dà da temere il gonfiore del viso nelle malattie acute.

Dall'ispezione anatomica ci vengono manifestate, oltre le inondazioni d'ogni specie, viscere scolorite, offritte, scirrofe, inaridite, purulenti, putride ec. tumori infaccati, vesciculari, di forme varie di tutte le grandezze, e aderenti a diverse parti. Veggionsi nel basso ventre, lungo i vasi del fegato, e della milza, dei tubercoli scirrofi: le vene contengono un sangue nero, riarso, o come scottato, ed alcuna fiata delle concrezioni di tufo. Il fegato comparisce livido, bianco, e privo di sangue, macchiato, nero, piombino, scirroso, e talora della durezza della pietra, disseccato, torrefatto, putrido, ec. Asconde entro di se delle deposizioni purulente, e delle idatidi: il suo volume ora è grosso, ora picciolo, e la sua superficie disuguale, bernoccoluta, e piena zeppa d'idatidi. La cistifellea contiene bene spesso una bile nera, e delle pietre: vi si è veduta una materia limpida, e dolcigna, un umor lattiginoso, ec. La milza ora è d'una smisurata grossezza, ora estremamente picciola: la sua sostanza si è trovata putrida, scirrofa, granellota, ed anche piena di bianche pietruzze. Trovasi l'epiploon estenuato, putrefatto, e distrutto, ovvero ingrandito all'eccesso, e scirroso. Lo stomaco, e le budella compariscono sovente

infiammate, cancrenate, esulcerate, scirrofe, ed attaccate insieme: il mesenterio, i reni, le ovaje, e la matrice, sono sottoposte ai medesimi sconcerti. Simigliantemente veggionsi nel basso ventre dei tumori anomali putridi, e suppurati, aderenti alle vertebre, che non lasciano di cariare, delle idatidi sparse per tutto, delle fungosità scirrofe, che s'innalzano dal fegato, dal pancreas, ec. L'apertura del petto svela il polmone edematoso, o gonfiato, scirroso, con dei tubercoli, suppurato, putrido, in parte distrutto, aderente alla pleura al mediastino, ec. Il cuore ora è prodigiosamente grosso, ora picciolo, e lacerato: in molti i ventricoli sono pieni zeppi di sangue: in alcuni ne sono affatto senza; v' si rilevano ancora delle concrezioni polipose, e delle tartarose nel corpo delle valvule arteriali. Si veggion talvolta degli abscessi nella superficie di questa viscera, ed è pari che in quella delle divitate auricole: il pericardio nella maggior parte contiene un umor putrido, od una quantità grande d'acqua: talvolta trovasi in secco, come incollato a tutta la superficie del cuore, e delle auricole. Le osservazioni risguardanti il cervello sono state più trascurate: ciò non ostante vi si son vedute delle depurazioni, e delle putrefazioni, il plesso coroide stivato, varicoso, carico d'idatidi, e le cavità inondate.

Non vi è dubbio, che la *cavata del sangue* non sia necessaria, allorchè i flussi mensurali, l'emorroidi, o qualunque altro sgorgo di sangue abituale, sono stati soppressi; la medesima può essere anche vantaggiosa nel principio del male, quando il paziente è giovane, e di buona costituzione; ma negli altri casi non ne possiamo aspettare, se non rei effetti: se si applica alle oppresioni, si solleva per un poco l'infermo; ma si rende il suo stato più tristo: l'emetico su i principj è adeguato: può altresì esser utile, allorchè il male è avanzato; ma non vi ci dobbiamo determinare, se non dopo d'aver consultato le forze, essendo accaduto, che i pazienti son periti sotto gli sforzi del vomito. I purganti, e singolarmente gl' *idragogi*, possono aver luogo in tutte le corti del male: tuttavia producono pochi effetti quando è invecchiato, o che nel ventre si è formato un qualche stravattamento. Si può dire rispetto a questi evaceanti, che quando non se ne ritrae alcun sensibile vantaggio, non se ne potrebbe continuar l'uso senza pericolo; essendosi assai volte veduto, che l'abu-

abuso fattone ha eccitato nelle prime vie delle infiammazioni, e delle cancrene: i più usati sono la gialappa, e il rabarbaro, la radice d'iride, la scorza di sambuco, la gomma gutta, l'elaterio, il diagraudio, il sale policresto, il mercurio dolce, lo sciroppo di pruno, l'acquavite tedesca, e somiglianti. Fassi in questo caso, com'è noto, un grand'uso degli *epatici*, e degli *aperienti*: tali sono la scolopendra, i capillari, i cicoracei, la fumaria, l'agrimonia, e la pimpinella, la radice d'appio, di spergolo, di finocchio, e di garancia, quella d'eringio, di brusco, ec. I *diuretici* son raccomandati anche di più; con questa mira ci serviamo delle radici di ravanello, di brionia, e di scilla, dei frutti d'alkekengi, del nitro, dei sali lissiviali, dell'arcano duplicato, della terra sfogliata di tartaro, della rannata di ginestra, come altresì di quelle d'affenzio, di ginepro, e di fermenti, del vino, e dell'offimele scillitico, dei centogambe, ec. Sonosi veduti degli ottimi effetti dalla polvere di rospo, o di botta, alla dose d'uno scrupolo, e di vantaggio presa nel vino bianco: propongonsi eziandio nei casi estremi le canterelle, dalla quarta parte d'un grano fino a uno, e anche due grani: questo rimedio è ben riuscito nelle mani d'un ciarlatano; e perchè dunque i Medici non lo potrebbero mettere in opera colla stessa buona riuscita? Nella medicatura di questo male non sono stati dimenticati i *sudorifici*: molti pretendono d'avergli amministrati con buono evento: quanto a me, confesserò ingenuamente di non aver veduto guarire alcuno per via di sudori eccitati da rimedj interni, pochissimi per quella dei purganti, ma moltissimi per mezzo dei diuretici, e dei fortificanti, nel qual numero convien porre i *marziali*, gli *amari*, e gli *stomachici*, i più messi in opera de' quali sono le radici d'angelica, la cassia legnosa, le coccole di ginepro, il cachou, le precipitazioni calibeate, l'*elixir proprietatis*, ec. Le *acque minerali*, sì fredde, che calde, e specialmente quelle di Plombieres, e di Bourbon-Lancy, in questo caso hanno una particolar sede; ma per promettersele tutto il vantaggio non bisogna aspettare a prenderle, quando il male si è molto avanzato. Quantunque i *calmanti* non influiscano in modo alcuno sopra la guarigione, non si lascia tuttavia d'adoperarne talora per ritardar la carriera degli altri rimedj. Rispetto agli *antiscurbutici*, in questo male non son pro-

prj , se non in quanto l'idropisia sia il prodotto dello scorbuto.

Molti , che non avevan ricevuto il menomo sollievo da quei rimedj , che passano per li più efficaci , hanno rinvenuto la lor salute nella privazione d' ogni sorta di bevanda : questo governo è stato praticato per più mesi , ed anche un anno intiero , con riuscita : allora quando il paziente è stimolato dalla sete , si calma con un crostino intinto nell'acquavite , o in qualsivoglia altra guisa , senza bere il liquore . Sonosi di parii veduti dei buoni effetti dai sudori eccitati da calore esterno , come dalle stufe , dal bagno di sabbia , o di crusca , riscaldate al Sole , o nel forno , dalle fregagioni fatte colla fanella calda , ec. Ma nulla affatto ci dobbiamo promettere da quei rimedj , i quali non dilungano , che il solo prodotto dal male , quando sono intaccate le viscere . Finalmente siccome si è talvolta veduto , che la natura aveva formato nelle gambe delle crepature , dalle quali l' acqua degl' idropici era sgorgata , e che le scottature , com'è noto , hanno prodotto la cosa stessa , come io medesimo vidi accadere una volta a certa femmina , che si considerava incurabile , la quale si rifandò perfettamente a motivo della copia grande dell' acque , che s' aprirono il varco per entro una piaga , che gli aveva cagionato uno scaldaletto troppo arroventito ; così si è creduto di poter imitare queste fortunate casualità , col fare delle scarificazioni alle gambe , o con applicarvi dei vescicanti , e dei canterj ; ma la cancrena , che con frequenza vi è sopraggiunta , ha fatto abbandonar questa pratica , la quale però non dee nei casi estremi rigettarsi in niun modo : oltredichè l'accidente , di cui parliamo , è da temersi meno , quando fanno questi tentativi sopra le cosce , ec. i cui tegumenti son più rilassati , e manco sensibili , per non parlare dei mezzi per impedir tal disordine .

RISTAGNO DEL SANGUE , E DELLA MARCIA .

Questi morbi rade volte curabili , il più delle volte non si manifestano , che dopo la morte ; sarebbe perfino inutile il favellarne , se non si potesse giunger talvolta a scuoprirgli , ed anche a porvi riparo . Non fa d' uopo il dire , che quando segue un istantaneo stravaso di sangue nelle cavità del cervello , non si potrebbe schivare una morte pronta , come accade patentemente nella

mag-

maggior parte degli apopletici : dee altri aspettarsi la sorte medesima, se lo stravasamento segue entro la cavità del petto, o in quella del pericardio, per la rottura dei vasi apparenti, e principalmente per lo sfiancamento degli aneurismi; ma quando riconosce la sua sorgente, tanto nella testa, che nel petto, e nel basso ventre, dall'erosione dei piccioli vasi, allora non non si fa, che un trasudamento, il cui effetto, benchè più lento, non ne riesce meno terribile, e funesto. Trovasi ancora del sangue sparso nei seni ossei della testa, e nelle cavità dell'orecchia interna: nello stomaco, e nel canale degli intestini, nella matrice, nella vescica, nel cisto dell'idrocele, ed in quello d'alcuni tumori anomali: trovasene di più in tutta l'estensione del corpo cellulare: io ne ho veduta una deposizione sommaramente considerabile fra le picciole foglie del cinto muscoloso del basso ventre. Ognun sa, che se ne formano in tutte le parti dopo le cadute, i colpi, e le piaghe.

E' noto, che gli *abscessi*, che apronsi nelle cavità della testa, del petto, e del basso ventre, come in tutte quelle delle parti, che abbiamo nominate, eccitano degli *stravasamenti purulenti*, e *saniosi*, che dallo star fermi rendonsi talvolta fangosi, e fetentissimi. E' agevole il conoscerli dai segni dell'inflammazione, e della suppurazione, che gli precedono. Ma seguono altre *suppurazioni indolenti*, senz' apparente inflammatione, dalle quali la marcia trasuda a traverso le parti, ove non rilevasi alcuna traccia d'abscesso, nemmeno d'ulcera. Siffatte specie di suppurazioni sono comuni alla superficie del cervello, a quella del polmone, del cuore, degli intestini, ec. Il ristagno, che ne risulta, difficilissimo a distinguerli da quello d'ogni altro liquido, non è mai molto considerabile, nè d'ordinario si manifesta, se non per l'*apertura dei cadaveri*.

La serosità stravasata in tutte le cavità, può, siccome non se ne dubita, riassorbirsi, e non ne mancano esempi. Ma la natura non ha questo ripiego pel sangue, ch'è fuori de' suoi vasi, e la marcia, che ha abbandonata la sua fucina; di modo che nell'uno, e nell'altro caso non vi resta da prenderli altro partito, se non se quello dell'evacuazione: la faccenda non è difficoltosa, quando il sangue, o la marcia stagnano nelle parti, che hanno alcuna uscita; ma quando questi liquidi trovansi rinchiusi nelle cavità della testa, del petto, e del basso ventre, vi s' in-

s'incontrano difficoltà quasi insuperabili dall'arte. Parleremo dei mezzi, che la medesima pone in opera, negli Articoli particolari, nei quali cadauno di questi morbi avrà il proprio suo luogo.

STIVAMENTI, E SCIRRI.

Le ostruzioni delle viscere sono le malattie più comuni, e forse le meno schiarite: le *osservazioni anatomiche*, che ci s' offrono qui in ajuto, ci somministrano quasi tutto quello, che dir dobbiamo in questo proposito. Gli imbarazzi, che ci rappresentano questi distati, sembrano essere *sanguigni*, o *linfatici*: sommi a spiegar questi termini per dilungare ogni sospetto d'ipotesi. Io intendo per *stivamenti sanguigni* quelli, che investono i giovani, e i pletorici: che sopravvengono al troncamento di sgorgi di sangue abituali, e ad altri casi, che riconoscono la pienezza dei vasi: occupano questi principalmente il polmone, ed il fegato: investono bruscamente, e d'ordinario son dolorosi, o accompagnati da un calore, ch' è particolare a questa specie di stivamento, sì comune nella maggior parte delle febbri, dalle quali egli è pertanto alcuna volta indipendente: può degenerare in vera infiammazione, ed è per avventura il primo grado di quella. Gli *stivamenti*, che diconsi *linfatici*, benchè io non sappia, se debbansi attribuire piuttosto alla linfa, che a qualsivoglia altro umore, sono comunissimi fra i melancolici, fra i flemmatici, fra i cachetici, fra gli scrofolosi, e fra gli scorbutici. Possono altresì essere la conseguenza degli stivamenti sanguigni, e delle infiammazioni; della febbre quartana, e di molte altre croniche infermità. I loro avanzamenti son lentissimi: il dolore, se ve ne ha, è leggiero, e ottuso, e allora passano per semplici ostruzioni; ma che posson cangiarsi in *scirri*, de' quali esse sono verisimilmente il primo grado: è noto, che le glandule, e le viscere sono la sede ordinaria degli scirri. Non debbo lasciar di dire, che incontransi talora degli *stivamenti*, massime nel polmone, che mostrano d' unire insieme i due caratteri, e dei quali è in estremo difficile il fare un buon giudizio: tutto quello, ch' io ne ho potuto rilevare, si è, che terminano secondo le circostanze cavate dal soggetto, e dalla medicatura, ora coll' infiammazione, ora collo scirro. L' inazione, di pari che le *profonde meditazioni*,

gli alimenti grossolani, e l'abuso di certi rimedj, possono spianar la via agli stivamenti linfatici: questi riconoscono eziandio la soppressione dell' *evacuazioni abituali*, e del *regresso dell' evuzioni*, per non parlare della disposizione ereditaria. Quantunque gli stivamenti linfatici sieno comunissimamente il prodotto d'una malattia, ch'è preceduta, o che tuttora esiste; non si lascia tuttavia di considerer questo accidente, come l'infermità principale, verso la quale bisogna indirizzar le nostre mire. Noi non parleremo in questo luogo degli scirri della bocca, delle glandule salivali, del collo, delle mammelle, dell'anguinaja, delle ascelle, e d'altri esterni, poichè avranno il loro luogo altrove.

Non è agevole il conoscere gli *stivamenti sanguigni*, sì del petto, che del basso ventre, perchè i *loro segni*, de' quali abbiain parlato, si confondono con quelli dell' infiammazione; ma i primi sono più miti, e la conseguenza di questi morbi non è la stessa: lo stivamento semplice può dileguarsi intieramente in meno di due giorni, lo che non segue mai dell' infiammazione: questa termina col discioglimento, o colla suppurazione, prima del settimo giorno: quello può durare di vantaggio. Minore non è la difficoltà, che ci vien presentata dalle ostruzioni, e le confermate non sempre si manifestano: quantunque le viscere ostrutte abbiano d'ordinario un volume più grosso, e sieno più dure di quello sienolo nello stato naturale; tuttavia non è così agevole, come altri pensa, il giudicarne pel tratto, allorchè il soggetto è pienotto di carne, che il male è profondo; o che non si è molto avanzato: e ciò, che viene intorno a ciò asserito, è una mera ciarlataneria. Con molta facilità nelle persone magre si tocca il fegato, e la milza; ma vi è maggior difficoltà pel pancreas, pel mesenterio, ec. Tuttavia le *ostruzioni*, e gli *scirri* non accrescono sempre il volume delle viscere; con molta frequenza lo diminuiscono, e lo disseccano, lo ch'è molto ovvio nel fegato. Allora si può conoscere un tale stato da un *dolore ottuso*, che talora vien renduto più vivo toccando la parte, da una *sensazione* di peso, o di pressione, di cui i pazienti si lagnano; di modo che altri con frequenza s'ingannerebbe, qualora non si potesse giudicare degli scirri interni, se non se dalla durezza, e dalla insensibilità, che loro s'attribuisce. Non si conosce nemme-

no talvolta la loro sede, quando si sente la loro resistenza, poichè nulla può accertarsi di positivo rispetto alla profondità del male; oltre l'accadere talvolta, che questi non occupino le viscere, e che sieno formati in tessuto cellulare, ora in uno, ora in altro sito.

Il tocco, alcuna volta insufficiente, non è il solo mezzo, onde possiamo rilevare le ostruzioni, e gli scirri: si può giudicarne, come abbiamo indicato, dal senso di dolore, di peso, o di pressione, che provasi comunemente alla parte offesa, dall'enfiagione di tutto il ventre, dalla pallidezza, dal gonfiamento della faccia, de' piedi, dal respiro inceppato, e perfino dalla tosse, massime allorchè sono intaccati il fegato, e la milza, dalle ansietà, e palpitazioni, dalla svogliatezza, dalla difficoltà di digerire, dai rutti, e dalla tumefazione dello stomaco, dalla bocca arida, e pastosa, dall'oppressione, e dalla mancanza del sonno: il polso in tali circostanze è quasi sempre febbrile, ma provansi degli ercubamenti dopo aver preso il cibo: bisogna aggiungere, che la maggior parte di costoro hanno il ventre sciolto, e fanno le orine senza colore. Tali sono i segni, che posson manifestarci, non solo lo stato del basso ventre, ma ancora quello del petto: sonnovene per degli altri, i quali ci ajutano a conoscere più particolarmente la sede del male: la difficoltà d'inghiottire a cagion d'esempio, dà luogo di congetturare, che le faringe, e l'esofago sieno intaccati; l'oppressione svela lo stivamento del polmone, l'itterizia, e quello del fegato: i segni dello scorbutto congiunti alla tensione del sinistro ipocondrio risguardano la milza: l'attrazione, e lo scioglimento del ventre, rivolgono le nostre mire al mesenterio, sede ordinaria delle ostruzioni de' fanciulli: il vomito abituale ci fa temere per lo stomaco, pel piloro, e pel pancreas: la passione iliaca, e la dissenteria ostinata, ci fanno riflettere al condotto intestinale, ec.

Quantunque gli stivamenti sanguigni si risanino con molta facilità, tuttavia non lasciano di farci temere, quando son trascurati, o mal medicati, come quelli, che posson degenerare, siccome dicemmo, non solo in infiammazione, ma eziandio in ostruzione, e in scirro: lo che forma una grande affinità fra tutte le malattie, che sono l'oggetto del presente Articolo. Ognun sa, che le ostruzioni alquanto inoltrate, e per conseguente gli scirri, so-

no i morbi più *esinati*, e più *indomabili*; e che quelli stessi, che hanno avuto la sorte di liberarsene, debbon sempre temerne la recidiva: tuttavia le ostruzioni recenti, quando si può arrivare a rilevarle, piegano la testa ai più semplici rimedj; ma assai volte non si comincia a medicarle, se non dopo che sono scirroie, o rendute incurabili. Ma e come mai potrebbe altri lusingarsi di scioglierle, quando la loro vecchiezza le ha rendute impenetrabili ai rimedj? E' noto, che l'*apertura dei cadaveri* ci mostra ogni giorno degli scirri duri, come le cartilagini, dei composti di tifo, dei cretacei, dei secchi a segno di sbritolarsi: siffatti stati si manifestano, non meno nelle parti esterne delle viscere, le quali spesso son piene di tubercoli, che nel loro interno, la cui solidità s'accosta alcuna volta a quella delle pietre. Le ostruzioni, e gli scirri, colla pressione, ch' esercitano sopra le parti vicine, eccitano con frequenza delle *infiammazioni*, delle *suppurazioni*, delle *putrefazioni*, e delle *cancere*, che precipitano in brev' ora i pazienti nel più deplorabile stato. Questo però non impedisce, che non possano vivere lunghissimo tempo, usando qualche regola, con delle ostruzioni, e con degli scirri; conciossiachè non vi sia cosa più comune del vedere delle persone, che portano siffatto male quei quindici, ed anche venti anni. Sanno i Pratici, che gli scirri della milza sono da temersi meno: che quei del fegato, e del mesenterio sono più terribili, e che questi secondi sono per lo più scrofolosi. E' noto altresì, che gli stivamenti scirrofi, che hanno ingrossato il volume della parte, son meno difficili a guarirsi di quelli, che hanno prodotto un effetto contrario. I dolorosi danno qualche speranza di guarigione; ma se ne ha pochissima, quando sono indolenti. Quelli finalmente, che occupano la matrice, e le altre viscere incavate, per lo più degenerano in cancri: sì gli uni, che gli altri precipitano nell' atrofia, e nell' dropsia. Siccome quello, che abbiamo riportato in questo articolo, è quasi tutto fondato sopra le *ispezioni anatomiche*; così crediamo soverchio il parlarne di vantaggio, tanto più che gli Articoli precedenti contengono quanto può bramarsi rispetto a tal materia.

Gli *stivamenti sanguigni* vogliono la *flebotomia*, che si può iterare, quando lo stato del polso, e le altre circostanze richieggionla. Gli *allentanti*, gli *addolcenti*, e i *temperanti*, vi son messi in opera, di pari che i *rilascian-*

lascianti: nulladimeno parecchi infermi si procurano la guarigione per mezzo della sola dieta, col molto bere e col riposo. Non è lo stesso delle *ostruzioni*, e degli *scirvi*: la natura in questo caso sarebbe inabile a tutto se l'arte non accorresse in suo ajuto. La *cavata del sangue* è necessaria, allorchè vi è la soppressione del *menstrui*, e dell'*emorroidi*: ella può esser proficua ancora negli altri casi, nel principio del male; ma bisogna lasciarla da un lato, quando lo stivamento è divenuto scirroso. I *purganti* possono mettersi in opera per riparare ai vizj delle digestioni: ma non se ne spera alcun menomo vantaggio per le ostruzioni; che anzi il più delle volte le irritano, se non si fa uso dei *minorativi* o *correttivi*. Tutti fanno, che in questo caso amministransi in copia gli *allentanti*, i *temperanti*, gli *epatici* e gli *aperienti*, e tali sono il *siero*, le radici di *pazienza*, di *celidonia*, ec. quelle di *spergolo*, d'erba *appiop* di *brusco*, e d'*eringio*; i *cicoracei*, la *scolopendra*, e la *crescione*, il *rabarbaro*, e l'*aloè*; il *borace*, il *sal ammoniaco*, il *sal vegetabile*, il *tartaro vetriolato*, il *sale de duobus*, i *centogambe*, ec. Dopo di questi si dà di mano agl'*incisivi*, de' quali i più approvati sono le *gomme*, il *sapone*, l'*anti-ettico* del *Poterio*, la *panacea*, e il *mercurio dolce*; ma nelle *acque minerali* abbiamo, onde supplire a tutti questi rimedj, come quelle, che ne riuniscono tutte le proprietà; imperciocchè e chi non sa, che le medesime sono *allentanti*, *temperanti*, *epatiche*, *aperienti*, e *incisive*? Si fa uso secondo le circostanze, ora delle fredde, ora delle calde: fra le prime le acque di *Vals*, di *Passy*, di *Forges*, di *Cranffac*, e di *Sedlitz*, sono le più approvate: quelle di *Plombieres*, di *Vichy*, di *Bourbonne*, di *Varege*, e del *Monte d'oro*, sembrano le migliori fra le termali. I *tonici*, ed i *marziali* non possono amministrarsi, se non sia ben avanzata la guarigione: l'esperienza ci ha pur troppo insegnato, come negli altri tempi non solo erano inutili, ma eziandio pregiudiziali: bisogna però eccettuarne il *tartaro calibeato*, che sembra darci minor timore delle altre preparazioni *marziali*. Debbonsi bandire da questa medicatura i *calmananti*, e specialmente gl'*ipnotici*: e a dir vero, non vi è, se non coloro, che vivono, come si dice, alla giornata, senza prendersi briga di ciò, che può accadere in progresso, i quali abbiano la temerità di prescriverne.

Finalmente , se è necessario in questo male il fare un lungo uso dei rimedj , è altresì importantissimo il non multiplicargli soverchio : tuttavia uno è talora costretto a variargli , poichè la natura vi si assuefa : e quei tali rimedj , che operavano in un tempo con somma efficacia , non producono il menomo effetto in altro tempo : debbon questi inoltre esser fiancheggiati da un ottimo governo , poichè da questo dipende tutta la riuscita . Fra i rimedj estevni , i bagni , i mezzi bagni , e le fomentate emollienti possono arrecare alcun vantaggio ; ma nulla affatto ci dobbiamo promettere dai topici risolventi .

TUMORI INTERNI .

Dalle osservazioni anatomiche mi verrà somministrata anche la materia del presente Articolo : ci scuopriranno queste dei tumori interni d'ogni specie nella cavità del petto , e del basso ventre ; ed anche , tuttochè più di rado , in quelle della testa , e del canale della spina .

Questi tumori sono scirrofi , o sarcomatosi , anomali , infaccati , ed aneurismali , per non parlare delle infiammazioni , e degli abicessi , che spettano al seguente Articolo . I tumori scirrofi solitarj sono , com'è noto , escrescenze carnose di più colori , più , o meno duri : sono aderenti alle viscere , alle membrane , ai vasi , al tessuto cellulare , ec. Sono di lor natura indolenti , nè divengon dolorosi , che per le circostanze dell'adesione , o della pressione , ch' esercitano sopra le parti vicine : abbiamo già detto , essere infinitamente difficile il distinguergli col tatto degli stivamenti delle viscere : s'incontra l'oscurità medesima per li tumori anomali . Tutto quello , che intorno a ciò ho potuto osservare in varj soggetti da me medicati , e che ho fatti aprire dopo la lor morte sotto a' miei occhi , si è , che lo stivamento delle viscere troppo inoltrato , e da non rilevarsi col tatto , è stato annunziato molto tempo prima da infermità abituali ; dove per lo contrario i tumori , de' quali parliamo , si manifestano in pochissimo tempo , e talvolta , quando altri meno se l'aspetta : ho ancora osservato , come quelli , le cui viscere erano ostrutte , trovavansi d'ordinario senza colore , e cachetici ; dove quelli , che hanno dei tumori solitarj , posson essere bene in carne , e di buon colore : ne ho veduti perfino di quelli , che un mese prima della lor morte mostravano di godere la più perfetta sanità . I tumori

anomali, e infaccati, più comuni delli scirrofi, rinchiudono ogni generazion di materie: vi si è talora trovata dell'aria, e della limpida acqua, del sangue, o della marcia; ma con maggior frequenza delle materie gelatinose, untuose, o sebacee: contengono eziandio degli idatidi, delle carni fungose, delle masse glandulose delle cartilagini, ed anche delle ossa: vi s'incontrano finalmente delle materie gessose, o del tufo, e delle veraci pietre, simili a quelle dei reni, e della vescica. Questi tumori, sì gli *scirrofi*, che gli *infaccati*, compariscono talvolta infiammati, e cancerosi, e per tale accidente fanno in estremo dolorosi: gli uni, e gli altri possono risvegliare i più atroci dolori, i quali assaliscono per parossismo; ed io gli ho più d'una volta veduti prendere per attacchi d'affezione ipocondriaca, cagionano anche altri sconcerti, relativamente ai loro attacchi, e alle loro vicinanze. Abbiamo detto, che potevansi portare lungo tempo delle ostruzioni anche scirrofe nelle viscere; ma non segue lo stesso dei tumori solitarj, sì scirrofi, che anomali, perchè l'ingrossamento loro è troppo spedito, ed ingenerano delle infiammazioni, delle suppurazioni, delle putrefazioni delle cancrene, degli stravasamenti ec. E' cosa rarissima che questi tumori non sieno il prodotto d'alcun altro morbo, prodotto difficilissimo a conoscersi, e quasi sempre incurabile. Tutti gli *aperienti*, e gli *squaglianti* in questo caso sono inutili; nè possonvisi impiegare, che che *rimedj generali* per riparare agli accidenti, o per servire di palliativi. Se alcuna cosa può intraprendersi, questa si è l'applicazione dei cauterj, i quali col procurare d'aprire un varco agli umori depravati, posson togliere a questi tumori una porzione della materia del loro accrescimento; ma l'oscurità del loro diagnostico farà sempre un ostacolo alla loro cura, qualora medesimi ne sieno suscettibili.

Gli *aneurismi* interni, de' quali dobbiamo anche ragionare, non sono niente più curabili, ma d'ordinario son meno occulti. Ognuno sa, che questi tumori son formati dal *dilatamento delle arterie*, che contengono più strati d'un sangue disseccato, o sanguoso, in mezzo dei quali si trova sempre un canale libero pel sangue scorrente, che vi comparisce con frequenza nero, e aggrumato. Le tuniche delle arterie, tuttochè in essi emolgate, divengono d'ordinario più fesse, e più solide.

trovanfi perfino cartilaginose, ed in parte officate. Il sacco aneurismale può divenire d'un' enorme grossezza : sonosene veduti di quelli , che occupavano un intiero lato del petto, o che dalla parte superiore di questa cavità si stendevano fino alla mascella. La distinzione degli aneurismi in veri, ed inspurj riguarda soltanto gli esterni, de' quali parleremo altrove. L' interno, del quale qui si ragiona, vien d' ordinario cagionato da uno sforzo violento, o col sollevare dei gran peti, o col violento gridare, o con tossire, o con vomitare, coll' andar del corpo, col partorire, ec. Posson produrlo altresì i colpi, e le cadute. Alcuni Autori hanno parlato dell' aneurisma del cuore: hanno così denominata la dilatazione straordinaria de' suoi ventricoli: secondo una tale idea, questo sarebbe comunissimo; ma non vi si trovano mai gli strati del sangue, di cui parliamo, che par, che facciano il carattere essenziale di questo tumore; oltredichè gli accidenti, e le conseguenze non sono le stesse. Veramente se ne sono veduti nelle arterie coronarie; ma il cuore, quando non si vorrà fare abuso dei termini, non è suscettibile d' aneurisma. Il tumore così denominato, occupa d' ordinario il petto, e una parte del collo: vedesi rarissime volte nella cavità del basso ventre; e ne sono le più ovvie sedi il tronco dell' aorta, le *subclavie*, le *carotidi*, le *intercostali*, le *bronchiali*, le *coronarie* e le *iliache*; ma i più frequenti sono gli aneurismi dell' aorta. Se si accostano alle clavicole, e all' incassatura del petto, si manifestano da un tumore, che comparisce al collo, alle clavicole, allo sterno, e alle costole, non meno nella parte anteriore del petto, che nel dorso, perchè le ossa, e le cartilagini di tutte le nominate parti rompendosi, e caricandosi in brev' ora, non s' oppongono all' uscita del tumore, ch'è circoscritto, molle, e cedente al tatto: vi si osservano comunemente delle pulsazioni, che corrispondono a quelle del polso, senza alcuna alterazione alla cute: ma gli aneurismi situati sul corpo delle vertebre, che sono perpetuamente cariate, non si manifestano, se non dopo la morte. Nell' uno, e nell' altro caso si prova una difficoltà di respiro abituale: alcuni non potrebbero coricarsi senza essersi a rimaner soffogati: temono perfino di fare il menomo moto, per non cadere in deliquio; e molti tentano anche ad inghiottire.

L'*aneurisma*, talvolta doppio, risveglia dei *dolori acutissimi*, che assaliscono d'ordinario per *pavossimo*, e precipitano i pazienti in uno stato spaventevole. Molti sentono internamente *battere l'aneurisma*: il loro polso è piccolo, duro, convulsivo, e intermittente, massimamente dal lato, che corrisponde al tumore: molto frequentemente in questi casi le palpitazioni, e le sincopi: se ne veggiono di quelli, che precipitano nel delirio, in convulsioni, e in altri morbi del capo, cagionati dalla compressione delle giugulari. Più soggetti degli altri a questo male sono i *malinconici*, che ne vengono soveramente investiti senza che abbavi dato luogo alcuno accidentale: è seguitato dal marasma, dalla cancrena, dalla cachessia, dall'idropisia del petto, ec. qualora una morte istantanea non prevenga un tale stato. Questo si dee riferire alla *rottura dell'aneurisma*, per cui il sangue sgorgando in copia affoga in tronco i pazienti quando si fatto stravatamento segue nella cavità del petto, o in quella del pericardio, come ce lo ha soveramente fatto toccar con mano l'*apertura de' cadaveri*. Si possono talora gli aneurismi uno, o più anni; ma tuttochè si non ottimamente conosciuti, e dieno molto tempo, tuttavia non rileva ciò punto per la *guarigione*, perch'è giudicata *impossibile*. Non vi s'impiegano, che dei *palliativi* tratti dal metodo generale. In questo morbo si non di tratto in tratto necessarie le *cavate del sangue*, essendo questo il solo mezzo, che può prolungar la vita ai pazienti, che debbon per altro concorrervi co' osservare il più esatto governo.

L' INFIAMMAZIONE.

Quantunque le principali *infiammazioni interne* abbiano ciascheduna il loro particolare Articolo; tuttavia non lasceremmo di porre in questo luogo alcune osservazioni generali, che non solo si potranno applicare ad esse, ma eziandio a tutte quelle, delle quali ci sarà ignota la sede. Tutte le viscere, le glandule, le membrane, e singolarmente il corpo cellulare, e pingue, s'infiammano con estrema facilità; ma sommamente rara si è l'infiammazione dei muscoli. L'esercizio moderato, l'eccessive fatiche corporali, le resipole rientrate, la gotta rimontata, il reumatismo mutato di luogo, la soppressione d'abituati sgorgi di sangue, l'abuso del vino, dei liquori, ec. sono le cagioni più frequenti del

infiammazione: può questa essere anche risvegliata dagli emetici, dai purganti, e dai veleni, dallo strangolamento dell'ernie, da qualsivoglia pressione, ec. I giovani, e i pletorici, come quelli, che sono d'un temperamento sanguigno, e bilioso, vi sono più che ogni altro soggetti.

L'*infiammazione interna* viene *annunziata dalla febbre*, e da un dolore più, o meno intenso, pungitivo, lancinante, o pulsativo, relativamente alla struttura della parte, all'estetà della flogosi, e alla sua disposizione a produrre un abscesso: il dolore talora s'ammorza per qualche tempo, e dà delle false speranze di guarigione. I pazienti si lagnano d'un gran calore, o *ardere* alla parte: provano a un tempo stesso dei leggieri *brividi* irregolari, qualora si muovano alcun poco dalla loro positura: il sangue, che loro si cava sul principio, trovasi d'ordinario nel suo stato naturale, ma in seguito divien sozzo; vale a dire, che raffreddandosi, cuopresi d'una cotenna bianca, e verdastra più, o meno tenace: non bisogna tuttavia pensare, che questa disposizione del sangue sia un segno certo dell'infiammazione, e che la sua assenza, come molti pensano, renda questo morbo più terribile. La febbre inseparabile dalle flogosi interne, è il più delle volte ardente, e preceduta dal rigor freddo: il polso è duro, e con frequenza disuguale; si ha male al capo, e si soffre la sete. La lingua s'inaridisce, e diventa anche nera: si prova un interno fuoco, che dilatasi oltre la parte offesa: si è tormentati dalle ansietà, dalle vigilie, e da altri sintomi febbrili. L'infiammazione delle parti membranose, come della pleura, del mediastino, del diaframma, dello stomaco, ec. eccita comunemente il delirio, e gli accidenti più orribili. La *sede delle infiammazioni interne*, come abbiain detto, non è facile a rilevarsi, qualor se ne eccettui quella del polmone, del fegato, e dei reni, e si stenta anche a decidere intorno a questi casi. La *tensione dolorosa del ventre*, unita alla febbre, indica molto bene la flogosi; ma rende difficoltosissime le ricerche, le quali fanno sì intorno alla sua sede: quante volte non si prende l'infiammazione dei muscoli dell'addome, o del suo tessuto cellulare, per quella delle viscere? Il ventre si trova tuttavia nel primo caso, più doloroso, ed i pazienti soffrono dolori inesprimibili per la tosse, e per tutti quei movimenti,

menti, ne' quali sono impiegati questi muscoli. Il dolor vivo all'epigastro, la difficoltà d'inghiottire, il vomito, e il singhiozzo, le ansietà, ed il freddo dell'estremità, annunziano l'infiammazione dello stomaco: quella delle budella si manifesta il più delle volte con un dolore, che si riferisce al bellico: in quella del mesenterio prova si un dolore aggravativo ai lombi: l'infiammazione dei reni, che si fa sentire a un di presso nel medesimo sito, è più acuta: la flogosi del fegato si distingue bastantemente col tatto; ma quella della milza, ch'è per altro sommamente rara, quella del pancreas, ec. si presentano oscuramente. Parleremo altrove dei segni, che posson distinguere l'infiammazione del polmone da quella della pleura, e delle altre parti del petto. L'infiammazione delle meningi, e del cervello si svela per mezzo d'una crudele cefalalgia, del delirio, e d'altri più gravi accidenti; ma coloro, che attribuiscono tutti i delirj febbrili a questa infiammazione, hanno adottato un'ipotesi dell'apertura dei canali daveri cento volte smentita.

Le flogosi interne non son mai senza pericolo, che maggiore, o minore relativamente all'uso della parte offesa; queste durano poco tempo, o degenerano in malattia cronica. Per quelle parti, che non hanno uscita, non vi è altro ripiego, che lo scioglimento. L'emorragia, ed i sudori, che sopravvengono verso il settimo giorno, son talora favorevoli, ma con più frequenza sintomatici. Molto meno ci dobbiam promettere dalle urine, tuttochè possano deporre verso il quarto, o il quinto giorno una posatura, dalla quale convasi un buono augurio. Lo scioglimento del ventre in alcuni casi è vantaggioso; ma le scariche delle fecce nere, ed i vomiti della stessa natura son forieri di morte. Quando non ha luogo la risoluzione, ci dobbiam aspettare un abscesso, un'ulcera, la cancrena, o il fischio. La suppurazione si stabilisce d'ordinario dal quarto al settimo giorno: l'abscesso, e l'ulcera divengono mortali per la circostanza del luogo, che occupano: la cancrena è in brev'ora seguita dalla morte: lo sciro precipita nella febbre abituale nell'atrofia, e nell'idropisia. I lanciamenti dinotano l'abscesso: il dolor lancinativo ci dà segno dell'ulcera; il vivo, e abbruciante annunziano la cancrena, ed il suo istantaneo cessamento la manifesta, massime quando sussistono la febbre,

bre , e gli altri sintomi . Qualora non essendo sopraggiunto alcun segno di suppurazione , resti nella parte una sensazione ottusa di peso , e di stiramento , si ha motivo di temerne lo scirro : tutto questo vien confermato dalle osservazioni anatomiche . L'infiammazione della *pleura*, quella del *fegato*, e della *matrice*, son tenute per le più *terribili* : fa d' uopo aggiungervi quella dello *stomaco*, più comune di quello altri pensì , che va a finire il più delle volte sul terzo , o quarto giorno nella cancrena , o che degenera in scirro , sorgente perenne del vomito , e d' un morbo di languidezza , che fa testa a tutti i rimedj : se vi si forma un abiceffo , lo che è molto raro , questo si evacua per vomito , o per secesso . L'infiammazione del mesenterio , i cui accidenti sono più miti , produce il più delle volte un abiceffo , che s' apre rarissimamente nel condotto intestinale ; ma con più frequenza nella capacità del ventre . Temesi meno l' infiammazione dei reni , e del polmone , a motivo della libera uscita della materia purulenta ; ma rispetto alle altre , nulla vi è da sperare , salvo che dal canto dello scioglimento , sopra di che si sa ben presto a che attenersi .

Se lo *scioglimento* per le parti , che non hanno esterna comunicazione , è l' unica strada , che possa guidare alla *guarigione* , debbonfi fare tutti gli sforzi per procurarla : non vi è dubbio , che le *cavate di sangue* non possano favorirla , ed anche sollecitarla ; ma debbonfi fare nei primi tre , o quattro giorni , nè debbono eccedere in numero : io penso , che si possano limitare fra le tre , e le sei : se s' inoltrano di vantaggio , non solo non se ne ritrae il menomo frutto , ma possono produr la cancrena , come con pur troppa frequenza si vede accadere nelle parti tese , e membranose : le numerose cavate di sangue sono anche contrarie alla suppurazione , la quale richiede per parte dei vasi un grado di forza , che loro vien tolta dal soverchio vuotamento ; e lo stivamento privato allora di questo depuramento degenera agevolmente in scirro : fa di ciò fede l' ispezione dei cadaveri : s' addicono le medesime anche meno a quelle infiammazioni sintomatiche , che sopravvengono alle febbri putride , e maligne già inoltrate . L' *emetico* nel primo giorno dell' invasione , dopo una , o due cavate di sangue , sovente è efficace ; ma bisogna guardarsi bene dall' usarlo , allorchè il ventre è

telo, o doloroso: non son meno pericolosi i purganti al più al più si possono ammettere i *lassativi*, come la cassia, la manna, i tamarindi, l'olio di mandorla dolce, il siero; il brodo lungo di pollastra, ec. Gli *allecizanti*, gli *addolcenti*, i *temperanti*, i *leggieri diaforetici* e i *risolventi*, sono i rimedj, che più riescono: tali sono i cicoracei, la borrana, la scorzonera, la scabbiosa, il cardo benedetto, il cerfoglio, ec. si usano ancora l'emulsioni; ma deesi temere l'abuso dei rinfrescanti niente meno di quello delle cavate di sangue, poichè è necessario un grado di calore per risolvere l'infiammazione, o farla suppurare; lo che può essere impedito da siffatti rimedj. Il *sangue d'irco*, tanto commendato per la cura della peripneumonia, non è da dispregiarsi nelle altre infiammazioni. L'uso degli *assorbenti*, proposto da molti, mi sembra più coerente al raziocinio, che all'esperienza. I *calmanti* sono sospetti in tutti i mali, che possono andare a finire in cancrena: in questo male son meno da temere nei primi giorni; ma si amministrano con maggior sicurezza i *nutrimenti*, il *sale sedativo*, il *liquore anodino minerale*, ec. Non si dee trascurare in alcun tempo di conservare libero il ventre coi lavativi: suppliscono questi ai rilassanti, che non ci è sempre lecito di porre in opera. Le *fomentazioni* e i *cataplasmi emollienti*, una vescica piena di latte cado, l'applicazione degli animali vivi, o della loro pelle col lor calor naturale, sono ajuti, dai quali ci possiamo promettere dei buoni effetti. Le *mignatte* applicate ai vasi emorroidali posson supplire alle cavate di sangue, e sono per avventura manco da temersi. I *vescicanti*; applicati più vicino che sia possibile alla parte offesa, hanno sovente partorito un felicissimo effetto, massime nell'infiammazione del polmone, e della pleura. L'applicazione dei narcotici non è meno da schivarsi di quella sìalo il loro uso interno: tuttavia s'incontrano dei casi, nei quali è permesso di far correre alcun rischio ai pazienti, per toglierli ad un pericolo più urgente.

LA SUPPURAZIONE.

La sola apertura dei cadaveri ci somministra l'istoria degli sconcerti prodotti dalle *interne suppurazioni*: e queste circostanze sono assai più preziose di tutte le fisiche spiegazioni, che sono state profuse intorno a questo

sto soggetto. Abbiamo detto, che l'*abscesso*, conseguenza ordinaria dell'infiammazione, formavasi dal quarto fino al settimo giorno del male; ma non dobbiamo lasciar di dire, esservi delle suppurazioni stabilite nel terzo giorno, ed anche nel secondo della malattia; lo che merita d'essere osservato. E' noto, che formansi alla giornata in cortissimo spazio di tempo delle deposizioni purulente nel mesenterio, nel fegato, nel polmone, ec. tanto nelle febbri putride, e maligne, come nel vajuolo, senza quasi alcun segno di flogosi. Se ne fanno altresì in brevissima ora pel trasferimento della materia purulenta da un luogo a un altro: il disseccamento istantaneo delle piaghe esterne ce ne somministra molti esempi. La putrefazione dei tumori anomali può anche dar motivo a delle deposizioni purulente, nelle quali sonosi trovate delle pietre, delle ossa, delle scaglie, ec. Gli abscessi sono più, o meno considerabili pel volume della parte: io ho veduto entro un mostruoso fegato ben quattro pinte di marcia: la donna, che chiudevalo in se, era d'una statura più che mezzana: il diaframma vedevasi forzato fino all'altezza della terza costola vera; nè si poteva concepire, come il cuore, ed il polmone potessero stanziare in sì picciolo spazio: tale si è la *prima specie di suppurazione* sommamente variata, di cui avevamo a parlare. La *seconda* non è per avventura meno comune, e n'è differente per le sole circostanze del luogo, che n'è la sede: ella succede, allorchè l'infiammazione occupa la superficie delle viscere, i loro contorni, o la lor cavità: la marcia non vi si riunisce; ma distrugge, e rode queste parti. Le *ulceri*, che ne risultano, si dilatano alcuna volta enormemente: il polmone distrutto interamente da un lato, non lasciando in suo luogo, che la sola marcia, ce ne dà un esempio, che non è raro: a tal sorta di suppurazione è soggetto anche il cuore; ma io non ne ho mai veduto l'ulcera penetrarvi molto avanti, tuttochè occupasse tutta la superficie di questa viscera: ella è altresì comune ai bronchi, ai reni, alla vescica, alle budella, alla matrice, ec. Vi ha una *terza specie di suppurazione*, che segue per *trasudamento*, nella quale non vi è nè fomite, nè ulcera: la marcia, che trapela dalla parte, è talvolta scorrente, e dà motivo ad uno stravasamento, ch'è comune alle altre specie; ma resta bene spesso incollata in fog-

gia di crosta gelatinosa alla superficie della parte infiammata: questa vernice, ch'è più, o meno fissa, sovente ricuopre il polmone, il cuore, e gl'intestini: se toglie via, non si vedono, se non i segni d'infiammazione senza la menoma traccia d'ulcera: si stenta a credere, che questa crosta sia il prodotto di siffatta infiammazione, quando s'incontra nelle malattie croniche, sopra le viscere, le quali ne sembrano esenti: questo dubbio mosso da eccellenti Anatomici, non senza fondamento. Io mi sarei anche fatto a dubitare intorno a ciò, qualora non avessi trovato con grandissima frequenza questa stessa materia mescolata con una marcia scorrente, e benissimo caratterizzata: ho ancora osservato in alcuni abscessi una materia gelatinosa molto somigliante a quella, che ricuopre le viscere. Si conserva una *quarta specie di suppurazione*, che filtra il tutto delle viscere senza alcun fomite particolare, senza alcuna distruzione apparente, e senza lasciar comparire alcuna cosa esternamente: è questo il primo grado di *corruzione*, ch'è noto essere comunissimo al polmone, al fegato, ec. La marcia, che inzuppa le viscere non comparisce, che per le incisioni, che vi si fanno: allora si vede scaturire da ogni lato: vi si scuoprano talmente alcuni piccioli abscessi, che si vuotano per la stessa medesima: l'epiploon, tuttochè membranoso, e sottoposto a questa specie di suppurazione, seguita perpetuamente dalla putrefazione, e della distruzione di quella. Ecco ciò, che ci vien posto sotto gli occhi dalle osservazioni anatomiche; ma che ci si offre sempre mai molto oscuramente, quando siamo al letto degli ammalati.

Dopo i segni dell'infiammazione ci annunziano gli *abscessi*, i *lanciamenti*, le pulsazioni, le pizzicature, senso di peso, la *febbre*, e i *brividi* irregolari: quelli del *petto* danno dei soffogamenti, e risvegliano la tosse: quei del cervello, che sono l'effetto ordinario delle cadute, e delle contusioni, cagionano delle cefalagie crudeli, degli stordimenti, l'apoplessia, le convulsioni, ec. Quelli del *basso ventre* formanti più alla sommità; ma si possono rilevare, toccandogli. I sintomi ordinario s'indeboliscono, e il polso fatti più flessibile quando l'abscesso tende a maturarsi: tuttavia segue alcuna volta, che i dolori sieno allora più acuti. Gli abscessi putridi, e saniosi, prodotti dalla trasposizione della materia purulenta, sono per la maggior parte indolenti.

dolenti, e non eccitano nemmen la febbre: in tal caso al più al più si può sospettarne, e non si manifestano, che colle *sezioni dei caraveri*. Quegli, che vengono dietro alle febbri maligne, e al vajuolo, che si scagliano per lo più sul mesenterio, sul fegato, e sul polmone, sono d'ordinario accompagnati da dolore, e da tensione, quando stanziavano nel basso ventre; e risvegliano la tosse, e l'oppressione, se hanno la loro sede nel petto. Le *ulceri* sono con frequenza gli strascichi d'un abscesso aperto; ma se ne possono formare, come dicemmo, senza che la marcia siasi giammai unita, non solo nelle infiammazioni, ma ancora negli scirri: quelli, che occupano le viscere, comunicando coll'esterno, non son difficili a rilevarsi; ma non segue lo stesso degli altri, dei quali non si può giudicare, se non se dal dolore rodente, e dalla sensazione d'ardore, che provano i pazienti, dalla febbre lenta, dai sudori abituali, e dall'atrofia, che gli accompagna. Quanto alle *altre specie di suppurazione* non si può, che sospettare sopra l'esame degli antecedenti; conciossiachè io abbia rilevata fra i sintomi, e gli accidenti, che le accompagnano, tanta varietà, e stravaganza, ch'io credo di potermi dispensare dal riferirgli. La *febbre abituale* inseparabile da ogni specie di *suppurazione lenta*, nei primi tempi non è facile a rilevarsi; ma in progresso ella comparisce senza maschera, e soffre dei lunghi esacerbamenti, che prendonsi con frequenza per febbri acute, e che anche si medicano dai più colla flebotomia con danno sommo dei poveri ammalati. Il calor della febbre accresce dopo il cibo, e verso la sera: allora sentesi del calore nella palma della mano: le guance divengon rosse, la bocca arida e pastosa: provansi dei brividi irregolari: si perde l'appetito, e il sonno, di pari che le forze, e le carni: ultimamente i sudori, e la diarrea, come altresì la caduta dei capelli annunziano una vicina morte.

Accade talvolta, che gli *abscessi del basso ventre*, ed anche del *petto* si presentino al di fuori: allora si può sperar di guarirgli coll'esterna medicatura: se ne caccia fuori anche per via degli sputi, del vomito, del secesso, e delle orine. Questi fortunati eventi non solamente risguardano le viscere, che hanno la loro fogna naturale; ma quelli altresì, che non hanno alcuna comunicazione esteriore: tali sono i ripieghi della Natura

ini-

inimitabili dall'arte. La stessa marcia, che cova empi il cervello, può corrodere talvolta i suoi involucri, e, eridando la base del cranio aprirsi il varco nella cavità delle narici, o delle orecchie, come si vede talvolta accadere. Gli *abscessi*, che formansi alla cheta, sia nel corso delle febbri, sia pel trasporto della materia purulenta in una infinità d'altri casi, sono i più rei, perchè la marcia v'è d'ordinario di trista qualità: quelli, che risultano dall'infiammazione delle parti, che non hanno alcuna uscita, non sono sempre mortali: imperciocchè oltre la speranza del riassorbimento, può accadere, che la marcia, quando non è in gran copia, vi si fecchi, e vi s'indurisca: circostanza, che toglie la vita a gl'infermi, e non lascia loro, se non che gl'incomodi leggieri: ce ne dà alcuni esempli l'*apertura dei cadaveri*. Le *ulceri* interne, che hanno qualche sfogo, sono in estremo difficili a guarirsi: quelle, che non lo hanno, son riputate incurabili: le une, e le altre precipitano nel marasmo, nei sudori abituali, nello scioglimento del ventre colliquativo, nella gonfiatura e nell'idropisia: queste fanno talora *cancerose*, ma non si dà per avventura questo carattere, che a quelle della matrice. Si può vivere molti anni con un'ulcera renale, al polmone, alla matrice, e in altre parti, ove la marcia trova un libero scolo: ma non si porta altrove per lungo tempo. Le *suppurazioni per trasudamento*, e le *putride*, sono mortali: queste ultime si comunicano alle parti vicine, l'epiploon ce ne somministra ogni giorno la prova.

Dopo quello, che abbiamo detto del pronostico delle suppurazioni interne, può altri ben credere, che non avremo gran rimedj da proporre. Ella è una massime ricevuta dai migliori Pratici, sì Medici, che Chirurghi, che la *cavata del sangue* è contraria ad una suppurazione stabilita: sembrerebbe, che ne risultasse, che si può cavar sangue, quando l'abscesso si forma in un luogo, in cui quasi niente vi è da sperare per l'evacuazione: che allora non può essere, se non per il solo uopo d'interrompere la suppurazione; ma ci ha fatto toccar con mano l'esperienza, che non erano meno date le cure, come quelle, che richiama la cancrena, rendevano lo stivamento scirroso: accidenti, contro i quali l'Arte, e la Natura hanno anche minor ripiego, che contro la putrefazione. I più miti *lassativi* non riescono

sono in questo caso più dannosi, che nell' infiammazione: così possiamo farne uso, quando lo richiede lo stato delle prime vie: ma questi non sono, che palliativi, dai quali niente ci dobbiamo promettere, quanto all' oggetto principale della medicatura. I rimedj, dai quali si può ritrarre alcuno ajuto, sono, gli *allentanti*, gli *addolcenti*, i *vulnerarij*, i *detersivi*, e i *balsamici*: tali sono il siero, il latte, il riso, l' orzo, la spelta, la vitalba, la veronica, l' ellera terrestre, la fanicola, l' ipe-rico, e il piè di leone: il miele, il balsamo del Perù, e del Canada, la trementina, l' acqua di teda, il balsamo del Lucattelli, ec. Dannosi talvolta con riuscita le acque di Bonne, quelle di Bagneres, di Barge, di Monte d' oro, ec. Usansi eziandio delle acque dette *acidule*; ma meno accertati sono i lor buoni effetti. E' inutile il dire, che debbonsi applicare dei *topici emollienti*, e *maturanti*, quando gli abscessi compariscono al di fuori; e far uso delle *injezioni detersive* per le *ulcere*, alle quali posson queste arrivare. I cauterj debbon porsi nel primo rango dei rimedj esterni: quei, che fanno, che segue ogni giorno una trasposizione della materia purulenta, non dubiteranno, che se ne possa indirizzare il moto verso uno sfogo artificiale; ma innumerevoli osservazioni provano affai meglio, che tutti i raziocinj, questo essere per avventura il più efficace rimedio, che si possa opporre a un male, che ne ammette tanto pochi. I cauterj non hanno azione sopra gli stravasi purulenti non meno della testa, che del petto, e del basso ventre: allora dee altri ricorrere ai mezzi noti per evacuar la marcia, che cova: per altro fa d' uopo osservare, come questa *evacuazione* è talora dannosa al petto: ella fa anche perire in tronco i pazienti, quando il polmone distrutto ha ceduto la sua sede a una materia marciosa.

LA CANCRENA.

Le *osservazioni Anatomiche*, alle quali siamo forzati di ricorrere, ci fanno conoscere, che tutte le parti interne, più che l' esterne, sono soggette alla cancrena; ce ne offrono di due spezie, l' una *secca*, e l' altra *umida*: so uso di questi termini, che non sono stati applicati, che alle cancrene interne, per non introdurne dei nuovi. La *cancrena secca* manifestasi per mezzo di tacche livide, o nere, che veggionsi molto co-
mu-

munemente nella pleura, nel peritoneo, nello stomaco, nelle budella, nelle parti membranose, che vestono la cavità, o che servono d'inviluppo alle viscere. La *cancrorena umida* occupa la sostanza delle viscere, e ne cagiona lo scioglimento, che allora addimandasi *corruzione*; il polmone, l'epiploon, il fegato, la milza, il pancreas, son le parti, che vi sono più esposte. Queste due sorte di cancrene, che corrispondono molto alle 1.^a esterne, sono per avventura i gradi della stessa infiammazione, ovvero i suoi diversi effetti, relativi alla struttura della parte. Troviamo un'altra specie di *cancrorena*, che produce un'*escava*, se così può chiamarsi una *bianchiccia pelliciatola* osservabilissima, ch'è aderente alla superficie delle viscere, e che si stacca con sommaria facilità: il cuore è sommamente soggetto a questo morbo; talvolta ne vengono investiti lo stomaco, e gl'intestini: più di rado il fegato, e le altre viscere: queste tacche bianchicce, alquanto rilevate, sono più, o meno estese: queste ora son solitarie, ora più insieme; il cuore n'è talora tutto coperto: in tal caso prendono rebbonfi per lo sfogliamento di questa viscera. Intorno a questo particolare io osserverò, esser molto verisimile, che quelle pelliciatole, che si cettano colla tosse, che si trovano nelle fecce, o nelle orine, sono il prodotto d'un somigliante sfogliamento, che segue nella cavità dei bronchi, in quella degl'intestini, o della vescica.

La prima specie di *cancrorena* è spesso la conseguenza dell'infiammazione, della pressione, e dell'estensione straordinaria delle parti; ma può anch'essere primitiva, senza che abbiasi dato motivo alcuna cagione apparente: la febbre maligna, il vajuolo, e le altre malattie acute, la chacheffia, lo scorbutto, la tifichezza, l'idropisia, e altri morbi cronici ce ne fanno vedere ogni giorno di questa natura: ella è altresì l'effetto delle gran passioni d'animo, di certi datti veleni, del veleno degli animali, ec. La seconda specie è per lo più l'effetto del filamento marcioso, come abbiamo additato nel precedente Articolo; ma può di pari dipendere da altra cagione, ch'è sfuggita sotto le mie ricerche. Quanto alla terza specie, che mostra di non avere un gran rapporto colle prima esposte, non par, che appartenga ad alcuna cagione apparente: osservasi anche con frequenza in questi tali, che sono stati portati via da un morbo acuto, come

me altresì in quelli, che son morti in uno stato di languore: non si saprebbe decidere, se sia mortale; imperciocchè a giudicarne dalle apparenze, sembra, che le funzioni delle viscere, che ne sono intaccate, non ne possano essere frastornate. Ecco quali sono le nozioni, sterili a dir vero, che ritragghiamo dall'anatomia.

La *cancrena interna*, sì la secca, che l'umida, il più delle volte vien dietro all'infiammazione: ella è d'ordinario annunziata da un dolore abbruciante, e acuto, il cui istantaneo cessamento non lascia il menomo dubbio rispetto alla natura del male: è verisimile, che questa riconosca altre cagioni, ma l'osservazione non ce le ha per ancora svelate. La *cancrena interna* si manifesta talvolta comunicandosi al di fuori: i vecchi ce ne somministrano bastanti esempj; nelle altre circostanze non si può ricorrere, se non se agli antecedenti, i quali non ci posson dare, che congetture. Il *polsso debole*, e intermittente, le *ansietà*, la grande *oppressione*, i *sudori freddi*, ec. potrebbero manifestare la *cancrena interna*, qualora tali sintomi comuni non fossero a quasi tutti i morbi. Le *dejezioni marcio-sanguigne*, nere, e fetenti, ci danno indizio di quella delle prime vie: non si potrebbe questa inoltrarsi senza forare gl'intestini, ed anche lo stomaco: io ho talora veduto nascere da siffatto accidente la passione iliaca, trovandosi il ventre teso per lo stravasamento, ugualmente che nell'ascite: ma quello, ch'io ho osservato di più straordinario, si è il laceramento dello stomaco, e di quella porzione del diaframma, che al medesimo corrisponde: lo che aveva dato luogo a uno stravasamento nel petto, seguito in brev'ora dall'estremo di dell'infermo.

Se non è agevole il conoscere la *cancrena interna*, di qualunque specie ella siasi, si può dire, ch'è anche più difficoltoso il guarirla: i *fortificanti*, i *cordiali*, gli *alesterj*, i *diaporetici*, e gli *antifettici* sono i rimedj messi in opera per le *cancrene esterne*: non vi è dubbio, che possano impiegare anche in questo caso. La *China*, fra i fortificanti par che meriti d'esser preferita, di pari che lo *spirito di sale dolcificato*: si raccomanda grandemente anche la *canfora*; ma tutti questi rimedj, e tanti altri, che potremmo additare, sono di lieve soccorso per un morbo sì occulto, o che non si palesa, se non quando non ammette più alcun riparo.

INSETTI, E CORPI ETEROGENEI.

Riportiamo ad altri articoli ciò, che riguarda i vermi ordinarij delle prime vie, ed i cutanei: in questo non parleremo, se non di quei *vermi*, od *insetti*, che possono incontrarsi in quasi tutte le parti del corpo umano. Intorno a questo abbiamo delle innumerabili osservazioni; ma sarebbe stato desiderabile, che la gente si fosse meglio guardata dalle superchierie, o che si fossero potute spogliare del favoloso, che queste racchiudono. Non si potrebbe però dubitare, che si possano ingenerare *vermi* di *varia natura* in tutte le parti del corpo: sonosene trovati nel *cervello*, nelle *orecchie*, nei *seni* comunicanti colle narici, sotto il contorno delle palpebre, nei denti, ec. i quali vermi colla loro presenza cagionano dei dolori acutissimi, ed altri accidenti: quei del cervello singolarmente, oltre le più orride cefalalgie, producono il delirio, le convulsioni, ec.. Ne nascono entro i *polmoni*, e nei *bronchi*, e questi sono stati alcuna volta spinti fuori collo spato. Sonosene veduti nei ventricoli del *cuore*, nelle *auricole*, nell'*pericardio*, nel *fegato*, nella *milza*, nel *pancreas*, nell'*mesenterio*, nei *reni*, e nella *vescica*, nei particolari follicoli, nei tumori, e in altre deposizioni, ec. Tutti questi *insetti* hanno delle *forme diverse*, e sono di differenti grossezze: ve ne sono di quelli, che hanno gambe, altri dei peli: se ne sono veduti di quelli, che s'assomigliano ai centobambe, alle mignatte, ai bruchi, alle farfalle, alle cavallette, ai grilli, agli scarafaggi, agli scorpioni, ai ranocchi, alle lucertole, alle serpi, ec. I più singolari sono stati rigettati per vomito, o per secesso; lo che, com'è noto, è molto sottoposto alla frode. Per non parlare dei microscopici, sonosene talvolta scoperti nella posatura dell'orine, e nel sangue: ma si dee riflettere, come questi liquori non sono divenuti verminosi, se non dopo essere stati a riposare per qualche tempo, e che non erano tali, quando sono usciti del corpo: riflessione naturalissima, alla quale pare, che altri dovesse fermarsi. Non credo, che si possa tampoco dar molta fede a quello, che ci vien detto dei vermi più considerabili, che sono usciti per l'apertura della cavata del sangue. La gente è vaga del mirabile, e troverannosi sempre molti impostori, che si prenderanno cura di soddisfarla.

Le osservazioni, che risguardano le *pietre*, e gli altri corpi eterogenei, sono, se ne tronchiamo alcune esagerazioni, assai più sicure, tuttochè meno comuni. Per non parlare del calcolo dei reni, e della vescica, che avranno i loro particolari Articoli, possonsi incontrare delle pietre, e della renella per tutto il corpo: veggionsene alla giornata nel *cervello*; ed è anche raro, che non se ne trovi sotto la stessa *glandola pincale*: se ne trovano nei ventricoli, nella base del cranio, e altrove: ho io veduto alcuna volta il *cervello* tutto ghiassoso, nè ho mai trovato, che quelle persone, che sono state il soggetto di questa osservazione, ne sieno state incomodate: ma non è lo stesso delle pietre d'un dato volume, che producono crudeli cefalalgie, il delirio, il sopimento, la vertigine, le convulsioni, l'accecamento, ec. Le concrezioni di tufo del *polmone*, e dei bronchi, son comunissime, e se ne gettan fuori perfino sputando: eccitano queste la raucedine, la tosse, l'oppressione, l'emottisi, la tisi chezza, e il marasmo. Trovansi eziandio delle pietre nel cuore, nè vi sono più rare delle ossificazioni: le medesime cagionano palpitazioni, e sincopi. Si formano parimente delle petrificazioni nel *fegato*, con più frequenza nella sua superficie, che nella sua sostanza: danno motivo di pari che nelle altre parti a dolori relativi al grado di sensibilità, e alla struttura del luogo, che investono; ma i dolori, ed altri sintomi, che risvegliano, sono comuni a tante altre malattie, ch'è quasi impossibile l'indovinare, se debbanfi mettere nel numero di pietre l'escrezioni biliose, che trovansi tanto frequentemente entro la cistifellea. Finalmente le pietre della milza, del pancreas, e del mesenterio, son molto rare, se non prendonsi per tali gli scirri induriti.

Abbiamo innumerabili osservazioni intorno alle pietre trovate nelle *prime vie*, rigettate per vomito, o rendute per secesso. Se ne sono pure scoperte nei *testicoli*, nelle *vescichette seminali*, nella *matrice*, e nella *placenta*, nei vasi, nel corpo cellulare, nei muscoli, ec. Se ne formano verso il contorno delle palpebre, negli orzajoli; se ne sono rigettate per le narici, nè è cosa rara il trovarne sotto la *lingua*, e nelle altre parti della bocca. Ognun sa, che la materia del sudore in alcuni risici è *arenosa*; che la gotta depone sopra le articolazioni una materia *rosacea*, e che l'effetto stesso è

prodotto dal reumatismo: trovansi finalmente negli abscessi, nei tumori anomali, e scirrovi, delle *concrezioni pietrose* di tutte le forme, dei *corpi ossei*, e cartilaginei: vi s'incontrano ancora dei *corpi eterogenei*, che sono stati inghiottiti, od introdotti d'altra maniera, come aghi, chiodi, coltelli, forchette, palle di piombo, semi, noccioli, spine, schegge di legno, fili di paglia, ossa, rette, penne, e somiglianti. Si fa, che formansi comunemente delle pietre nel corpo degli altri animali: oltre il *bazaar*, la *pietra di spinoso*, di capro, di *serpe*, e di *granchio*, dai Curiosi custodite nei loro musei, trovansene nei buoi, nei castrati, nei majali, nei cervi, nei cavalli, ec. Gli uccelli, ed anche le loro uova, non ne sono esenti. Tali sono i deviamenti della natura, che mostra di prendersi piacere d'imbarazzare i Filosofi, ponendo sotto gli occhi i prodotti animali, minerali, e vegetabili (essendosi anche trovate delle piante col germoglio) in luoghi i meno atti alla loro generazione.

I VELENI.

Traggonfi dai tre regni i *veleni*, come i *rimedj*, che assai fiate non differiscono fra loro, che per la solita dose; avvegnachè molte sostanze sieno l'una all'altra in rapporto alla maniera d'amministrarle. Sono i *veleni* più, o meno attivi: ve ne sono di quelli, che ammazzano quasi sul fatto: altri nello spazio d'alcune ore, d'alcuni giorni, d'alcuni mesi, ed anche, come si pretende, dopo varj anni: gli attivi eccitano i più orribili sintomi, dove i più lenti operano insensibilmente, e precipitano nel languore, e nel marasmo, de quali s'ignora comunemente la cagione. Si crede, che gl'Indiani abbiano sopra di ciò amplissime cognizioni: se possiamo farne giudizio dal sorprendentissimo effetto delle loro frecce avvelenate, forz'è confessare, esser eglino gran maestri in quest'arte finita; prodezza, che loro non invidiamo, né invidieremo giammai. Tutte le prove, che fanno sene sopra varj animali per provare certi veleni, non possono darci molti lumi: è noto, che le mandorle amare, ed il prezzemolo, che usiamo alla giornata, ammazzano gli uccelli: che le capre mangiano impunemente il titimalo, che avvelena gli uomini, e i pesci; che la noce vomica, adoprata da noi talora come alestiterio, uccide i cani, ec.

Non

Non è sempre agevole il determinarsi intorno alla *natura dei veleni*: siamo quasi certi, che la polvere del vetro, del cristallo, e del diamante, operano in una guisa puramente *meccanica*: che l'arsenico, il sublimato corrosivo, il verderame, le canterelle, ec. sono acri, che divorano: che lo spirito di nitro, di zolfo, d'allume, e di vetriolo, sono *acidi caustici*: che lo stramonio, il jusquiamo, la mandragora, il solano, la belladonna, ec. sono *narcotici*. Sappiamo, che i primi portano la loro azione sopra le prime vie principalmente, e che gli ultimi non operano, che sul sangue, o su gli spiriti; ma noi non sappiamo, in che consista il veleno della cicuta, dell'evanto, dell'aconito, del lauro, dei funghi, e d'un'infinità d'altre piante; per non parlare del veleno della vipera, degli animali stranieri, ec. dei quali se ne ignora affatto la natura. Oltre le divise difficoltà, è spesso impossibile nella pratica l'indovinare, qual sia il veleno, che viene dalla mano degli scellerati; e tutto quello, che può sapersi in tali occasioni, si raggiunge sopra semplici congetture, o sospetti; conciossiachè i segni cavati dagli effetti del veleno, non danno quasi mai quella certezza, che basti per aver tanto in mano da pronunciare sopra di ciò.

Le istruzioni, che ricaviamo dagli ammalati, e dagli assistenti, posson darci molti lumi intorno ad un siffatto accidente, allorchè non vi ha parte l'iniquità; ma negli altri casi siamo perpetuamente abbandonati a delle congetture, che non ci lasciano decidere. I *segni dell'avvelenamento* sono, generalmente parlando, la cefalalgia, le vertigini, l'oscuramento della vista, lo sguardo truce, il delirio, il tremore, e le convulsioni; l'ensugione delle labbra, e della lingua, l'annerimento di queste parti, ec. il respiro troncato, il serramento di cuore, le palpitazioni, gli svenimenti, e le sincope; le ansietà, il singhiozzo, il dolor mordente dello stomaco, dolori colici, vomito, il mal del *miserere*; la colera, le dejezioni sanguigne, la tumefazione degl'ipocondri, ec. Il polso rade volte è naturale, ma spesso debole, e profondo, intermittente, e convulsivo: si osserva ancora una grande oppressione, l'estremità fredde, sudori freddi, enflore di tutto il corpo, macchie cutanee, negrezza delle unghie, ec. Questi segni son comuni a quasi tutti i veleni, sienosi di qualunque natura esser si vogliano; nulladimeno si è osservato, che l'

ardore abbruciante dell'esofago, e dello stomaco, la gola enfiata, la sete ardente, gli atroci dolori di viscere, le dejezioni sanguigne, la passione iliaca, e la colera, le sincopi, e somiglianti, erano gli ordinarij effetti dei *veleni corrosivi*, sì agri, che acidi. Ci ha pure insegnato l'esperienza, come i *veleni narcotici* cagionano le vertigini, il letargo, i delirj furiosi, le convulsioni, le nausea, il vomito, ec.

La cicuta, ed i funghi, veleni, dai quali siamo minacciati più che da qualunque altro, meritano d'essere esaminati disgiuntamente. La *cicuta*, della quale è stata spessissimo presa la radice per quella della pastinaca, e le foglie per quelle del prezzemolo, eccita talvolta anche sul fatto stesso un intorpidimento, le vertigini, ingombramento di vista, il delirio, la perdita della memoria, le convulsioni, il vomito, il singhiozzo, l'ardore, e il dolor di viscere, l'enfiagione della regione epigastrica, lo sgorgo di sangue per le orecchie, la schiuma alla bocca, ec. A fronte d'una tale esposizione è agevole il giudicare, se la nostra cicuta è il veleno del medesimo nome, sì famoso presso gli antichi, che dava una morte dolce, e tranquilla, quale darebbe un narcotico. I *funghi velenosi*, de' quali si fa uso anche con più frequenza, producono d'ordinario un effetto più lento, e talvolta non operano, se non dopo dodici ore, e perfino dopo un giorno intero: eccitano questi nausea, e vomiti orribili, la colera, dejezioni, e orine sanguigne, cardialgie, e coliche, sete ardente, furore, e oppressione, gonfiamento degli ipocondrij, ec. Il polso è frequente, e concentrato; si sente talora la pulsazione dell'aorta, o della ciliaca: provansi delle ansietà, una grande oppressione, l'estremità fredde, ec. Ciò non ostante si è spessissimo osservato, come la *cicuta*, e i *funghi*, di pari che gli altri veleni tutti non producono in ognuno di coloro, che gli hanno presi, gli effetti medesimi: lo che dee essere ascritto alla dose più, o meno forte, e ad una infinità d'altre circostanze: per altro il vomito più, o meno pronto, invola anche una parte indeterminata del veleno: accade anche talvolta, che dopo una tale evacuazione ne rimanga sì poco, che non sia valevole ad ingenerare alcuno sconcerto nelle prime vie; ma le conseguenze non son meno da temersi; e si è più d'una volta veduto, che apriva il varco a contrazioni di muscoli, alla paralisi, allo

allo scorciamento delle membra, e ad uno stato di languore, che conduceva a morte i pazienti. Questo degg' intendersi non solo della cicuta, e dei funghi; ma eziandio di qualsivoglia altro veleno. Sonosi veduti a un di presso gli effetti medesimi dall' argirite, o schiuma di piombo nel vino, ch'è una specie di veleno, al quale non manca, che la dose; e la colica dei Pittori può riputarsi un verace avvelenamento.

Ci resta a parlare dei segni, che si posson cavare dall' *ispezione dei cadaveri*. Il corpo di quegli, che sono stati avvelenati, è d'ordinario gonfiato, col ventre sommamente elevato: veggionsi alla cute delle macchie livide, e nere: la lingua è tumefatta, e come abbronzata, le unghie nere, e slogate, ed i capelli cascano appena toccati. Veggionsi interiormente delle dilatazioni enormi, e degli strangolamenti in alcune porzioni, del condotto intestinale, dei segnali d'infiammazione, e di cancrena sopra tutte le viscere, e singolarmente nello stomaco, e nelle budella, che ne sono spesso corrose, forate, e che talvolta cascano a pezzi: le macchie, che si osservano per tutto, son livide, porporine, o nerice, ed in alcuni si è trovato il fegato riarsi, e abbronzato. Tali segni uniti a quelli, che son precedenti alla morte, quando possiamo esserne informati, posson formare un grado di certezza, che s'accosti alla persuasione; ciò che la probità vuole, che s'esponga con chiarezza in una relazione, che debba servire di regola ai giudici.

Se il numero dei veleni è grandissimo, si può dire, ch'è molto scarso quello dei rimedj: noi non potremmo nemmen dare intorno a ciò, se non se delle generalità, delle quali i Medici, che fanno il loro mestiero, posson fare delle rette applicazioni. Quei rimedj, e dei quali, secondo le apparenze, ci siamo serviti con maggior riuscita quasi contro tutti i veleni, formano naturalmente *tre classi*. La prima comprende l'emetico, e gli altri evacuanti delle prime vie. Non vi è dubbio, che questi non sieno i rimedj più efficaci, allorchè s'amministrano con bastante speditezza; ma siccome i corrosivi, e molti altri veleni eccitano con frequenza vomiti orribili, così in tal caso siamo dispensati dall'amministrarne: i medesimi sono anche pericolosi, quando il male si è ad un tal segno avanzato: si danno con sicurezza maggiore, ed in tutti i tempi contro i

veleni narcotici . La seconda riguarda gli *allentanti* , i *rinfriscanti* , e gli addolcenti : tali sono l'acqua pura intiepidita , l'acqua con miele , l'officinate , e la limonata , l'emulsioni , il brodo lungo di pollo , o di vitello , il decotto di malva , o di riso , il siero , il latte , il burro squagliato , gli oli , e i brodi grassi . I lavativi addolcenti col latte , col burro , coll'olio , e col miele debbono avervi luogo . Tutti i divisati rimedj , la cui scelta dev'esser regolata dalle circostanze , son proficui per qualsivoglia specie di veleno ; ma hanno una maggiore efficacia contro gl'irritanti , e i corrosivi . Si è osservato , come niuna cosa fermava con più sicurezzai rei effetti delle canterelle , delle quali è noto , che servono talvolta i dissoluti , quanto il siero . La terza classe abbraccia i *cordiali* , gli *alestiterj* , e i *diaforetici* , come la triaca , l'*orvietano* , il mitridato , il diascordio , l'aglio , la polvere di vipera , i sali volatili , ec. Quanto ai bezoar , de' quali si fa grand'uso , io non gli credo gran fatto proficui . Contro i *veleni acidi* , come il vetriolo , e il suo spirito , quel di nitro d'allume , ec. ci serviamo di sale di tartaro , degli occhi di granchio , e d'altri *assorbenti* . I *veleni narcotici* , oltre gli *evacuanti* delle prime vie richieggono la cavata del sangue , l'odore degli spiriti volatili , dell'aceto , ec. gli *acidi vegetabili* presi per bocca vi sono anche utilissimi , di pari che i *lunari stimolanti* . Si applica eziandio talvolta la cavata del sangue ai *veleni agri* , e *corrosivi* colla mira d'impedire l'infiammazione , e di calmare la violenza dei dolori . Gl'*ipnotici* , dopo le sufficienti evacuazioni , arrecano spesso un buon soccorso contro i *veleni irritanti sì acri* , che *acidi* .

Quantunque non si possa determinare , quale sia la natura dei *funghi* velenosi , egli è certo , che aprono il varco a sconcerti , i quali non si possono riferire , che a una materia irritante , e che vi si rimedia con quelle cose , le quali abbiamo detto essere adattabili ai veleni corrosivi ; vale a dire , col brodo lungo di pollo , di malva , coll'olio , col latte , col burro , e somiglianti . I rilatcianti , e i lavativi vi son messi in opera con buono evento , di pari che le fomite emollienti , ed i bagni . Dopo avere ottenuto delle buone evacuazioni , e d'aver rimediato agli accidenti pressanti , si dà mano ai *cordiali* , ed agli *alestiterj* , i quali amministrati in altro tempo sarebbero affatto incoerenti . Si combatto-

no i rei effetti della *cicuta* colla più spedita evacuazione delle prime vie: non si teme di dar del vino perfino sul bel principio: vi sono spesso necessarie le cavate di sangue; ma gli *allentanti*, i *rinfriscanti*, e gli *addolcenti*, sono per avventura soprattutto necessarissimi. Non merita il pregio il riferire ciò, ch'è stato più particolarmente operato contro i veleni. Io non riavengo negli Autori, che ripetizioni, o contraddizioni manifeste, e quasi sempre un' insufficienza, dalla quale non può cavarli alcun lume: ma se le nostre cognizioni intorno a siffatta materia sono limitatissime, bisogna confessare, che quelle, che sospiriamo, farebbero ai dì nostri poco proficue sotto un regno, in cui sembra, che quest' arte funesta, un tempo sì familiare, sia intieramente ignorata; e questo non è il solo vantaggio, che ritragghiamo dalla sapienza del presente Governo.

SEZIONE SECONDA.

Malattie interne della Testa.

LE VERTIGINI.

SONO queste di rado idiopatiche, ma con grandissima frequenza il sintoma, od il foriere d' un' altra infermità. Ad alcuni sembra, che gli oggetti si muovano in giro: in altri s' intorbida la vista; ma i più provano nello stesso parossismo tutti e due questi accidenti. In tale stato i pazienti stando in piedi barcollano; e quando non prendono delle cautele, cadono anche per terra. Io non riferisco tutte queste cose notissime ad ognuno, se non perchè gli Autori scolastici hanno creduto di far cosa dicevole di stabilire tre specie di vertigine; cioè (*vertigo gyrosa, tenebrosa, & titubans*): distinzione sciocca, ripettata dai Pratici, i quali non vi rilevano, che i gradi del male medesimo. Resto sorpreso, che sienosi dimenticati di riconoscerne una quarta specie, che si farebbe potuta con ugual fondamento appellare *soporosa*; avvenchè certuni per alcun tempo perdono il conoscimento. I Letterati, quei, che sono soggetti a palpitazioni, e a flatulenze, quei, che menano una *vita sedentaria*, o che sono *stitici di corpo*: quei, che mangiano del pane, in cui

vi sia dell'oglio, o che fanno uso di certi *tabacchi rapè*: quelli, che hanno fatto delle perdite di sangue considerabili: gl'*ipocondriaci*, e finalmente le donne isteriche, e le incinte, vi sono più che altri soggetti. I *bevitori*, i *gran mangiatori*, i pletorici, i dissoluti, di pari che quelli, che son continenti, ne sono talvolta investiti. E' noto, che il reo stato dello stomaco sovente la cagiona, di pari che la veduta d'un precipizio, e del rapido corso dell'acqua, per non parlare dell'alito del carbone, delle cadute, delle percosse, e somiglianti.

Il male, di cui parliamo, è talvolta preceduto da dolore, o gravezza di testa; e sovente accompagnato da *rumoreggiamento d'orecchie*, dal vomito, ec. Nel suo più alto grado la vertigine somiglia molto l'apoplessia, ed anche l'epilessia; ma i suoi attacchi durano meno: non si può negare per altro, che vi si trovi grande affinità fra queste malattie, poichè con frequenza veggionsi succedere l'una all'altra: imperciocchè la vertigine nei giovani va comunemente innanzi all'epilessia; ed i vecchi vengon minacciati da un'affezion soporosa, dall'apoplessia, e dalla paralisia, massime se gli attacchi son lunghi, e tornano con frequenza: la vertigine passeggera, e quella, che dipende da una cagione, che si può allontanare, non sono da temere.

L'*apertura dei cadaveri* ci manifesta comunissimamente delle inondazioni nel cervello, e principalmente nel terzo ventricolo, ove sonosi perfino trovate delle idatidi. Sonosi osservate le carotidi ossificate, il plesso coroidale stivato, e un fugo nericcio sparso tutt'all'intorno: dei vermi, delle suppurazioni putride, ec. Il petto non ci ha svelato, che delle concrezioni polipose nei vasi maggiori; ma nel basso ventre sonosi incontrati degli sconcerti allo stomaco, all'epiploon, e all'altre viscere di questa cavità: le vescichette seminali enormemente dilatate, o alterate in altra guisa, ec.

La *cavata del sangue*, singolarmente dal piede, si rende talvolta necessario alla vertigine, massime se l'infermo è giovane, e pletorico. I *vomitivi*, e gli altri *evacuanti* delle prime vie, sono spesso i soli rimedj efficaci: tuttavia si dee usar con riserva l'*emetico*, quando vi sono delle flatulenze. Gli *stomacici*, non meno gli *aromatici*, che gli *amari*, e gli *assorbenti*, in questo caso son messi in opera con buon evento: tali sono l'*acoro*, l'*enula campana*, la *China*, la *genziana*, il *sale*

le di tartaro, il corallo, ec. S'usano anche molto i *cefalici*, e gli *antispasmodici*, come la salvia, la bettonica, la melissa, e la menta, la valeriana silvestre, la peonia, i fiori di mugheretto, e di tiglio, il ciabro, l'antimonio, il mitridato, ec. Il fiero, e gli altri *allentanti*, i centogambe, la gomma ammoniac, i marziali, e gli altri *aeosfruenti*; i *depuranti*, gli *antiscorbutici*, e i *sudorifici*, secondo le circostanze, possono ottimamente giovare. Ma non vi è cosa, che superi per le vertigini abituali le *acque minerali*. sì fredde, che calde, come quelle di Vals, di Seltz, di Balaruc, di Plombieres, ec. Tutti i rimedj finalmente, che s'addicono all'epilessia, e all'apoplessia, possono aver luogo in questo articolo; ma bisogna guardarsi d'applicargli ad ogni specie di vertigine, veggendosi ogni giorno, che i soli alimenti, o una semplice evacuazion per secesso, possono dileguarla. Gli *sternutatorj*, e i *salivanti* sono stati alcuna volta proficui: sonosi anche vedute guarire delle vertigini da uno scolo naturale fieroso pel naso. Ritraggonfi ancora dei gran vantaggi dalle *frégagioni* lungo la spina, e alle gambe, dall'*immergere i piedi* nell'acqua calda, dai bagni domestici, ec. I *vescicanti*, il *setone*, e il *cauterio* non s'addicono, che alla vertigine *idiopatica*; e allora sono gli ajuti più efficaci, che si possano procurare. Non è inutile il dire, che nella vertigine *sintomatica* si dee sempre mai rivolger le sue mire alla malattia principale, e i rimedj da noi proposti possono somministrarci, onde appagarle. E altresì noto a chicchessia, che se ne dilegua il parossismo coll'odor dell'*aceto*, con quello delle *sostanze fetide* dei *sali*, e degli *spiriti volatili*, ec.

L' APOPLESSIA.

La privazione dei sensi, e dei moti volontari ne formano il carattere principale: si può considerarli come un profondissimo sonno, che non interrompe le funzioni del cuore, e del polmone. E' noto, che l'*apoplessia* ha più gradi; che il più delle volte investe bruscamente: che i suoi assalti son talvolta annunziati, o preceduti da alcuni forieri; e che in alcuni tempi ella è più familiare, e in qualche modo epidemica. Nulladimeno questa malattia sì comune non si presenta sempre alla scoperta, e si dà sovente la sua denominazione a delle affezioni, che non se le assomigliano, che per alcuni
effet-

effetti ; ma l'ispezione dei cadaveri ha svelato questi equivoci, col manifestare alcuni vizj del cuore, del polmone, ec. i quali producono, come l'apoplessia, la perdita del sentimento, e la morte. Per altro non vi è cosa, che si accosti tanto all'apoplessia, quanto l'ultimo grado della vertigine: alcuni parossismi ipocondriaci, e isterici, le affezioni comatose, che precedono le febbri maligne, le sincopi, il catarro soffogativo; e finalmente gli effetti della commozione del cervello, della sferza del Sole, della crapula, dei veleni, dell'altito del carbone, ec. Ma quei tali, che conoscono i *segni distintivi* di tutti questi stati, e che faranno al fatto di tutto quello, che gli ha preceduti, non cadranno in tale errore. Sanno bene i Pratici, che il parossismo della *vertigine* è più leggiero, e più corto d'un vero attacco d'apoplessia: che le affezioni comatose degli ipocondriaci, e delle isteriche sono quasi sempre accompagnate, o precedate da convulsioni, comunissimamente abituali. Gli *attacchi soporosi*, che precedono le febbri, offrono maggior difficoltà: tuttavia è cosa sommamente rara, che non siasi fatto veder prima alcun segno, che annunzi la malattia principale, anzichè l'apoplessia, che non n'è, che il sintoma: per altro lo stato del polso, e del respiro, di pari che la cognizione del temperamento, possono somministrar molti lumi; nulladimeno si è alcuna volta veduta una vera apoplessia seguita dall'emiplegia nell'invasione della febbre maligna, lo che importa d'osservare. Nella sincope il polso è smarrito, il movimento del petto è impercettibile, il volto cuopresi d'un color cadaverico, ec. Il *catarro soffogativo* s'affomiglierebbe più all'apoplessia, qualora si trascurasse d'istruirsi degli antecedenti, non meno per rapporto ai forieri dell'apoplessia, che in questo caso mancano, che a cagione delle circostanze dell'invasione, le quali non s'affomigliano. Quanto agli effetti della *commozione*, della *sferza del Sole*, dei *veleni*, dell'*altito del carbone*, ec. possono rilevare per la relazione degli assistenti. Finalmente si è in una specie d'uso di riguardar, come apoplessia, l'ultimo stato delle affezioni convulsive, per cui tutte le parti precipitano nel rilasciamento: questo errore, se è tale, non par, che sia di conseguenza grande.

L'*apertura dei cadaveri*, siccome fra poco vedremo, ci ha fatto conoscere tre sorte d'apoplessia; vale a dire, la

la sanguigna, la sierosa, e l' accidentale : ella c' insegna, che la prima nasce dal ristagno del sangue nei vasi del cervello, ed il più delle volte dal suo stravasamento ; oltredichè abbiamo mille esempj di persone, che son calcate apopletiche per aver interrotto l' aiuto di cavar- si sangue in certi dati tempi ; oppure, lo ch' è la co- sa stessa, pel troncamento degli uoghi sanguigni abi- tuali. Le passioni veementi, e soprattutto la collera, aprono il varco, ugualmente che la pietora allo stagna- mento del sangue nel cervello ; e i nostri libri son pie- ni di siffate osservazioni. Altri è anche soggetto all' apoplessia sanguigna, quando è molto pingue, ed ha il collo corto : quando uno s' allontana dalle regole della temperanza nel mangiare, e nel bere : quando altri ha una disposizione ereditaria, e trovasi fra i quaranta, e i sessant' anni. L' *apoplessia sierosa* prende la sua denomina- zione dall' inondazione della stessa natura, che trova nel cervello : vi è molta ragione di credere, questo essere l' ef- fetto dell' atonia, o del rilasciamento di questa viscera, che in questo caso comparisce perpetuamente accatciata : appunto per una tale circostanza noi dobbiamo distin- guerla da quella, che riconosce pure lo stesso stravasa- mento, ma cagionato da principio più manifesto : i vec- chi, singolarmente se son rimbambiti, i flemmatici : quegli che hanno una mente torpida, e fanno una vita sedentaria : coloro, le cui ulcere abituali sono state dis- seccate, che hanno lasciato di sputare, ai quali si è fer- mato il sudore de' piedi : gli scorbutici, e i gottosi : que- gli, che da qualche tempo patiscono un' iscuria renale : quegli, che trasmodano nel prender tabacco, ec. son sot- toposti all' apoplessia sierosa. La terza specie d' apoplessia è l' effetto d' una compressione accidentale del cervello, sia a motivo d' abscesso, o di qualsivoglia altro tumore, sia per la preferenza d' alcun liquido, in seguito di col- pi, di cadute, e simiglianti ; sia per la depressione, o per lo slogamento delle ossa del cranio, ec. Tale è l' idea, che ci possiamo formare di queste tre sorte d' apo- plessia, che nulla hanno di comune, se non se l' effetto funesto, che le accompagna : le medesime sono tanto oscure nel soggetto vivente, quanto son manifeste nei cadaveri ; tanto più che il temperamento, e le circostan- ze dell' età non n' escludono alcuna.

La gravezza, e il dolor di testa, le vertigini, l' in- debolimento della memoria, la voglia frequente di dor- mire,

mire, l'intorpidimento delle membra, lo scolo involontario delle lagrime, la bocca storta, lo scampanio dell'orecchie, il tremolar delle labbra, la difficoltà di parlare, il freddo dell'estremità, il digrignar dei denti dormendo, ec. sono i forieri di tutte le specie d'apoplessia; ma abbiamo già detto, che il loro affalto, sovente era brusco, e non preveduto. Il cessamento di tutte le funzioni animali, e del moto volontario, quello del cuore, e del petto, non iscostandosi dallo stato lor naturale, caratterizzano molto chiaramente l'apoplessia; ma fa di mestieri sapere, che nel suo ultimo grado il respiro non è quasi più sensibile, e che il polso è smarrito a segno, che molti pazienti in tale stato sono stati presi per morti. Queste cognizioni possono bastare per distinguere l'apoplessia da qualsivoglia altro morbo; ma bisogna ricorrere ad altri segni per rilevarne le specie, le quali, siccome diremo, richieggono una medicatura essenzialmente diversa. Nella *sanguigna*, che addimandasi comunemente un *colpo di sangue*, e ch'è quasi sempre istantanea, il paziente ha il viso rosso, i vasi assai turgidi, gli occhi mezzo aperti, e vetrini: il respiro è per lo più molto libero, ma molte volte con rigurgitio, o con rantolo: il polso è pieno, e sviluppato: vi sono di quelli, che gridano in cadendo: in alcuni la paralisi si manifesta nel primo istante dell'attacco: accade pure talvolta in questa specie, che si abbiano dei digrignamenti di denti, e delle convulsioni, prima di morire. Nella *serosa*, che viene per lo più annunziata dal sopimento, il volto è pallido, e le vene poco risaltanti, il respiro è più inceppato, ed il rantolo più forte: il polso è picciolo, e disuguale, o intermittente: si ha talora sul fine la schiuma alla bocca: se vi ha complicamento di queste due sorte d'apoplessia, come si è rilevato in alcuni soggetti, allora i segni si confondono; ma d'ordinario corrispondono più alla prima. Si può ottimamente giudicare della *terza specie di apoplessia*, quando questi accidenti noti vi hanno spianata la strada, tuttochè i suoi segni sieno confusi con quelli delle due precedenti: ma s'ella dipende da un tumore, o da qualunque altro vizio del cervello, non si può se non formare delle congetture intorno ai sintomi, che per lo più non mancano di precederla.

Per l'*apoplessia sanguigna* ci offre l'*ispezione anatomica*

mica degli stivamenti , e delle concrezioni polipose in tutti i vasi , non meno della dura madre , che del cervello : il plesso coroide enfiato , e varicoso , stravasamenti di sangue nei ventricoli fra il cervello , e le meningi , e talvolta nella stessa sostanza di questa viscera , la quale vien forzata dal volume di questo liquido ; ma tali stravasamenti , come in appresso diremo , non son sempre il prodotto della pletora : il sangue , che rigurgita anche nei vasi del polmone , ne lacera talora il tessuto ; ed è cosa ovvia , che i cadaveri ne rendano pel naso , e per la bocca : finalmente il capo di quei , che ne sono stati colpiti , gonfia enormemente . Nella serosa si vede il più delle volte il cervello accasciato , i ventricoli inondati d'un siero limpido , o sanguigno , dell' acqua fra la pia , e la dura madre , in maggior copia alla base del cranio : questa serosità penetra sovente nel canale della spina ; talora in vece dell' acqua colante trovasi in tutte queste cavità una specie di gelatina : il plesso coroide è d'ordinario scolorito , e pieno d'idatidi . Abbiamo già osservato , essersi veduti a un tempo stesso degli stravasamenti di sangue con delle inondazioni sierose ; aggiungeremo ora , che alcuni di quelli , che sono stati il soggetto di queste osservazioni , erano stati uomini vigorosissimi , e d'un temperamento sanguigno ; lo che forma , come ben si vede , una grandissima difficoltà nel diagnostico di tali malattie . Nell' *apoplessia accidentale* veggionsi dei tumori molli , ed ascessi , degli abscessi , delle idatidi , dei fellicoli d'altra natura , racchiudenti un siero gialliccio , o del sangue aggrumato : degli stravasamenti sierosi , sanguigni , e purulenti , cagionati da un numero grande d' accidenti lontanissimi dalla cagione ordinaria delle due prime specie d'apoplessia : nell' accidentale si è eziandio veduto la glandula pineale d'una prodigiosa grossezza , per non parlare della presenza di corpi eterogenei .

Abbiamo parecchi esempi d' apoplessia guariti dalla natura senza il menomo ajuto dell' arte per mezzo della salivazione , coll' emorragia , ovvero senza alcuna sensibile evacuazione . L' *emiplegia* n' è la conseguenza più comune : questa però si dichiara talvolta nel primo momento dell' attacco , ovvero anche la precede : è cosa rara , che la medesima sopravvenga dopo i primi quattro giorni : con questa specie di paralizia si può vivere lungo tempo , e guarirne ; ma l' universale annunzia

zia comunemente la morte. Si giudica d'ordinario dell'evento dallo stato del polso, e da quello del petto: si fa buono augurio, qualora il primo è naturale, pieno, e sviluppato: abbiamo grandi speranze, quando il respiro è libero; ma temonsi i contrarj: ci fa molto sperare la febbre, che sopravviene nell'apoplessia; e ci promette assai anche la libertà d'inghiottire. Se nell'*apoplessia forte*, poichè abbiám detto, che ve n'erano di più grandi, i rimedj non producono effetto nelle prime ventiquattr'ore, o al più al più dentro i primi tre, o quattro giorni, non ce ne dobbiamo promettere in alcun modo in progresso. Molti vengon portati via nel primo giorno dell'invasione, nel secondo, nel terzo; ma molto di rado dopo il settimo. Tutti i Pratici dopo *Ippocrate* hanno detto, che la leggiera apoplessia era di malagevole guarigione, e la gagliarda incurabile; ma questo asserimento non s'accorda sempre coll'osservazione. Nella *sanguigna* si cava un reo presagio dalle convulsioni: si perde ogni speranza, quando il volto si scolora, divien livido, e piombino. Nella *serosa*, i vecchi più che gli altri provano dei rilasciamenti, che d'ordinario terminano in una recidiva, che gli porta via; ma se passano otto giorni in calma, non si ha quati più che temere. L'oppressione, e il rantolo in questa specie, la schiuma alla bocca, il sudor freddo, l'involontario sgorgo dell'orine, e del ventre, hannosi per rei segni: se uno non si ricovra, non si sfugge l'emiplegia, e comunemente si resta colla bocca storta, colla difficoltà d'articular le parole, ec. Si fa bene, senza ch'io lo dica, che quando dopo i violenti assalti è seguito lo stravasamento nella sanguigna, di pari che nella serosa, e nell'accidentale, i soccorsi più grandi non potrebbero dilungar la morte, che per alcun tempo, o procurare alcuni momenti di conoscimento, de' quali, a dir vero, in circostanze così funeste si può fare buon uso. Il *Ragliani* pretende, che l'apoplessia lasci sempre qualche sorta di paralisi; ma l'osservazione non conferma questo sentimento.

L'apoplessia, di qualunque specie siasi, richiede pronti rimedj; poichè da questa brusca medicatura, in caso che non sia superflua, si dee aspettare tutta la riuscita. Nella sanguigna le *cavate di sangue*, sì dal braccio, che dal piede, e dalla giugolare ci si offrono naturalissimamente: l'arteriotomia, ai dì nostri tanto trascura-

ta, in questo caso è stata messa in opera con riuscita. Possonvi aver luogo gli *emetici*, e i *purganti*, quando si sono a sufficienza minorati i vasi: i primi, che amministransi con tanta familiarità, sono ciò non ostante sommamente sospetti, e per avventura meglio sarebbe il bandirgli del tutto, o il non fargli prendere, se non dopo avere aperte le prime vie con un purgante: si fa ancora per questa specie d'apoplessia un uso frequente delle acque spiritose e cordiali; ma queste non possono esser proprie, se non se dopo l'evacuazioni d'ogni genere; e anche allora bisogna indebolire coll'acqua comune: non si dee meno temere degli odori gagliardi, che malgrado ciò, si usano tanto familiarmente; ma non debbonsi temere i lavativi i più *stimolanti* col vino emetico, colla coloquintida, coll'euforbio, ec. Si applicano con vantaggio le *mignatte* ai vasi emorroidali, alle tempie, dietro all'orecchie, ec. i vescicanti, e le coppette a taglio sopra la testa, sulle spalle ec. il *cauterio attuale* alla nuca, e alle piante de' piedi ec. Fannosi delle fregagioni lungo la spina, e alle gambe: si applicano dei sinapismi alle piante. Si è quasi abbandonato alla plebe l'uso degli animali viventi alla testa; tuttavia questo topico, che non può far male, non è da disprezzarsi. Quando uno si ricovra da questa tremenda malattia, si dee prevenirne la recidiva colla più esatta dieta, coll'esercizio, coll'uso moderato delle cavate di sangue, dei purganti, delle acque di Balaruc, di Vichy, ed altre *termali*, col cauterio, e simiglianti.

Nell'*apoplessia sierosa* si dee principiare dall'amministrare in copiosa dose i *vomitivi*; e qualora questi non producano buono effetto, si potrà dar mano alla *polvere d'Algaroth*. I *purganti drastici* sono altresì adattati, di pari che i più *irritanti lavativi*, tali appunto, quali abbiamo proposto: si può anche praticar quello del tabacco, qualora questi non producano effetto. La *flebotomia* è tanto contraria a questa sorta d'apoplessia, quanto è necessaria alla sanguigna; ed io per me credo, che a motivo dell'indifferente applicazione di questa, che faasi comunemente, *Cornelio Celso* pronunciasse, che ammazza gli apopletici, o gli risana: nulladimeno non si dee temere, quando lo permette lo stato delle forze, di far aprire una volta la vena, non meno per soddisfar quei tali, che la richieggiono con tanta *mania*, che per agevolare l'operazione degli altri

rimedj. I *cefalici*, ed i cordiali in questo caso riescono sommamente proficui: tali sono l'acqua della Regina, la melissa composta, l'imperiale, e la triacale, lo spirito di succino, e di sale ammoniaco, le goccioline d'Inghilterra, le confezioni cordiali, ec. Gli *sternutatorj* pericolosi nell'altra specie, sono efficacissimi in questa: tali sono l'Inde di Firenze, il pilatro, l'elleboro bianco, l'euforbio, ec. Si può anche agli estremi soffiare nel naso del paziente la polvere di canterelle, il sublimato corrosivo, ec. Si dee, e questo è uno dei punti principali, agitar grandemente i pazienti, e porre in opera tutti i rimedj eterni, che additammo qu'innanzi, i quali convengono anche di vantaggio alla serosa, che alla sanguigna: vi aggiungerò l'odore dello zolfo acceso, dal quale sonosi talora veduti de' buoni effetti. Son da temere, come dicemmo, in questo caso le ricadute: altri può difendersene coll'esercizio, e col divertimento, coll'uso moderato dei cefalici, dei purganti, degli aperienti, dei diaforetici, e dei salivanti: fra questi ultimi si dee preferir il tabacco in fumo. La salvia, l'*elixir proprietatis*, i centogambe, i marziali, l'anti-ettico del Poterio, e l'antimonio diaforetico, sono i preservativi più approvati; ma le acque termali di Balaruc, di Plombieres, e le analoghe a queste, sono, secondo l'esperienza, le meno equivocate: io vi aggiungerò il setone, e il cauterio, da' quali sonosi sperimentati ottimi effetti.

Il numero più che sufficiente dei rimedj da me proposti per l'una, e per l'altra apoplessia, non è da paragonarsi con quello, che si legge nei nostri Libri: la bizzarria, che domina, non ci permette il fermarvisi; e quanto a me non dubito, che la maggior parte delle guarigioni, delle quali si vantano gli Autori, non sieno anzi state opera della Natura, che il frutto del metodo loro. Abbiamo già detto, e ognuno l'accorda, che vedevansi con frequenza delle apoplessie dileguarsi felicemente senza l'amministrazione d'alcun rimedio: quelli, con li quali s'opprimono perperuamente i pazienti in queste tremende occasioni, chi sa, che non attraversino i felici movimenti della natura, o niente cagionino; lo che certamente riuscirebbe meglio, rispetto alla disposizione degli organi offesi? In tal proposito riferirò, come un uomo di cinquantacinque anni, al quale per alcuna leggiera indisposizione nel tratto

di tre o quattro giorni, era stato cavato due volte sangue dal braccio, e una dal piede, e aveva preso l'emetico, e un purgante che avevano di conserva operato molto bene, il giorno dopo la sua purga non mancò d'esser investito da un colpo apopletico, e di morire, s'io non mal mi sovveggo, nello stesso dì. Lascio agli intendenti la cura di riflettere sopra le conseguenze, che si possono tirare da un tal fatto.

L' ASSOPIMENTO.

Il soggetto del presente Articolo è trattato dagli Scrittori con tanta confusione e discrepanza, ch'io mi sentirei tentato di sopprimerne del tutto i loro nomi, qualora non giovasse talvolta il consultargli. Stabiliscono essi quattro specie d'*assopimento*, che indicano colle denominazioni di *Canus*, *coma sonolentum*, *letargus*, & *coma vigil*. I primi due son per lo più senza febbre: il terzo è quasi sempre colla febbre, ed il quarto le appartiene assolutamente. Ciò, che addimandasi *Caro*, *carus*, non è quasi punto diverso dall'apoplessia: è questo un profondissimo sonno, che a stento grande si scuote colle grida, coll'agitazione, ed anche colla puntura: se i pazienti a forza d'esser tormentati aprono gli occhi, immediatamente tornano a chiuderli: parecchi hanno anche un rantolo, e un ruffamento, somigliante a quello degli apopletici. Il *coma sonolento* è un sonno più lungo, e più profondo di quello siasi nello stato naturale, ma che s'interrompe con molta facilità: il più delle volte è idiopatico, e familiarissimo ai vecchi, i quali s'addormentano parlando, e talora anche mangiando: il cessamento della gotta, la soppressione dell'emorroidi, l'affezione ipocondriaca, e isterica sovente dannovi motivo. Il *letargo* non differisce dalle due prime specie, se non per la presenza della febbre, di cui la medesima è un sintoma: è questo un sonno profondo, e continuo, che si può interrompere, ma per poco tempo. Molti Autori addimandano anche *letargo* quello, che altri hanno denominato *coma sonolento*, e *caro*; imperciocchè non vi è cosa più comune della trasposizione di tutti questi nomi, che perciò divengono quasi arbitrarj. Il *coma vigil*, ch'è sempre un sintoma della febbre, è un sonno apparente, che inganna gli assistenti, ma che tormenta grandemente l'inferno: con frequenza è accompagnato, o seguito dal

delirio : un tale stato avrebbe più dicevol luogo nell' Articolo della vigilia.

L' *assopimento idiopatico*, del quale in questo luogo principalmente si ragiona, dee esser distinto, come l'apoplessia, in *sanguigno*, in *seroso*, e in *accidentale*; e dee qui riferirsi tutto quello, che contiene intorno a tal soggetto l' Articolo precedente. Abbiamo detto, che doveva esser considerato, come il foriere dell'apoplessia: senza arrivare a questo grado lascia talvolta la testa barcollante, e una debolezza nelle membra, che rasenta la paralisi. L' *apertura dei cadaveri* giustifica pienamente l' affinità, che abbiamo stabilita fra i due morbi: vi s'incontrano comunemente le inondazioni serose: rade volte ci siamo accorti di stivamento dei vasi sanguigni; ma sonosi veduti con frequenza grande dei tumori, e delle suppurazioni, dei corrompimenti, ed altri sconcerti nel cervello: così osserviamo, che l'assopimento precede più sovente le due ultime specie d'apoplessia, di quello preceda la prima. Non proponiamo in questo luogo alcun rimedio, perchè debbonsi cavare dall'Articolo precedente, colle distinzioni, e colle modificazioni, che vi abbiamo stabilite: si può farne uso altresì contro l'assopimento febbrile, quando lo permetta lo stato della malattia principale.

Vi ha parimente un'altra specie d' *assopimento*, o d' *ubbiachezza*, che nasce dal vino, dalla birra, e dagli altri liquori fermentati, dall'oglio, dall'oppio, e dagli altri narcotici, dal fumo del tabacco, e dalle acque minerali: ve ne ha varj gradi, il più alto de' quali assomiglia all'apoplessia senz'esser ugualmente pericoloso; ma si corre rischio d'ingannarsi, qualor si trascuri di prendere le necessarie informazioni. Siffatto stato continua talora più giorni: alcuni perdono il sentimento, come gli apopletici: altri trovansi immersi in un assopimento, dal quale per alcun tempo non si possono svegliare: ve ne ha di quelli, che passano al delirio, ed anche con furore; oppure, sebben più di rado, cadono in convulsioni. Ma i gradi inferiori non danno da temere: la testa è sbalordita, il passo barcollante: la vista è torbida, si barbotta in parlando, ec. Il meglio, che far si possa in simiglianti casi, allorchè sembran gravi, si è l'eccitare il vomito, ponendo un dito in gola, o facendo bere ai pazienti dell'acqua calda: è raro, che debbasi ricorrere all' *emetico*, quando

lo stomaco è pieno, lo che suole per certo accadere nella ubbriachezza; ma se ne può far uso negli altri casi: son perpetuamente proficui i *clisteri purgativi*. L'*acqua nitrata*, la *limonata*, e gli altri *acidi vegetabili*, vi fanno gran bene. Si è osservato, come alcuni essendosi lasciati cadere nell'acqua, erano risanati dall'ubbriachezza. La *cavata del sangue* in questo caso è sommamente sospettata, massime per l'ubbriachezza ordinaria, per quanto molti ne abbiano vantato i suoi buoni effetti: negli altri casi però ce ne possiamo servire con riserva.

Vi sono finalmente dei *sonni straordinari*, che durano delle settimane, dei mesi, e degli anni, con intermissione maggiore, o minore. Trovansene esempi nell'Istoria dell'Accademia delle Scienze, nelle Transazioni Filosofiche, negli atti di Lipsia, e in altre Opere, o Giornali periodici: quasi tutti sono stati investiti questi sonni con ciò, che usiamo di più energico per l'apoplessia; ma sembra nella maggior parte di queste Relazioni, che tutti i rimedj, che sonosi potuti mettere in opera, sieno stati infruttuosi, e che i pazienti sieno dopo un tratto di tempo svegliati naturalmente per se stessi. Il rimedio, ch'è paruto il più efficace, è stata l'*immersione* istantanea di tutto il corpo nell'acqua fredda.

I L T R E M O R E.

Chicchezza ha contezza del *tremore*; ma non tutti fanno, che ve ne ha di due specie; vale a dire, uno, che appartiene alla *paralisi*, e l'altro alla *convulsione*; e che sono eziandio con frequenza i forieri di questi due mali. I vecchi, e i convalescenti provano la *prima specie*: il vino, le donne, l'abuso del caffè, e dei narcotici, i veleni, ec. possono darvi motivo: è altresì familiare ai Minatori, a quelli, che lavorano nel mercurio, nei metalli, ec. Il *tremor convulsivo* è cagionato dal freddo, dalla paura, dalla collera, e dalle altre passioni d'animo. I *brividi*, noti sotto i nomi d'*orrore*, e di *rigore*, sì comuni nel principio delle febbri, e in altre circostanze, sono dello stesso carattere: sopravvengono dei tremori convulsivi dopo alcune febbri intermittenti mal medicate; ma non investono per lo più, che le donne: il brivido è anche un sintoma delle affezioni isteriche, ipocondriache, e scorbutiche: le suppurazioni interne, i vermi, il troncamento de' mestruj, e dei lochj, la ritenzion d'orina, ec. ne ecci-

tano similmente della stessa natura . Non è malagevole il distinguere il tremore , che dee attribuirsi alla debolezza , dal convulsivo : il primo cessa per l'inazione delle parti ; ed il riposo non difende dal secondo : oltredichè il primo è più sensibile , quando si sostiene alcuna cosa , dove per lo contrario i gran pesi possono domare , o moderare il secondo . E' noto , che il tremore d' ambe queste specie è talvolta particolare alla testa , a un braccio , a una gamba , ec.

L' esame delle circostanze , che sono precedute , o che accompagnano il tremore , fa bastantemente distinguere quello , ch'è pericoloso , da quello , che nulla dà da temere . Abbiamo detto , che il tremore della prima specie era talvolta seguito dalla paralisi ; ma dobbiamo aggiungere , ch' è più comunemente senza pericolo , quantunque sia rarissimamente curabile , singolarmente nei vecchi . Il tremor convulsivo nei morbi acuti , che sopravviene al delirio , o al troncamento dei lochj , è sommamente da temere . Il *prognostico* per gli altri dee cavarli dalla cognizione delle malattie , che lo mantengono , o de' passeggieri accidenti , che vi dan motivo .

L' *apertura de' cadaveri* ci somministra pochi lumi intorno alla cagione della prima specie ; e ciò , che si è osservato in queste occasioni , apparteneva meno al tremore , che alla malattia , che gli era succeduta : ma non è lo stesso del tremor convulsivo . Si è veduto il cervello , e la midolla della spina inondate d' una serosità verdastria : della sanie nei ventricoli del cervello : delle suppurazioni , delle putrefazioni , e perfino dei vermi in alcune parti di questa viscera . I vasi , generalmente parlando , son comparsi pieni d' un sangue purulento , o putrido . Si è trovata la milza orribilmente gonfia , e talora cartilaginosa : la bile imprigionata ne' suoi propri vasi , che n' erano prodigiosamente dilatati : suppurazioni , putrefazioni , e cancrene al petto , e al basso ventre ; e la matrice principalmente si è trovata offesa , e pregiudicata .

Si vede bastantemente , importar molto per la medicatura il distinguere di quale specie sia il tremore , vale a dire , se appartiene alla paralisi , o alla convulsione , per poter fare una scelta adeguata dei rimedj proposti negli Articoli dell' uno e dell' altro morbo . Tuttavia noi additeremo in questo luogo quelli , che sono stati con più frequenza messi in opera , cioè , contro quel-

quello della prima specie, dopo rimedj generali, i *fortificanti*, gli *stomachici*, e i *cefalici*, come la salvia, la melissa, lo stoechas, la favoreggia, l'enula campana, il finocchio, la china-china, il garofano, la noce moscada, ec. ai quali si possono aggiungere i *marziali*, e i *diaforetici*. Il tremore, che nasce dall'abuso del *corio*, del *vino*, ec. non richiede, che *allentanti*, *addolcenti*, e *temperanti*. Per quello, ch'è cagionato dal mercurio, si raccomandano i *cordiali*, i *diaforetici*, i *diuretici*, ec. Si propongono altresì pel tremore di debolezza i *bagni*, le *fregagioni*, e le docciature d'acque, di Borbone, di Vichy, di Digne, di Bagnols, d'Aix-la-Chapelle, ed altre *termali*: i linimenti fortificanti, le fomite, e le fumigazioni aromatiche, ec.

Il *tremor convulsivo* richiede altri ajuti: la *cavata del sangue*, e i *purganti*, se le forze, l'età, e le circostanze del mal principale lo permettano, vi sono giovevoli: la prima soprattutto è necessaria, quando vi è troncamento di qualche sgorge di sangue abituale. Si pon quindi mano, dopo alcuni altri rimedj generali, agli *stomachici*, e agli *antelmintici*, agli *antiscorbutici*, ai *fortificanti*, e agli *alestiterj*, ai *cefalici*, e agli *antispasmodici*. Le *acque termali*, sì per uso interno, che in bagno, e in docciatura, vi sono utilissime. Siamo accertati d'aver ritratto dei buoni effetti dai *bagni freddi*. Non debbon trascurarsi le *fregagioni*; ma ci dobbiamo assai promettere dal *setone*, o dal *cauterio*. Si può finalmente diminuir molto, come abbiamo già osservato, il *tremore della febbre*, facendó bere in copia ai pazienti dell'acqua calda alcun tempo prima dell'ora del rigor freddo. Non credo necessario il dire, che il *tremor passeggero*, che nasce dal freddo, dalla paura, dalla collera, ec. non vuole alcun rimedio.

LA PARALISSIA.

E' noto, che la perdita del moto, e del senso; o d'una di queste due funzioni, costituisce la *paralisi*, il cui intorpidimento, e debolezza posson considerarsi come i primi gradi. Si sa, che se investe tutto il corpo, ella è *paralisi universale*; se un lato, dicesi *emiplegia*; e finalmente se occupa una sola parte, o membro, come un braccio, una gamba, le palpebre, la lingua, la faringe, la verga, la vescica, l'ano, ec. dicesi *parziale*. Tutte queste *particolari paralisi*, avran-

no il loro luogo altrove. La paralisi rade volte è *primitiva*; ma d'ordinario ella vien dietro all'apoplessia, talvolta all'epilessia, e ad altri morbi convulsivi: alla nefritica violenta, alla colica, e alla dissenteria, alla gotta, e al reumatismo: ella è anche un prodotto della vecchiazza, dell'affezione ipocondriaca, e scorbutica, della cachessia, e del malfrancese; dello spoffamento non meno per soverchia perdita di sangue, che d'effusion seminale: dei vapori metallici, e singolarmente mercuriali, dell'ubbrachezza, e del vino alterato col litargirio, del lungo uso dei narcotici; e finalmente dell'estremo freddo, e singolarmente del freddo umido, per non far parola delle piaghe, delle lussazioni, e delle fratture, che vi danno similmente motivo. I fanciulli divengono altresì paralitici pel regresso delle fioriture cutanee, per la rea medicatura del vajuolo, ec. La paralisi ipocondriaca, la scorbutica, e quella, che vien dietro alle affezioni convulsive, privano d'ordinario del solo moto. L'intorpidimento, che provasi nell'estremità dopo una compressione, o una legatura, scuopre con sufficiente chiarezza ciò, che accade nella paralisi; e quello, che si contrae maneggiando quel singolar veleno, che dicesi *torpedine*, può darci ancora intorno a ciò qualche lume.

L'*emiplegia*, dalla quale rimangono comunemente offesi l'occhio, la lingua, e la bocca, e ch'è la più comune specie di paralisi, non dà gran fatto da temere, quando è libera la testa, e si può in questo stato invecchiare. La *paralisi universale*, che non porta via in brev'ora gl'infermi, può durar lungo tempo: si prende buono augurio dal tremore, dall'informicollamento, dai pungimenti, e dai dolori, che si fanno sentire nelle membra paralitiche: si fonda ancora qualche speranza sopra la febbre, che sopravviene alla paralisi, che proviene dalla paralisi serosa. Quando vi è sola *perdita del moto*, lo che è molto familiare agl'ipocondriaci, e agl'iscorbutici, la paralisi è meno da temersi, e più curabile: quella, ch'è stata preceduta dall'apoplessia, o da qualsivoglia altra affezione del cervello, è la più ostinata; quella, che occupa il basso ventre, e le parti inferiori, è mortale. La paralisi antica dissecca le parti: non vi è più, che sperare per le parti offese d'atrofia, e che hanno perduto gran parte del lor calor naturale. La paralisi termina talora

lora per le convulsioni , ma con più frequenza colla cancrena, ch'è comunemente preceduta dall'enfiagione della parte: dobbiamo aspettarci altresì la cancrena nella paralisi cagionata dal freddo. La recidiva del male, di cui parliamo, è da temersi più del primo attacco, e rade volte se ne ha un terzo. L'*intorpidimento* nei morbi acuti è un pessimo segno, massime se vi è lesione alla testa: non si ha da temer gran fatto di quello, che investe sovente gl'ipocondriaci, e le isteriche. Del rimanente la paralisi si dilegua talvolta, di pari che l'apoplessia, senz'ajuto; e siccome è assai raro, che non vengavi amministrati rimedj, così non si lascia d'attribuire ai medesimi il felice *evento*: si è anche veduto più volte, che la paralisi, per la quale si era impiegato tutto quello, che l'arte può suggerire, si è sul fatto dileguata, per un grande spavento, per un'eccessiva collera, o per qualunque altra violenta passione.

L'*ispezione anatomica*, oltre gli sconcerti, de' quali abbiamo parlato nell'articolo dell'apoplessia, fra i quali le inondazioni, sì del cervello, che della midolla spinale, e le comunissime suppurazioni, ci presenta più particolarmente la putrefazione dei corpi scannellati, un vizio nella midolla spinale, ora sciolta, ora disseccata, la lussazion delle vertebre, le future allentate, ec. Bisogna aggiungervi la bile imprigionata ne' suoi proprj vasi, delle putrefazioni, e delle suppurazioni nel basso ventre, ec.

Dopo ciò, che abbiamo detto intorno alla *cavata del sangue* nell'Articolo dell'apoplessia, si argomenta drittamente, che non può appropriarsi, se non se alla paralisi, che succede all'apoplessia sanguigna; e pur anche la riputiamo inutile, quando è invecchiata. Deesi per altro aver riguardo all'età, allo stato delle forze, e agli antecedenti, come alle cagioni evidenti. E' anche necessaria in questo luogo l'applicazione di ciò, che abbiamo riferito nel medesimo luogo, rispetto agli *emetic*, ed ai *purganti*. Possonsi però ritrarre dei vantaggi grandi dall'uso moderato dei secondi, non meno contro la paralisi scorbutica, che contro quella, ch'è venuta dopo la colica, ec. Non si dee parimente trascurar l'uso dei clisteri acri, stimolanti, e aromatici. Oltre questi rimedj generali, ed altri molti, che posson richiedere le circostanze sempre variate, si raccomandano i *fortificanti*, i *sudorifici*, gli *antisporbatici*, e gli *aperienti*: i rimedj più impiegati, presi in tutte queste classi,

sono la *salvia*, lo *stoechas*, e la *melissa*, il fior rancio, la canforata, le coccole di ginepro, il guajaco, i gran-
chi, i centogambe, e le vipere; il succino, i marzia-
li, il bezoar minerale, l'antimonio diaforetico, l'aqui-
la bianca, e altre preparazioni mercuriali. Vien molto
commendato altresì l'uso, sì interno, che esterno del-
la trementina di Scio, di quella di Venezia, ec. Ma
si dee far più conto, che di tutt'altro rimedio, delle
acque minerali calde, tanto prese per bocca, che in ba-
gno, in doccia, ec. Le più frequentate son quelle
di Borbon Lancy, Archambaut, di Vichy, di Borbo-
ne, di Monte d'oro. di Balaruc, di Plombieres, di
Digne, d'Aix-la Chapelle, di Bagnères, di Barege, ec.
Si raccomanda soprattutto il docciarne la spina: final-
mente dobbiamo dire, che si preferiscono quelle di Bor-
bon-Lancy per le paralisi scorbutiche. Si può anche
far uso dell'*applicazione degli animali* viventi, o uccisi
di fresco, della loro pelle fino a che conserva il suo
calore: dei *linimenti* coll'olio di petriolo, con quel-
lo di lauro, o di formica, coll'unguento marziale, e
con altri fortificanti: delle *foment* aromatiche, e spiri-
tose: delle *fregagioni* secche, o fatte coll'acquavite can-
forata, e con altri spiritosi liquori: della *flagellazione*
con delle ortiche, dei *sinapismi*, dei *vescicanti*, del *se-
zone*, e del *cauterio*: si dee porre nella classe medesima
i *bagni aromatici*, e quelli del vapore. Si può eziandio
in mancanza delle acque termali preparare un *bagno ar-
tificiale* con quattro libbre di calcina viva, e due lib-
bre di zolfo, che si fanno bollire in un'adeguata quan-
tità d'acqua: il bagno d'*avena*, e quello delle *vinac-
ce*: le foglie di leccio messe in forno, delle quali s'in-
viluppa le parti, ec. sono i *topici*, dai quali sonosene
veduti de' buoni effetti.

STUPIDITA', E PERDITA DELLA MEMORIA.

La mancanza di comprensione, e di memoria è l'ap-
pannaggio dell'infanzia, e della vecchiezza: ha questa
pure la sua sorgente nelle altre età in una disposizio-
ne ereditaria; e in questo caso a mala pena soggiace al-
la Medicina. Ma non è lo stesso di quella, che è ef-
fetto dell'apoplessia, della commozion del cervello,
dell'idrocefalo, ec. Il terrore, i disgusti, e l'avversità
fanno sovente perdere la memoria, e rendono la per-
sona *stordita*. Quei, che straviziano nel vino, e nelle
don-

donne, di pari che coloro, i quali fanno un lungo uso dei narcotici, provano spesso la stessa sventura: la soppressione de' menstrui, e le perdite eccessive di sangue, hanno pur fatto cadere in questo stato, di pari che le più gravi malattie, sendosi trovati dei convalescenti, che si erano perfino scordati del proprio nome. L'abuso che altri fa dello spirito penetrante, e della vivacità del fanciulli, le fatiehe innanzi tempo, colle quali si opprimono, e più che altro la loro lubricità, con frequenza gli rende stupidi: accade ancora talvolta, che lo spirito si sviluppi molto tardi; poichè si sa, come alcuni di quegli, che ne hanno in copia, sono stati balordi, e stupidi in lor gioventù, e, lo che è anche più singolare, che persone stupide, e senza memoria, son passate nello stato opposto, per una grande infermità, per una caduta, e per altri accidenti, i quali in altre circostanze, hanno spessissimo cagionato la *stupidità*.

L'ereditaria, e quella della grande età, sono *incurabili*. La *perdita della memoria*, senza manifesta cagione, presagisce sovente l'apoplessia, e la paralisia. Si può curar quella, che nasce dall'ubbrachezza, dai narcotici, dallo spoffamento, dalla commozione, e da altri accidenti. Quando è la conseguenza delle grandi infermità, si ricovra piuttosto col tempo, e dalla Natura, che con i rimedj: ma bisogna eccettuarne quella, che vien dietro all'apoplessia.

Quello, che le mie *osservazioni anatomiche* mi hanno offerto di più comune, si è, l'inondazion del cervello, la sua picciolezza, la sua flaccidità, o la sua aridità, che arriva talvolta a renderlo stritolabile: delle idatiidi, degli abscessi, ed altri tumori, delle pietre, ec. Sonosi talora vedute delle alterazioni nella dura madre, che era livida, piena di pustole, in istato di putrefazione, e forata: delle viziose conformazioni del cranio, e delle future, la grossezza straordinaria delle ossa, ec.

Si sa pur troppo, che in questi due stati si cava poco frutto dai rimedj, e che se altri talora si ricovra dall'una, e dall'altra, dipende anzi da un buon governo fiancheggiato da tutti gli ajuti, che può dare un' eccellente educazione, che da un metodo curativo: il tempo, e la natura possono in questo caso operar maraviglie. Nulladimeno, dopo i rimedj generali, propongonsi i *cefalici*, e gli *antispasmodici*, come, a cagion d'esempio, i fiori di stoechas, il rosmarino, il tiglio, il mu-

mughetto , e il fior di primavera : la peonia , la valeriana , la zedoaria , la canna aromatica : i cubebi , gli anacardi , il macis , e il garofano : l'incenso , e la mirra , l'ambra , e il muschio , ec. Si ha però qualche dubbio rispetto a questi ultimi , di cui è noto , che l'abuso ha talvolta prodotto la stupidità in persone , che non vi parevano disposte . Da molti Pratici vien consigliato lo *spirito di sale ammoniaco succinato* nella dose di dieci goccioline sera , e mattina . Gli *sternutatori* , i *salivanti* , ed altri evacuant idragogi posson pure far gran bene . Finalmente non vi è dubbio , che tutto il da noi proposto non possa concorrere alla *guarigione* , quando la natura seconderà ; ma non occorre prometterli la menoma cosa , qualora questa ripugni . Non dobbiamo lasciar di dire , che uno dei punti principali del governo , si è di concedere al sonno il più breve tempo , che si può mai .

LA VIGILIA .

La *perdita del sonno* , comprendendovi il *coma vigil* , il quale , come abbiamo osservato , s'aspetta a questo articolo , rade volte è *essenziale* ; ma quasi sempre *sintomatico* , non meno in seguito dei mali acuti , che in quello dei cronici . E' noto , che i disturbi , e le affezioni d'animo bandiscono il sonno : che i melancolici , e i maniaci ne sono spesso privi : le persone adulte , d'un temperamento vivo , e bilioso , sono di pari soggette alla *vigilia* : gli uni , e gli altri sono altresì tormentati da pensieri penosi , e spaventevoli , più insopportabili della stessa *vigilia* : quegli eziandio , che stanno troppo in letto , non vi gustano , che un sonno interrotto , che fa , che si lagnino della *vigilia* . Lo stato dello stomaco produce diversi effetti rispetto al sonno : ve ne sono di quelli (ed è il numero maggiore) , i quali sono obbligati a non cenare per poter dormir la notte , e per liberarsi anche dall'oppressione notturna in dormendo ; dove per lo contrario altri non posson dormire posatamente , se non hanno pieno lo stomaco . Ve ne sono di quelli , i quali sono posti in *vigilia* dal caffè ; eppure moltissimi ne prendono impunemente prima d'andare a letto : per non far parola d'infiniti altri piccioli usi , noti ad ognuno , i cui buoni , e rei effetti son relativi al temperamento , o all'abito .

Non vi ha cosa , che alteri la sanità , quanto la *vigilia* :

lia: non vi sono che i *melancolici*, e i pazzi, che la possono soffrir lungo tempo senza mostrarne incomodo, essendosene veduti fra cottoro di quelli, che sono stati mesi, e anni senza dormire. La *vigilia febbrile* è, siccome abbiamo detto, il *foriere del delirio*. L'ispezione anatomica ci fa vedere delle inondazioni nel cervello, e nella midolla spinale: a questo proposito io dirò, che si dee già avere osservato negli articoli precedenti, come il più delle volte questa cagione produce un effetto contrario. Sonosi scoperti ancora degli ascessi nel cervello, delle infiammazioni nella dura madre, delle carie nelle ossa del cranio, delle suppurazioni, e putrefazioni nel pancreas, ec. Prodotti tutti, come altri ben vede, di parecchi altri morbi, de' quali la *vigilia* non è stata, che il sintoma apparentemente il più rilevabile.

Alcune persone, che da lungo tempo si lagnavano della *vigilia*, hanno rinvenuto il modo di liberarsene col non restare in letto, che sole sei, o sett'ore: altri hanno trovato del vantaggio con bere prima di porsi a letto un buon bicchier d'acqua, dell'orzata, della limonata, del latte, del siero, ec. Molti si servono con vantaggio dello *sciroppo di Nenusar*, di quello di *viola mammola*, ec. Si può ricorrere alla *cavata del sangue*, e agli altri *rimedj generali*, quando lo vogliano circostanze particolari; ma gli *umettanti*, i *rinfriscanti*, e gli *addolcenti*, de' quali si fa fare un lungo uso, sono le medicine più praticate per la *vigilia* d'ogni specie. Nelle abituali i *bagni riescono* con frequenza vantaggiosissimi. Deesi eziandio far molto conto dell'esercizio in un'aria buona, dell'uso moderato, e legittimo dei piaceri, della musica, della piacevole lettura, ec. E' noto, come molti s'addormentano al mormorio d'una fontana, o al suono della voce d'uno, che legga: è nota l'efficacia delle prediche: ultimamente certuni sono stati costretti a farsi cullare. La *carsoa* è un calmante, che giova ai *melancolici*, e che si può anche dare nei morbi acuti: il *liquore anodino minerale*, e la *polvere temperante* son pure medicine approvate. Quanto agl'*ipnotici*, che in questo sembrano coerentissimi, non se ne dee far uso, che con gran circospezione; poichè l'abito, che se ne contrae, è perpetuamente più, o meno pregiudiziale. L'*immersione* delle gambe nell'acqua calda, oppure in un decotto anodino, con molta frequenza è stata efficacissima, non meno nei mali acuti, che negli altri casi.

L' INCUBO.

Questo male, che mostra d' avere un' affinità grande con i morbi convulsivi, è un senso di peso sul petto, che prova si in dormendo, e che aggrava non altramente, che far potesse un gran peso, e spaventa anche di più coll' idee di fantasmi, e di chimere, che d' ordinario l' accompagnano: ma questa oppressione, e questi terrori si dileguano svegliandosi; lasciano però la persona grandemente abbattuta, e talvolta con delle palpitazioni di cuore. L' incubo (*incubus*) investe per lo più coloro, che hanno lo stomaco pieno d' alimenti, e i dati alla crapula lo provano più che ogni altro, e con maggior frequenza: con tutto ciò i *pletorici*, gl' *ipochondriaci*, le donne *isteriche*, come si pretende, e i *bambini lattanti*, vi sono più di tutti sottoposti: si crede per questi ultimi, che le paure, che gli svegliano in un subito con dei gridi (*pavor*) debbano ascriversi all' *incubo*. Questo male, quando non è nè frequente, nè violento, non è pericoloso; ma nel caso contrario, può presagire, massime nei giovani, l' *epilessia*: e si è anche veduto talvolta, che nè aveva preceduto la pazzia: nei vecchi deesi considerare, come un foriere dell' *apoplessia*: per altro uno può rimanerne soffogato sul fatto, e non ne mancano esempi per tutte l' età: si è perfino veduto in Roma l' *incubo epidemico* niente meno micidiale della stessa pestilenza. Nulla c' insegna rispetto alla natura di questo male l' *ispezione anatomica*: se in alcuni è stata trovata dell' acqua nei ventricoli del cervello, o delle suppurazioni nelle varie parti di questa viscera, sono stati stranieri accidenti, che non mostravano alcun rapporto coll' *incubo*.

La *sobrietà* è il punto più essenziale della *medicatura*, e per lo più in questo tutto consiste: alcuni se ne liberano badando di non coricarsi sulla schiena: io però ne ho veduti di quelli, ai quali era più giovevole una tal situazione. Vi è utile sovente la cavata del sangue: non si potrebbe dispensarsi dei *purganti*, ed anche talvolta degli *emetici*: quindi si passa agli *allentanti*, ai *temperanti*, e agli *aperienti*, agli *stomachici*, sì *amari*, che *assorbenti*, e *fortificanti*, ai *cefalici*, e agli *antispasmodici*. I rimedj particolari, de' quali si è fatto maggior uso, sono il fumosterno, lo *stoechas*, il rosmarino, la melissa, la salvia, e la battonica: i semi, e la radice
di

di peonia, il succino, l'aloe, i marziali, il tartaro vetrinato, le acque minerali, sì fredde, che calde, ec. Per altro molto rari sono quei casi, nei quali sia lecito il far uso di tutte le cose divise.

LA MELANCOLIA.

Ognun sa, che l'inclinazione, che porta alla tristezza, a riflessioni sopra oggetti disgustosi, può, quando altrivi s'abbandona, precipitar nel delirio, o nella mania. I *melancolici* sono in estremo soggetti a terrori panici, ad abbagliamenti, e a sfordimenti: piangono senza motivo: il loro sonno è affannoso, ed accompagnato da immagini spaventose: lagnansi con frequenza d'un dolore, o d'un peso alla testa, e dello scampano dell'orecchie: vengon sovente investiti da tremori, da convulsioni, e da assopimento: hanno delle palpitazioni, degli stringimenti di petto, e delle ansietà: il polso loro è picciolo, disuguale, e intermittente; ed in molti si scuoprono delle pulsazioni nel basso ventre. Soffrono dei rutti, e delle flatulenze: fanno degli sputacchi fissi, e le urine limpide, e bianchicce: si gonfia loro talvolta il basso ventre, ed è quasi sempre costipato. Occupa la maggior parte de' melancolici il terror della morte: alcuni però hanno la vita a carico, e bramano di terminar colla morte i loro guai: ve ne sono di quelli, il cui delirio è ridicolo, e singolare: con frequenza si raggira intorno ad un solo oggetto: tutti i nostri libri son pieni di siffatte istorie. Vi ha un'altra specie di delirio melancolico, sebbene rarissimo, che induce i malati a fuggirsene di casa, ed a spaziar per le campagne come lupi, e per tal ragione dicesi *lincantropia*: altri senza fuggirsene mutano perpetuamente situazione, e credono di poter star bene, ove unicamente non si trovano; ve ne sono al contrario di quelli, che non vogliono abbandonare il luogo, ove si trovano, e che cadono in una specie di stupidità, che gli rende indifferenti per la compagnia, e per la solitudine. Bisogna altresì porre sotto questo titolo la *nostalgia*, che adimandasi comunemente la *malattia del paese*: tuttochè la brama di rivedere la propria Patria sia perpetuamente ragionevolissima.

L'amore, i dispiaceri, l'avversità sono le più ordinarie sorgenti della *melancolia*: talvolta dipende la medesima da una *disposizione ereditaria*. Il troncamento degli

gli sgorgi emorroidali, ed infiniti altri morbi possono spianarvi la strada: ma ella è d'ordinario la conseguenza delle affezioni ipocondriache, e isteriche: per altro io non sono d'avviso, che si possano confondere queste malattie; imperciocchè tutti gl' ipocondriaci non son melancolici, e questi non son sempre ipocondriaci: egli è vero però, che questi due stati s'uniscono per lo più insieme, o presto, o tardi. E' bastantemente noto, come la melancolia, e tutte le affezioni dello spirito possono cagionare i più orridi sconcerti, e che lo scorbutico, la febbre lenta, il marasmo, ec. ne sono le più ordinarie conseguenze. Si è talora veduto, che il flusso emorroidale, le piaghe, la rogna, ed altri morbi cutanei hanno felicemente fatto dileguare questa infermità; intorno alla quale pochi lumi ci vengono somministrati dall'anatomia: non è già, che ci manchino le aperture di tali cadaveri; ma le istorie, che vi si sono unite, sono sì accorciate, ch'è impossibile il rilevare, se appartengano alla melancolia, o all'affezione ipocondriaca, malattie per lo più confuse dagli Autori.

Nella maggior parte abbiamo veduto i *vasi del cervello* rivati d'un sangue nericcio, e compatto; dell'acqua nei ventricoli, ec. Si è anche talora osservato il plesso coroide involuppato d'una spezie di muco, la glandula pineale di straordinaria grossezza, ec. Il cuore in alcuni è comparso inaridito, e senza sangue: in altri i suoi ventricoli erano pieni di concrezioni polipose, o di sangue fetido, e slegato, per non parlare d'alcuni sconcerti relativi alle viscere del basso ventre, di cui abbiamo fatto parola nell'articolo dell'affezione ipocondriaca.

Il male, ch'è l'oggetto del presente articolo, non vuole per lo più alcuna *medicatura*, che appartenga alla medicina; ma se in alcune circostanze venghiamo costretti di ricorrere ai rimedj, debbonfi soltanto usare i sommamente piacevoli; ed i Pratici illuminati, e di buona fede confesseranno, non esservi cosa più ovvia del veder peggiorare questo stato nelle lor mani. La cavata del sangue, checchè se ne dicano quasi tutti gli Autori, non è sempre necessaria, quando non vi sia soppressione d'alcuno sgorgo abituale di sangue. Posson esser vantaggiosissimi gli *emetici*, di pari che i *purganti*, quando lo voglia lo stato delle prime vie. Ma non vi ha cosa più proficua degli *umettanti*, degli *allentanti*, e dei *temperanti*: tali sono l'acqua semplice, i cicoracei,

cei, il fumosterno, la pazienza, ec. il latte d'asina, o di capra, il siero, l'acque minerali fredde, ec. Si ha talora bisogno di ricorrere agli *aperienti*, ai *nitrosi*, ai *marziali*, e agli *antiscurbutici*: dannosi anche dei casi, ne' quali si può far uso dei *cefalici*, degli *antispasmodici*, e dei *calmanti*: fra questi lo zafferano, e la canfora posson giovare: possiamo anche ricorrere agl'*ipnotici* nei casi urgenti; ma importa molto il sovvenirsi, che se questi posson palliare l'infermità, i medesimi rendonla anche più ostinata. Dirò per ultimo, che dopo il *copioso bere*, i lavativi rinfrescanti, e i bagni, dai quali molto ci dobbiamo promettere, non so vedere miglior rimedio del *divertimento*, e dell'*esercizio*: aggiungerò ancora, come la *nostalgia* non vuol rimedj, potendola dileguare il solo ritorno alla Patria; ma il più delle volte uno s'appiglia troppo tardi a questo partito.

LA MANIA.

E' noto, che i *pazzi* hanno una forza terribile unita ad una violenta inclinazione al coito: che soffrono il freddo, la fame, la vigilia ec. senza rimanerne apparentemente pregiudicati. Abbiamo detto, che l'ultimo grado della melancolia ha grande affinità colla mania: ora si vede, che le cagioni medesime, fiancheggiate da una disposizione ereditaria, posson precipitare nell'uno, o nell'altro stato. Quegli, che s'abbandonano alle *passioni vive*, con una buona dose di ciò, che chiamasi *bell'ingegno*, debbon temere di perdere il senno: si vede tutto di, come un' eccessiva gioja, un *amore insensato*, i *disgusti*, e l'*avversità*, posson toglierlo, di pari che l'uso trasmodato dei narcotici, i veleni addormentanti, l'abuso del vino, e dei liquori spiritosi, ec. Si fa altresì, che la soppressione degli sgorgi abituali di sangue, e dei lochj, l'*affezione ipocondriaca*, e *isterica*, ed alcune altre gravi infermità, come la frenesia, le affezioni comatose, ec. producono lo stesso effetto con molta frequenza. Quelli, che si danno soverchio in balia al *meditare*, o che s'applicano allo studio delle *scienze astratte*, come altresì le persone pesanti, e stupide, vi sono grandemente soggetti.

Si può curar la mania senza gran difficoltà, quando è recente, massime se gli attacchi sono leggieri: si spera anche molto di quella, che ha avuto origine da alcun male acuto, o da qualsivoglia altro accidente passeg-

giero ; ma l' *invecchiata*, quella che non ha intermit-tenza, o che riconosce una cagione, la cui epoca è an-tica, *fa testa* il più delle volte a *tutti i rimedj*. Si è of-servato, che le grandi perdite di sangue, ed anche le al-tre evacuazioni, come la diarrea, e la dissenteria, han-no talvolta liberato dalla mania : la febbre quartana, e le altre intermittenti hanno parimente prodotto l' ef-fetto medesimo, tuttochè in altre circostanze abbian dato motivo alla malattia, di cui ragioniamo . Quelli , che se ne ricovrano stentano infinitamente a superare un' orribile tristezza, che conserva la memoria umilian-te del loro stato .

L' *apertura dei cadaveri* ci ha fatto vedere il cervello secco, e indurito : la sua massa elastica , che si rialza-va, allorchè n' era tolto via il cranio : il plesso coroi-de varicoso, e stivato d' un sangue nericcio ; di pari che i seni, e gli altri vasi : dell' acqua sparsa , e delle ida-tidi nei ventricoli . Sono state vedute delle macchie nere sì nel cervello, che nella dura madre : la putrefazione di questo involuppo : delle ossificazioni alla falce, e al-la tenda del cerebello : la pia madre fissa , e callosa , senza apparenza di vasi : dei vermi non meno nel cer-vello, che nei seni frontali : le ossa del cranio d' una grossezza straordinaria : la cistifellea piena d' una bile collosa, e verdastrea, o nera, ec.

Le numerose *cavate di sangue* sono in questo caso in-dubitatamente necessarie : non ci contentiamo di cavare sangue dal braccio, dal piede, e dalla gola ; ma s' apre ancora l' arteria delle tempie : e questa operazione ai-dì nostri sommamente trascurata, ha talvolta nelle mie-mani prodotti ottimi effetti : si applicano colla stessa mi-ra le mignatte alle emorroidi, alle vene della fron-te, ec. Finalmente mettonsi in opera tutti i mezzi, per richiamare il flusso emorroidale, e menstruale . Sono al-tresì indispensabili gli *emetici*, ed i *purganti* : servono questi principalmente ad evacuar la bile, che in questo male cova sovente nelle prime vie , o ne' suoi propri vasi : i lavativi stimolanti , e purganti adempiono le medesime intenzioni ; ma gli *allentanti*, gli *umettanti*, i *temperanti*, i *rinfrascanti*, e i *nitrosi*, sono i rimedj sopra i quali ci dobbiamo fondare : tali sono le bevande semplici, o composte in gran copia , l' acqua gela-ta, i cicoracei, la borrana, il fumosterno : il riso , l' orzo, il latte, il siero, l' orzata , l' emulsioni , le ac-que

que minerali fredde, ec. I *calmanti*, ma non già narcotici, fanno pure gran bene: soprattutto efficacissima riesce la *cansora*; è permesso il darne fino a mezza dramma, una o due volte il giorno: si può eziandio pel furore far uso dello *zucchero di Saturno*, da due fino a otto grani. Utili vi sono anche gli *antipasmatici*; ma l'oppio, il papavero, e gli altri ipnotici, non vi riescono; ed è cosa sorprendente, che Medici, per altro riputatissimi, sienosi ostinati a volerne dare, tuttochè abbiano cento volte provato, ed io stesso l'ho veduto, che rendevano i pazienti furiosi: ma niente abbiamo da temere del *Nenufar*, e della viola mammola, de' quali può darsi lo sciroppo. L'*elleboro*, un tempo tanto famoso, e che taluni pensano di porre in opera anche al presente, non merita i nostri riflessi: ne diremo altrove le ragioni.

Importa molto in questo morbo il fare un grand'uso dei *bagni* più freddi, che caldi; e questo è uno dei rimedj più efficaci: si bagna anche la testa con dell'acqua fredda, ed anche ghiacciata: il bagno delle estremità inferiori, che richiede meno apparato, può ripetersi con frequenza: dannosi anche i bagni freddi domestici: si tuffano similmente i pazienti nei fiumi, o nel mare; ma questa immersione dee essere istantanea, e inaspettata, e dee durar quanto posson la i pazienti sostenere. Si propone di più la *castrazione*; e io credo, che questa operazione, la quale è noto, essere stata praticata con riuscita, potesse esser proficua in parecchi casi: è riuscita altresì quella del trapano, di pari che del cauterio. Si fa finalmente, che alcuni maniaci sono stati liberati da uno spavento, da una caduta, nella quale sonosi rotti le ossa del cranio, o per altro accidente: i giudiziosi Pratici fanno ritrarre dei lumi da tutte le divise osservazioni, le quali passano per curiose nello spirito di coloro, che temono di dilungarsi dalla loro strada battuta.

LA FRENESIA.

Abbiamo veduto nei precedenti Articoli, che vi erano degli sviamenti di spirito, che non cagionavano alcun cambiamento nello stato del polso; ma il delirio, che è accompagnato dalla febbre, è d'altra natura. Ve ne ha di due sorte, uno, che dee considerarsi come il *mal principale*, e che eccita la febbre; l'altro, che è

M

sol-

soltanto un accidente comune a tutte le febbri, delle quali è *sintoma*: lo che, come è agevole a giudicarne, forma una differenza grande, la quale è maraviglia, che sia stata rilevata da così pochi Scrittori: tuttavia può accadere a quei, che hanno il delirio, del quale abbiám parlato nei precedenti Articoli. che per accidente sopravvenga la febbre, lo che non dee mutare, come ben si vede, il carattere della prima infermità. Non vi è che il delirio *idiopatico*, o *essenziale*, perpetuamente accompagnato dalla febbre, che dee denominarsi *Frenesia*, di cui qui singolarmente si tratta: quello, ch'è semplice accidente della febbre, dee chiamarsi *delirio febbrile*. Tuttavia è a proposito l'osservare, che il delirio melancolico, e il febbrile, la frenesia, e la mania, hanno tanti gradi, e s'affomigliano in tante guise, ch'è talora difficilissimo il rinvenire il punto di divisione: ma le conseguenze dileguano la nebbia. La *vera frenesia*, la quale è più rara di quello altri pensi, è preceduta da calore, e gran dolore di capo, che i pazienti riferiscono con ragione all'interno: da roschezza della faccia, e degli occhi, da vigilia, ec. La febbre, ch'è la conseguenza di questo stato, non è sempre proporzionata a ciò, che segue nella testa; e questo delirio sarebbe allora poco diverso dalla mania, qualora questa non durasse assai più. Il *delirio febbrile*, o *sintomatico*, ch'è tanto comune, sopravviene alla febbre, e non n'è, che il semplice accidente, indipendentemente dal quale ella continua perpetuamente la sua carriera: lo che non segue alla frenesia, cessata la quale, si dilegua il male totalmente, e la convalescenza è cortissima.

Non debbo in questo luogo lasciar di parlare di un'altra specie di delirio sintomatico, non mai veduto dai Pratici, ma del quale non lasceranno di far menzione tutti i libri, sotto la denominazione di *parafrenitide*: malissimo a proposito si colloca una tal malattia fra quelle della testa, poichè non è in conto veruno diversa dalla pleuritide; sì l'una, che l'altra dipendono dalla sola infiammazione della pleura: con questa differenza, che nella prima, la porzione di questa membrana è quella, che cuopre il diaframma, ch'è offeso. Non ho veduto la parafrenitide, quale gli Autori, che per lo più si copiano l'un l'altro, l'hanno descritta; e non mi sono imbattuto, se non due volte nell'apertura

ra dei cadaveri, a rilevare la vera pleuritide, tuttochè la maggior parte di coloro, che fanno il Medico, si dieno ad intendere di medicarla ogni giorno: aggiungerò di più, che il delirio non è essenziale all'infiammazione della pleura, e del diaframma, poichè si è più volte veduto queste parti infiammate e suppurate, senza che vi sia stato il menomo delirio: ciò distrugge affatto la dottrina degli Antichi, e di coloro, che la seguono ciecamente.

Abbiain detto altrove, come l'estrema debolezza, che lasciano le grandi infermità, l'affezione ipocondriaca, è isterica, i dolori d'animo, ec. posson precipitare nel *delirio melancolico*: si è altresì veduto, che il *delirio febbrile* poteva sopravvenire alle febbri, di qualsivoglia specie, e che era preceduto dalla cefalalgia, e dalla vigilia: che lo presagivano gli occhi infiammati, lo sguardo fisso, le lagrime, le straordinarie inquietudini, ovvero un'istantanea tranquillità, senza apparente motivo: vi spiana anche la strada il retrocedere delle resipole. La *frenesia vera*, che non dura, che alcuni giorni, e che di rado arriva al settimo, investe i giovani più robusti: quelli, che fanno grand'uso d'alimenti salati, e conditi, come altresì del vino, e dei liquori: quelli, che sono di temperamento bilioso, e portati al trasporto: quelli, che sono stati esposti al sole, che hanno ricevuto delle contusioni alla testa, e somiglianti.

Si sa, che il *delirio melancolico* non minaccia la vita; ma quello, che sopravviene alle *febbri biliose*, infiammatorie, ed altre, al vajolo, e alla rosolia, alla passione iliaca, ec. si dee sempre molto temere. La *frenesia* è uno dei più gravi mali, che porta via con frequenza i pazienti sul terzo giorno, o sul quarto; temonsi in questo caso i tremori, e le convulsioni: sospettissimi sono i vomiti d'una bile porracea; e sono altresì di reo augurio le orine sopresse, o bianchicce. Si è osservato, che l'emorragia, lo sgorgo emoroidale, lo scioglimento del ventre, e talvolta i sudori, erano stati salutari: si forma altresì buona opinione dei dolori, che si fanno sentire in qualche parte del tronco, o delle estremità, come dell'eruzione delle varici, ec. Ultimamente, se il delirio sì essenziale, che sintomatico, sussistono dopo la febbre, degenerano in *melanconia*, in mania, o in letargo.

Non farò menzione in questo luogo dei *varj sconcerti*,

certi, che, nelle malattie acute, e croniche, possono eccitare il delirio: mi farò semplicemente a esporre quello, che si è osservato di più particolare nel cervello; o che par, che appartenga singolarmente alla frenesia. Sonosi veduti i seni della dura madre, e gli altri vasi del cervello grandemente stivati, il plesso coroide varicoso, delle inondazioni, dei tumori, delle escrescenze, e dei vermi. Il cervello con frequenza ci si è offerto inarilito, infiammato, suppurato, e cancrenato: abbiamo osservato i vizj stessi, sebben più di rado, nella midolla spinale: le meningi sonosi trovate aride, infiammate, suppurate, e corrotte: sonosi pure osservate delle pustole sopra la dura madre, e le sue produzioni imparate officate: ultimamente si è veduto la bile covante entro i propri suoi ripostigli.

Il *delirio senza febbre* vuole i rimedj da noi indicati negli Articoli della melancolia, e della mania; e la scelta dee essere regolata dalle circostanze. La medicatura del *delirio febbrile*, e sintomatico similmente appartiene all'Articolo delle febbri; dirò semplicemente intorno a tal soggetto, che le *cavate di sangue* non vi sono di quella efficacia, che altri si dà a credere, massime quando il male avanzato, e che ne sono state fatte varie prima d'un tale accidente: si fa altronde, come per le osservazioni fatte dal *Willis*, dal *Floyer*, e da molti altri Scrittori, che il bagno freddo, non solamente è accennato a dileguare il delirio febbrile, ma eziandio a curar la malattia principale; lo che non fa poco contro alla cavata del sangue. Quanto alla *frenesia*, non si potrà mai esser soverchio solleciti nel cavar sangue dai vasi che si è nell'abito d'aprire: le cavate del sangue dal piede, o dal collo, sono in tal caso le più raccomandate; e vi è stata praticata con buono evento anche l'arteriotomia. L'*emetico*, e i *purganti*, dopo aver bene scemati i vasi, sono dicevolissimi, e con frequenza bandiscono il male, che ha fatto testa a tutte le cavate di sangue: i clisteri rilascianti, e stimolanti sono parimente molto proficui. Si dee fare nel corso di questa infermità un uso grande degli *allentanti*, degli *umettanti*, degli *adulcenti*, e dei *temperanti*, fra i quali l'acqua, il cotto lungo di riso, di cicoria, e di pollo, il siero, e le emulsioni sono i più messi in opera. La *canfora*, il *nitro*, son con ragione tenuti per i migliori calmanti che possansi praticare in questo caso; ma dannosi sono

narcotici; come quelli, che anzi che calmare, inquietano viemaggiormente i pazienti: debbonfi bandire altresì tutti i topici, che son dotati di tal qualità. L'*sinapismi*, i *vescicanti*, e le coppette, applicati alle parti inferiori, non fanno veramente effetto, se non quando si fanno precedere le necessarie evacuazioni, ed il bere più abbondevole. L'*immersione de' piedi* nell'acqua calda può pure far gran bene, come altresì l'applicar le *mignatte* alla fronte, alle tempie, e ai vasi emorroidali, massime quando è chiuso il loro sgorgo abituale.

LE CONVULSIONI.

Deesi distinguere la *convulsione* dai *moti convulsivi*: nel primo caso le parti restano fisse, e immobili: nel secondo vengono agitate da scosse più, o meno violente. I moti convulsivi portan seco d'ordinario la perdita del conoscimento; dove per lo contrario questo vien conservato assai sovente nella convulsione: il respiro resta poco pregiudicato in tutt'e due i casi; ma il polso il più delle volte è oscuro, e talvolta febbrile. Si sa, che questi morbi posson essere generali, o particolari; e non vi ha chi non sappia, che ne sono le sedi i muscoli: incertissima è sempremai la loro durata, ma hanno talora dei nuovi accessi regolarissimi, come la febbre intermittente, siccome si osserva bene spesso nelle donne di carattere isterico. Se la convulsione dilunga i due angoli della bocca, si dice *spasmo cinico*: se ciò non segue, che da un lato, è *storcimento di bocca*: fa di mestieri distinguer questo secondo da quello, che nasce dalla paralisi, il cui apparente effetto è a un di presso lo stesso. La convulsione attacca i muscoli della spina, dicesi *tetanos*: comincia questa comunemente dai muscoli della mascella, e quindi s'impadronisce del collo, e del dorso fino alle estremità inferiori: se restano attaccate le sole piegature, addimandasi *emprostotonos*; se i soli estensori, *opisthotonos*: ma fatte differenze, non mai lasciate indietro dagli Scolastici, sono infinitamente trascurate dai Pratici. Vi sono altre malattie convulsive, che rimettiamo ad Articoli particolari; tali sono l'*epilessia*, l'*asma convulsiva*, l'*incubo*, le *palpitazioni*, lo *sternuto*, il *singhiozzo*, il *priapismo*, ec. potrebbonsi eziandio collocare nella classe delle convulsioni lo *sbudiglio*, e gli *stiramenti di vita*. Vien fatto parola di un'altra specie di convulsione

generale, che si denomina *catalepsia*, intorno alla quale sonosi spacciate molte favole : questa non è che un grado delle altre convulsioni , in cui le parti più pieghevoli possono uscir di luogo , e conservarsi la situazione, che si dà loro : appartiene questa singolarmente alle affezioni ipocondriaca , e isterica, e vuole una stessa medicatura : per rimaner convinto di questo, basterà dare un'occhiata a tutte le istorie, che ce ne sono state lasciate: vi si vedrà, come la *catalepsia* è stata quasi sempre la conseguenza delle meditazioni soverchio inoltrate sopra la Religione, della soverchia applicazione, e di tutte le passioni veementi. Non debbo lasciar indietro un'altra specie di convulsione anche più singolare, che fa ballare, e saltellare i pazienti : questa addimandasi il *ballo di San Vito*, *Chorea Sancti Viti* : è familiare ai fanatici , ed agli entusiastici : non è molto tempo , che si vide in mezzo a Parigi ; e la vedremo ancora oggi , se non l'avessero fatta cessare i regolati comandamenti , come quella , che piuttosto appartiene alla politica , che alla Medicina . Possiamo collocare nella stessa classe quei pretesi *energumeni* , che imponevano ai nostri buoni vecchi , ma che non farebbero gran fortuna in questo secolo illuminato .

I *pazienti* , nella maggior parte delle convulsioni non possono nè *parlare* , nè *operare* ; ma certuni in siffatto stato *veggiono*, e *odono tutto*, e ne conservano persino la memoria . Abbiamo detto , che non seguiva lo stesso dei *moti convulsivi* , che tolgono per lo più ogni *sentimento* : le convulsioni dell'una, e dell'altra specie vengono con frequenza annunziate da *abbagliamenti* dal tintinno delle orecchie, da sbadigliamenti, da allungamenti di vita, e da tremori ; da ansietà , da cardialgie , e da nausea , da palpitazioni , e da sconcerto di polso ; da un freddo, o da un informicolamento ai piedi ; da un senso d'aria fredda, la quale dalla base dell'osso sacro ascende lungo la spina ; dalla *tensione degli ipocondri*, dal costringimento violento dell'ano, del collo della vescica, ec. Dopo l'accesso i pazienti sentonsi rotti, e come tutti pesti : alcuni hanno degli svenimenti, o cadono in un sonno profondo : altri restano cori dei torpori : ve ne sono di quelli , che lo terminano con degli urli, e delle altegrida : molti finalmente nel tempo dell'accesso patiscono un violento priapismo, il quale non cessa nemmeno dopo morte .

Ognun sa, che le donne, e i fanciulli, le isteriche, e gl' ipocondriaci, sono più di ogn' altro *soggetti alle convulsioni*: l'amore *insensato*, non meno speculativamente, che in pratica, la paura, e le *altre passioni d'animo*, sovente vi spianano la strada. Precedono le medesime talora la fioritura de' mentrui, o sono la conseguenza della lor soppressione, dei parti malagevoli, o degli aborti. I violenti sforzi del vomito, e i purganti drastici, la soppressione, e la ritenzione delle orine; quella del seme; nei fanciulli i vermi più che tutt' altro: la morficatura, o puntura degli animali, i veleni, i vini alterati; la gotta rimontata, il regresso delle fioriture cutanee, il troncamento del sudore, ec. è eziandio la conseguenza della soverchia astinenza, e delle grandi perdite di sangue: le contusioni, le piaghe, le fratture, le lussazioni, i dolori estremi, e tutte le cagioni irritanti le parti nervose, e membranose possono promuovere delle convulsioni: sonosene vedute con frequenza dopo l'operazione del *Sarcocoele*, e della castrazione, per non parlare delle *convulsioni sintomatiche* delle febbri, delle quali altrove ragioniammo.

Le *convulsioni*, e i *moti convulsivi* danno meno da temere nei fanciulli, che negli adulti, meno nelle femmine, che negli uomini. Questi due stati vengono talvolta terminati dall'emorragia, dalla profusione dell'orina, dall'uscita dei vermi, dal vomito, ec. Dicono dopo *Ippocrate* gli Autori tutti, che uno è salvo nel *tetanus*, se il paziente passa il quarto giorno: ma io ne ho veduti morire sul decimo, e sul decimoquinto di questo male: si fa buon presagio, secondo lo stesso Autore, della febbre, che sopravviene alle convulsioni; ma l'evento smentisce anche questa predizione. Ognun sa, che le *convulsioni* dell'una, e dell'altra specie, possono degenerare in epilessia, e in apoplessia, e che questa, come la paralizia deesi molto temere in un'età avanzata. Le *convulsioni*, che precedono il vajuolo, e gli altri morbi acuti, non sono così pericolose, come in altri tempi: quelle che sopravvengono alle grandi perdite di sangue, sono spesso mortali: nè si fa miglior giudizio della *convulsione degli occhi*, massime nei fanciulli. Lo *spasmo cinico*, sebben rarissimo è tenuto per mortale: meno ci dà da temere lo storcimento della bocca. Abbiain detto ciò, che dovevamo pensare degli *stiramenti dei tendini del collo del braccio*, che rile-

viamo sovente nelle febbri in toccando il polso . Ultimamente diremo, che i moti convulsivi danno incomparabilmente meno da temere nei mali cronici, che negli acuti ; e che ci fanno anche meno specie quei leggieri moti abituali , che fanno fare al viso certi scontrorimenti, e smorfie, e che eccitano dei brandimenti nelle altre parti, dei fremiti, ec. che non son considerati come malattia .

Dopo quello, che abbiamo esposto intorno alle cagioni evidenti delle convulsioni , ognun vede , che troppo ci rimarrebbe a fare , se volessimo riportar tutto l' osservato nei *cadaveri* , che vi può aver rapporto . Non parleremo adunque , se non se di ciò , che si è scoperto di più particolare nel *cervello* , e nella *midolla spinale* : nel primo sonosi veduti tutti i vasi strivati , ma di rado degli stravasamenti di sangue : sonovisi osservate comunissimamente delle inondazioni , massime nella base del cranio , nelle adiacenze della midolla allungata, e nel quarto ventricolo . Sonosi talvolta scoperti de' tumori , che avevano sede differente : assai di rado si è trovata dell' aridezza nel cervello, e ne' suoi involucri , ma non vi è stata cosa più ovvia della suppurazione o della putrefazione . Si crede d' aver osservato , che la midolla spinale fosse la sede delle convulsioni , che lasciavano libero il sentimento, e la parola : vi si sono trovati tutti gli sconcerti divisiati ; ma le inondazioni fra i suoi due involucri , sono i più comuni : ultimamente sonosi trovate le vertebre cariate . Di tutti gli esposti intacchi i più familiari sono, la suppurazione del diaframma ; le pietre dei reni, le crudesse acide nello stomaco, o nel duodeno, i vermi , ec. Abbiamo detto che in alcuni cadaveri continuava il priapismo ; ma si è osservato cosa più sorprendente , e questa è stata la frattura di varie ossa , che non hanno potuto resistere alle violenti scosse convulsive .

Pochi sono i *rimedj* , che possansi mettere in opera nel tempo del *parossismo* ; ed io ho assaissime volte osservato , che la pratica contraria era infruttuosa , o micidiale ; nulladimeno la maggior parte dei Pratici in quel tempo non risparmiano nè le cavate del sangue, nè gli emetici ; e la gente è tanto avvezza a questo metodo , che non mancherebbe d' accagionare di tutti gli eventi quel Medico , che avesse avuto il coraggio di non seguitarlo . Tuttavia io non dissimulerò, avervi delle cir-

costanze, che richieggiono questi gran rimedj; ma debbo aggiungere, che s'incontrano molto di rado. Si può far uso nel parossismo dei *clisterj purgativi*, e *stimolanti*, e di tutti i rimedj esterni, de' quali parlammo negli Articoli dell'apoplessia, e delle affezioni comatose: tali sono gli *sternutatorj*, l'odore dell'aceto, dello spirito volatile del sale ammoniaco, dell'*acqua di Lucia*, dell'olio di petriolo, della trementina, e d'altre sostanze fetide: le fregagioni al dorso, e alle gambe si praticeranno; le legature dolorose: i linimenti emollienti, e aromatici, applicati alla spina; le coperte a vento, e a taglio: l'immersione de' piedi nell'acqua calda, e altri bagni parziali per le convulsioni particolari, ec. Si può eziandio, se i pazienti possono inghiottire, amministrarne degli *antispasmodici*, come le goccioline Inglese, la tintura di castore, e di succino, l'acqua di fior d'arancio, ec. Sonosi pure veduti in questo caso ottimi effetti dall'acqua fredda bevuta in copia grande.

Allorchè è *dileguato l'accesso*, bisogna procurare d'impedirne il ritorno con i *rimedj appropriati* alle varie cagioni da noi riferite: imperciocchè si perderebbe allora l'opera propria, se non s'indirizzasse la medicatura verso il male, che eccita le convulsioni puramente sintomatiche. Quanto agli altri casi, che non riconoscono alcuna cagione passeggera, o accidentale, bisogna dar di mano ai rimedj, che appropriansi particolarmente alla melancolia. Le cavate di sangue comunemente sono indispensabili: non importa meno l'*evacuare le prime vie* con tutti i mezzi noti. Si fa uso a un tempo stesso degli *allentanti*, degli *umettanti*, dei *temperanti*, e degli *addolcenti*: le ptisane nitate, il brodo lungo di vitello, o di pollo, il siero, le emulsioni, ec. vi s'impiegano assai: gli *antispasmodici* non son meno adeguati nel parossismo, che fuori d'esso: i cefalici, e i carminativi son dell'istessa importanza: ma tutti i divisi rimedj non posseggono quell'efficacia, che uno crede: i più messi in opera sono la melissa, la salvia, e la bettonica: il fior di primavera, di tiglio, e di mughetto: la peonia, e la valeriana: il succino, il castore, e la polvere di gutteta, ec. Ricorresi in alcune circostanze agli *amari*, agli *assorbenti*, agli *antelmintici*, agli *aperienti*, ec. tali sono la China-china, la corallina, i centogambe, i marziali, ec. La *canfora*, e il *liquore anadino minerale*, sono i calmanti più dicevoli a

un tale stato; ma dannosissimi sono i *narcotici*, tuttochè alcuni Pratici non temano di unirgli agli antispasmodici. Il latte, e l'uso interno della *acque minerali*, sia fredde, che calde, ci danno efficacissimi ajuti. Si possono cavare altresì dei considerabili vantaggi dai bagni ordinarij, o dalle acque termali, tanto generali, che parziali, come da tutti i topici, dei quali abbiám già parlato. La mutazion d'aria, i viaggi, e il divertimento, producono talora effetti più sensibili di quelli, che risultano da tutti i rimedj indicati. Siamo accertati, che persone investite da gran tempo dalle convulsioni, dopo aver tutto provato, non se ne sono liberate, se non colla portare indosso una calamita ben armata: questo fatto, tuttochè singolare, non è verisimile; ma per lo meno suppone, che nel paziente non vi sia alcun vizio locale.

L' EPILESSIA.

E' noto, che quei tali, che ne sono colpiti, cadono *senza sentimento*, e *senza conoscenza* con orribili storcimenti, che seguono fino negli occhi: che hanno la *spuma alla bocca*, meffime sul terminar dell' accesso: gonfiassi loro il volto, e divengono paonazzi: s' ingrossa loro la lingua, e talora esce loro dalla bocca, esposta al taglio de' denti, che possono lacerarla, ed anche troncarla: la maggior parte fanno una specie di ruggito, o susfolamento, che può sentirsi da lontano: ve ne sono di quelli, che urlano, e si pestano percuotendosi: altri son fuor di loro, e dicono cose stravaganti, che da alcuni semplici, o birbanti sonosi vendute per segni d'indemoniamento: ve ne ha pure di quelli, che hanno delle visioni innanzi, o dopo il parossismo, che da alcuni tristi sono state vendute care a lor prò: i giovani hanno spesso dell' erezioni, seguite da effusion femminile: scagliano anche l'orina loro ad una gran distanza, e colla stessa prontezza scaricano il ventre. Questi affalti, che alcuna volta son doppij, son terminati da una specie di letargo, oppure lasciano un peso grande alla testa: taluni per più ore restano mentecatti: altri rimangono intorpiditi; ma tutti provano una grande stanchezza.

Il ritorno dei parossismi è il più delle volte soggetto a periodi molto regolari, come d'un anno, d'un mese, d'una settimana, d'uno, o di più giorni, od anche d'alcune ore: ve ne sono di quelli, che seguono
eliat-

esattamente le fasi della Luna, e non è senza ragione, che gli Antichi chiamassero *lunatici* questi pazienti. La durata degli accessi varia altresì infinitamente: la più ordinaria è dal quarto d'ora fino a una, e a due ore: se ne sono veduti durare uno, e anche più giorni intieri. Alcuni pazienti hanno degli *avvenimenti*, de' quali profittano per difendersi dalla caduta: tali sono una gravezza di testa, degli abbagliamenti, o delle scintille negli occhi: il tintinno delle orecchia, la palpitazione, il gonfiamento della regione epigastrica, romoreggiamenti di ventre, il freddo alle estremità, ec. Parecchi provano altresì una sensazione in alcune parti delle estremità, la quale, montando alla testa, dà loro talvolta il tempo di coricarsi per terra per ischivare la contusione. Si pretende d'averne veduti di quelli, che conservavano il sentimento, e la cognizione; ma costoro eran eglino veramente epilettici? Poichè se alcuna cosa può distinguere l'epilessia dalle altre convulsioni, si è la perdita dell'uno, e dell'altra: e questa riflessione può servire per iscuoprir l'impostura di tanti vagabondi, che hanno l'arte di contraffar questo morbo. Nulladimeno è malagevolissimo l'assegnare all'epilessia un *carattere distintivo*: non ricaviamo sopra questo punto alcun lume da quella prodigiosa quantità di Libri scritti sopra tal materia: ed è anche facile il rilevare, che quasi tutti i nostri Scrittori hanno bene spesso confuso l'epilessia colle altre convulsioni. Tale osservazione non è sfuggita al *Boerhaave*; ma non ci ha insegnato schivarne l'errore. Tuttavia pare, che sia lecito il domandare, se è cosa certa, che l'epilessia abbia un diverso carattere? L'osservazioni anatomiche non lo provano: le cagioni evidenti, che producono questi morbi, sembrano le medesime; nè si fa vedere gran differenza nella medicatura, che si è applicata con maggior riuscita agli uni, e agli altri, per non far parola delle loro conseguenze, che molto si somigliano.

I fanciulli, e i giovani, i *cachetici*, e i *melancolici* sono i più *sottoposti all'epilessia*: i vecchi ne sono al coperto, qualora non l'abbiano contratta in gioventù. Dalle osservazioni pare, che le donne, massime nella lor gravidanza, o nelle conseguenze di quella, ne sieno investite con frequenza; ma, siccome abbiamo detto, l'istericismo se le assomiglia grandemente. Tutte le passioni veementi, e singolarmente le grandi *paura*, pos-

son

son precipitare nell'epilessia: può altresì nascere dalla soverchia lubricità, ed effusion femminile troppo frequente. L'*idiopatica* riconosce un vizio locale, del quale difficile si è assegnar la cagione: la rogna, e le altre fioriture cutanee tornate indietro, le ulcere vecchie riscaldate le febbri intermittenti mal medicate, ec possono spianarvi la strada. La *sintomatica* dipende il più delle volte dal reo stato delle prime vie: la medesima può anche nascere da seme ritenuto, sì nell'uno, che nell'altro sesso, dal troncamento dei menstrui, e da qualunque altro vizio della matrice; dalla densificazione, e dai vermi nei fanciulli, da contusioni, da piaghe, da fratture, da carie, e da altre cagioni, che accennammo nel precedente Articolo, che ha moltissima affinità col presente. L'*epilessia dei bambini* nell'uno, e nell'altro sesso, termina per lo più nella pubertà: si è osservato, che la medesima dura sette mesi, o sett'anni; ma io non entro mallevadore di tale osservazione: gli adulti portala d'ordinario per tutta la vita loro. Tanto più *pericolosa*, si è l'epilessia, quanto più da presso si seguono gli *accessi*: l'ereditaria è di *raducurabile*: quella che riconosce un vizio locale nel cervello, non lo è mai: la sintomatica per lo contrario, si cura con somma facilità: quei, che guariscono dell'epilessia, passano con molta frequenza in uno stato somigliantissimo a quello dell'apoplessia: ne sono perfino seguite delle paralisie: conciossiachè tutti quelli, che divengono come apopletici, non muojono: ve ne sono di quelli, che cadono in sincopi, che appena lasciano segno menomo di vita, nè si può dubitare, che ne sieno stati sepolti alcuni vivi. Quei, che si rianno da tali sorte d'attacchi, restano bene spesso stupidi, o maniaci: si è più fiate osservato, che la febbre quartana, e parecchie altre grandi infermità, avevano liberato i pazienti per sempre dall'epilessia.

L'*apertura de' cadaveri* ci fanno vedere, oltre la conformazione viziosa del cranio, e delle suture, delle punte ossee, fisse, o mobili, attinenti alla cassa ossea, e che potevan pungere la dura madre: tumori della natura medesima, che la comprimevano: delle ossificazioni affai frequenti in alcuna parte di questo involuppo, della falce, e della tenda del cerebello, le cui punte irregolari, e sporgenti in fuori, potevano ferire la pia madre, e il cervello: delle pustole nella dura madre:

i lobi anteriori del cervello duri, e callosi, incollati alle meningi. Sonosi anche trovati nelle giugulari, nei seni, e negli altri vasi, dei considerabili stivamenti, ovvero delle concrezioni polipose, e nelle loro ramificazioni una mucilagine tartarosa, che gli ostruiva. Sonosi pure veduti degli stravasamenti di sangue, non meno nei ventricoli, che nella propria sostanza del cervello: il plesso coroide varicoso, e gremito d' idatidi: le inondazioni in tutte le parti del cervello, e della spinal midolla, sono comunissime: si è di vantaggio osservata nei ventricoli una sanie fetida, una spezie di bava icorosa, molto simile a quella, ch' era alla bocca, oppure una materia untuosa, che sozzava queste cavità: si è alcuna volta trovata una sostanza gelatinosa sotto la dura madre, per non parlare dei tumori molli, delle suppurazioni, e putrefazioni, che sonosi incontrate in varie parti della stessa viscera. Finalmente si è veduto del Mercurio scorrente entro il cervello, non solo di coloro, che ne avevano fatto uso, ma eziandio d' alcuni Artefici, che maneggiano frequentemente questo minerale, o che sono esposti ai suoi vapori. Credo soverchio il far parola di varj sconcerti, che sonosi osservati, sì nel petto, che nel basso ventre, e alle estremità: ma mi fermerò soltanto sopra una rilevantissima osservazione appartenente a queste ultime. Abbiamo detto quì innanzi, che il parossismo in molti epilettici cominciava dalle dita dei piedi, e delle mani, da qualche altra parte del braccio, o della gamba in quel punto medesimo, che ci avevano benissimo i pazienti accennato, sonosi appunto scoperte delle *nodosità*, o qualsivoglia altro vizio occulto, che intaccava i nervi: sonosene perfino risanati alcuni con investire colla cura chirurgica questa cagione, o tagliando il nervo; lo che richiede somma attenzione, perchè il caso è assai comune.

Le *cavate del sangue*, e l' *emetico*, rimedj usati con tanto ardimento frequentemente nell' *attacco epilettico*, possono avere pessime conseguenze, o almeno almeno sono inutili. Per me credo cosa più prudente il lasciare in quiete i pazienti, e di provvedere unicamente alla lor sicurezza. Se la cavata del sangue fa talvolta cessare le convulsioni, rende però il male medesimo più ostinato, a tal proposito possiamo riprodurre l' osservazione, che un Medico, non so di qual Paese, ebbe l' ardire di far inferire nei fogli periodici, risguardante un epi-

epilettico, o una isterica, alla quale fu cavato sangue in un anno quattromila volte. Tuttavia dannosi dei casi, nei quali sembra permesso l'aprir la vena: io intendo di dire, quando vi è una manifesta plethora, od un troncamento d'alcuno sgorgo abituale di sangue: questo è anzi uno de' mezzi d'impedire una rottura dei vasi: effetto, sebben rarissimo, delle veementi convulsioni. Si può altresì intraprendere d'eccitare il vomito, allorchè lo voglia assolutamente il noto stato delle prime vie; ma bisogna sapere, come l'emetico, per quanto venga indicato in questa occasione, per accidente può riuscire perniciosissimo, spingendo il sangue alla volta del cervello, per quante cavate di sangue sienosi fatte per diminuire lo stivamento dei vasi: le *fregagioni* alla schiena, e alle gambe: i *clisteri* purgativi, e stimolanti possono applicarsi senza pericolo. Per quella specie d'epilessia, che principia da alcuna estremità, una *legatura* sopra il punto sensibile può fermare il parossismo: è stata questa praticata più volte con riuscita. Gli *sternutatori* sono pericolosi per la maggior parte degli epilettici; e siccome è malagevolissimo il farne la distinzione, così è sempre cosa più prudente l'astenersene. Gli odori forti, e disgustosi, che giovano alle altre convulsioni, pare, che non s'adattino a questa, contro la quale sonosi indarno tentati cotanti rimedj, che siamo stati costretti a bandirgli tutti; e questo è ciò, che si pratica quasi universalmente nel tempo del parossismo.

Adunque un tal morbo deesi investire nella calma, o sia nell' *intervallo* degli accessi: i mezzi più stabiliti dalla esperienza, son poco diversi da quelli, che abbiamo proposto nell'Articolo precedente. Il cavar sangue dal piede, dalla giugulare, ec. è quasi sempre necessario. L'emetico, e i purganti sono indispensabili nel principio della cura: è anche necessario il reiterare talvolta i secondi, massime trovandosi nelle prime vie delle crudesse acide, o dei vermi. Gli *allentanti*, i *temperanti*, gli *umettanti*, ec. son necessarij in tutti i tempi: la *dietà bianca*, ch'è la prima fra questi rimedj, ha felicemente risanato molti pazienti, che avevano indarno provato gli altri tutti: le *acque minerali fredde*, sì acidule, che ferrate, sono state di pari amministrate con molta riuscita. Non hanno a un gran pezzo prodotto di buoni effetti gli *anti-epilettici* più famosi: nulladimeno debbon esser messi in opera, dopo d'aver fatto pre-

cedere delle buone evacuazioni, e molto innaffiamento. Ognun sa, che la peonia, la valeriana silvestre, il vischio di quercia, la China-china, il cinabro antimoniale, la polvere di gutteta, ec. sono i più familiarmente praticati; ma dopo l'esposizione delle cagioni conosciute dell'epilessia, e delle osservazioni anatomiche, che vi han rapporto, non rileva, ch'io dica ciò, che si debba pensare di questi pretesi specifici. I *cefalici* sommamente a questi analoghi, i *sudorifici*, gli *amari*, e gli *assorbenti*, gli *aperienti*, i *marziali*, gli *antiscorbutici*, ec. hanno pur luogo in questa medicatura: si fa altresì grand'uso dell'*etiope minerale*, del *Mercurio dolce*, ec. sono eziandio curati degli epilettici colla salivazion mercuriale; di più è stato proposto il *sapone*, la *magnesia*, i *fiori di sale ammoniaco*, ec. Non debbonsi trascurare i rimedj estremi: si può ritrarre gran vantaggio dalla docciatura delle *acque termali* alla testa, dell'applicazione delle *mignatte* ai vasi emorroidali, delle *coppette a taglio*, dei *vescicanti*, dei *setoni*, e dei *cauterj*: sono veduti dei buoni effetti dal cauterio attuale applicato in cima alla testa. Ha sovente risanato dall'epilessia il mutar aria, e paese; è stata dileguata viaggiando in mare, ec. Ultimamente un governo bene inteso è talora più efficace contro questo morbo, di tutto l'ampio apparato dei rimedj praticati. Non fo parola del mercurio rinchiuso in una ghiandina, e d'infiniti altri amuleti, che possono esser renduti salutari dal solo grado di fidanza, che dannovi i pazienti.

SEZIONE III.

Malattie interne del Petto.

LA RAUCEDINE.

SOno due spezie; una, che ha la sua sede nella gola, e che chiamasi *raucedo*, raucedine; l'altra, che occupa la laringe, e la trachea arteria, indicataci dagli Autori sotto la denominazione di *branchus*: la prima, che può dirsi *raucedine gutturale*, tanto familiare nell'*infreddature* ordinarie, è ancora un sintoma d'altre varie infermità, come della tifichezza, della vomica,

mica, della tabe, dello scorbuto, del malfrancesco, della soppressione de' menstrui, dei vermi, ec. Un urto d'aria, il ber gelato, il canto, le grida, ec. bene spesso la producono. La seconda, che può denominarsi *raucedine della trachea*, par, che sia d'altra natura, tuttochè uniscansi con frequenza insieme: dipende questa da una materia muccosa, la quale intonaca i canali respiratori, che si rende, non per mezzo della tosse, ma per una specie di rantolo volontario, che non incomoda, se non a motivo della sua durata. Le persone timide, quei, che parlano con affettazione, o che declamano in pubblico, vi sono grandemente soggetti: ma i cachetici, ed i vecchi chi più di qualsivoglia altra persona: le cagioni della raucedine gutturale sono altresì comuni a questa, la quale può anche esser promossa da quell'acre, che lascia la frittura, l'olio, il burro, e sì fatte materie rancide. La raucedine d' ambe le specie, che nasce da un acciamento passeggero, non dà da temere, benchè possa continuare per più mesi: ma diversamente avviene di quella, che riconosce una cagione interna, e soprattutto se è invecchiata. Il *Branco* è sommamente inquietante per i vecchi, e può degenerare in asma, ovvero in soffogamento. Si crede ancora, che talvolta degeneri in catarro soffogativo.

Si è veduta nei *cadaveri* l'interna faccia della laringe, e della trachea arteria inondata, infimmata, esulcerata, secca, arida, e cancrenosa, le cartilagini calcariate, delle concrezioni cretacee, delle escrescenze polipose, ec. Si è trovato il polmone scirroso, pieno di tubercoli, esulcerato, o con degli abscessi: ultimamente sonosi rilevati gli sconcerti stessi, sebben più di rado, nel timo; per non far parola delle ulcere nella bocca, e di parecchi altri vizj, che non dipendono dalle anatomiche inspezioni.

Si praticano per questo male rimedj, che son propri per la tosse, per reuma, per la tifichezza, ec. La *cavata del sangue* non è dicevole; ma questa regola generale può avere le sue eccezioni. Vantaggioso è talora l'uso moderato dei *rilascenti*: ma gli *alientanti*, gli *addolcenti*, i *bechici*, e i *temperanti*, sono i rimedj, dai quali ci dobbiamo promettere gli effetti migliori: i più messi in opera sono il latte, il siero, i farinosi, il miele, il seme di rappa, le giuggiole, i spermaceti, ec. Per la raucedine invecchiata forz'

ricor-

ricorrere ai *bechici incisivi*, e *vulnerarij*: tali sono la veronica, l'isopo, la goma adragante, lo sciroppo d'erisimo, il balsamo di zolto, ec. Lo Spirito di sale ammoniacco è talvolta riuscito per i vecchi: ma in altre occasioni si è fatto uso dei *sudorifici*, e degli *antiscorbutici* con molto vantaggio: imperciocchè si pensa bene, che quando la raucedine è il sintoma del celtico, dello scorbutico, della tifichezza, ec. siccome spessissimo accade, si dee sottometerla alla medicatura di questi morbi: finalmente sonosi più, e più volte veduti degli effetti maravigliosi dal *setone*, e dal *cauterio*.

L A T O S S E.

Ognun sa, che il reuma, la peripneumonia, la tifichezza, l'idropisia, ed altri mali del petto, eccitano la *tosse*; ma tutti non fanno, che la medesima può anche dipendere dal solo irritamento della laringe, o della glottide; dall'infiammazion della pleura, del diaframma, e del fegato, da crudelzze d'ogni genere, che sozzino lo stomaco, ed anche da imbarazzi del duodeno. Se la tosse riconosce un semplice irritamento della laringe, e dei bronchi, la flogosi della pleura, e delle parti adiacenti, il reo stato dello stomaco, e delle altre viscere del basso ventre, ella è d'ordinario secca; ma quella, ch'è cagionata da una pituita, o da un moccio fisso, dal sangue, dalla marcia, da tubercoli, da pietre, e da ossa, che intaccano i bronchi, o il polmone, è accompagnata da sputi, che portan seco la maggior parte di queste materie. La *tosse* violenta, che addimandansi convulsiva, quasi catarrale, o d'altra natura, ha dei parossismi più, o meno frequenti: questi sono talora così violenti, che fanno divenir la faccia paonazza, o nericcia, ed il paziente corre rischio di soffogarsi: la medesima può eccitare il sangue dal naso, il vomito, lo scolo involontario dell'orina, l'uscita degli escrementi, l'aborto, varie sorte d'ernie, ec. Quando la tosse viene per quinta, si chiama *mal di castrone*, e questa è sovente epidemica. In alcune epidemie sonosi compiacciuti di chiamar *folletto* la tosse catarrale, non che dipende unicamente dal genio, o capriccio di chi la medica.

La tosse catarrale vien d'ordinario preceduta da abbreviamento, da gravezza di capo, da mal di gola, e raucedine: nel principio si spurga poco, ma indi a

pochi giorni gli sputi s'inspessiscono, e divengono più, o meno copiosi: la febbre, che per lo più l'accompagna, è annunziata dal brivido, e nella sua carriera ha degli esacerbamenti verso la sera. La *febbre catarrale* è talvolta epidemica, e somminamente pericolosa: ella prende con frequenza l'aspetto della peripneumonia, e della febbre maligna: quando è leggiera, non dura che due, o tre giorni; ma quando comparisce con più violenza, non termina se non verso il settimo giorno, e arriva anche fino al decimoquarto. Se passa questi limiti, dee temersi la febbre lenta: i pazienti provano dolori di capo, nella schiena, e nelle gambe, delle oppressioni, delle ansietà, degli svenimenti, ec. Certuni hanno delle tacche porporine, delle fioriture miliari, dei copiosi sudori ec.

La *tosse stomacale*, il cui carattere burla moltissimi Medici, si manifesta per mezzo della bocca cattiva della cardiaglia, o del dolore alla fossa del cuore; pel disgusto, per le nausee, e pel vomito: per la gravezza, e alcuna volta pel gonfiamento dello stomaco. Questa specie di tosse è d'ordinario secca, ed inquieta viemaggiormente dopo il cibo; bene spesso è violenta, e accompagnata dalla febbre: i fanciulli, gl'ipocondriaci, ed i vecchi, vi sono soggetti.

La *tosse gutturale*, che è sovente cronica, si distingue dalle altre per una sensazione manifesta, che i pazienti provano nella bocca, e nelle vicinanze della glottide, come altresì per la lontananza di tutti i segni divisati. Importa anche il saperse, la tosse essere con frequenza il sintoma delle affezioni ipocondriache, isteriche, scorbutiche, e scrofolose, artritiche, e reumatiche: può trovare eziandio la sua cagione nella repulsione della rogna, e d'altri mali cutanei, nel disseccamento d'ulceri invecchiate, ec. Si sa, che può essere la conseguenza della rosolia, e del vajuolo, nel quale ella è anche il sintoma; di pari che della dentificazione, e dei vermi nei fanciulli; per non parlare delle piaghe della caduta d'algun corpo eterogeneo nella laringe, del fumo, dei vapori minerali, e somiglianti.

La *tosse catarrale* semplice è poco da temersi, anche per i vecchi, i quali tossono abitualmente, e che non debbon temere, se non se il cessamento di quella; ma la *febbre catarrale* epidemica è sovente micidiale, senza distinzione d'età, non meno per gli stivamenti infiammatori;

fiatorj , ai quali spiana la strada , che per i più gravi sintomi , cui ella eccita ; e questo è appunto quello , che la fa prendere per una febbre maligna ; ma ella non ne ha , nè il carattere ; nè la carriera ; terminando , siccome abbiamo detto , al più al più nel decimoquarto giorno : le orine , che depongono , ed i sudori , sono , in questo male , di buono augurio : degenera , talvolta in tosse abituale , o a motivo d'una cura malintesa , o per la rea costituzione del soggetto . La *tosse violenta* , o convulsiva può produrre un arresto di sangue nella testa , e cagionare un apoplezia , o una paralizia , siccome alcuna volta abbiamo veduto accadere ; per non parlare dello sputo di sangue , dell' aborto , delle ernie , e d'altri accidenti , dei quali abbiamo fatto menzione . La tosse secca , e abituale annunzia perpetuamente alcuno sconcerto nel polmone , o degli stivamenti scirrofi nelle altre viscere ; ella degenera in tifichezza , in asma secca , e somiglianti .

Coll' *apertura dei cadaveri* sonosi trovati i bronchj fozzati d'una materia collofa , delle adesioni del polmone , con tutte le parti , che lo circondano . questa stessa viscera gonfiata , e edematosa , intornata d'una crosta gelatinosa , e talvolta disseccata : i suoi vasi stivati , e varicosi : vi si sono veduti anche degli scirri , dei tubercoli , dei tumori infaccati , degli abscessi , delle ulcere , degl' infiltramenti purulenti , delle putrefazioni , la cancrena , delle pietre , delle ossa , ec. La pleura , e le sue produzioni sono comparse infiammate , e cancrenose : sonosi anche incontrati degli stravasamenti serosi , saniosi , e purulenti , tanto nella capacità del petto , che nel mediastino , e nel pericardio : si è scoperta ancora la superficie del cuore esulcerata : sonosi oltre a ciò osservati degli stivamenti infiammatorj , o scirrofi nel fegato , nel pancreas , e nella milza , la pienezza dei vasi biliari , ec. Ultimamente si è veduto lo stomaco fozzato di crudesse d'ogni generazione , o da un fango purulento , con delle tacche cancrenose , di pari che negli intestini , ec.

Nella *tosse* e nella *febbre catarrale* semplici , poco o nulla si dee operare , e le persone più sagge aspettano la guarigione dal tempo , e dalla natura , senza però trascurar la dieta , e il caldo . Quando il male è più grave , siamo d'ordinario forzati a ricorrere alle *cavate del sangue* : questo è il consiglio del Sydenham ; ma que-

ste non s' addicono a tutte le epidemie, le quali ci fanno vedere, per rapporto a questo ajuto, delle stravaganze, delle quali non potremmo render ragione. Gli *allentanti*, gli *addolcenti*, e i *bechici*, sono i rimedj con più familiarità praticati in tutti i divisati casi: tali sono la rigolizia, i capillari, il piè di gatto, le giugiole, il seme di rape, il cavolo rosso, l'olio di mandorla dolce, li spermaceti, il latte di pollo, le tavolette di malva, lo zucchero d'orzo; il latte, il siero, il miele, le creme d'orzo, di riso, ec. I *purganti* sono così improprij, come le cavate di sangue, e non fanno bene, che nel declinare del male; e debbonsi dare con circospezione negli altri tempi, poichè si è più volte osservato, che hanno troncato gli sputi, e aperta la strada ad oppressioni pericolosissime, per quanto se ne dica il *Riviera*, ed alcuni altri Pratici, che ne facevano uso troppo familiare: tuttavia ci si offrono dei casi, che vogliono nel principio l'*emetico* nella stessa guisa, che vien praticato nella maggior parte delle febbri acute; soprattutto rendesi necessario a questa febbre fantastica, che chiamasi *mal di castrone*: a questo caso sembra dicevole più che ogn' altro l'*ipecacuana*; ma si amministra anche il *Kermes minerale*, come vomitivo insieme, e come alterante. I *leggieri diaforetici*, come il decoto di papavero erratico, ed il brodo bianco convengono anche alla tosse catarrale: si è anche veduto in alcune epidemie operar maraviglie dalla triaca, dal Kermes universale, e da altri fortificanti, e cordiali. Lo zafferanno, il laudano, la tintura anodina, lo sciroppo di papavero bianco, e di Karabè, le pillole di cinoglossa, ed altri calmanti, e ipnotici, amministrati con prudenza, fanno gran bene in questa infermità; ma tutti non fanno farne una buona, e adeguata applicazione.

La *tosse stomacale*, che abbiamo detto essere familiare ai fanciulli, agl' ipocondriaci, ed ai vecchi, vuole i vomitivi, e altri evacuanti: i *fortificanti stomachici*, e gli *assorbenti*, come gli anaci, il curiandolo, il cachou, la triaca, la confezione di giacinto, l'opiatà di Salomone, producono in questo caso ottimi effetti: vi s'impiega anche con riuscita il Kermes minerale; ma gli addolcenti, e i bechici, tanto proficui negli altri casi, in questo non giovano. La *tosse cronica* richiede altri ajuti tali sono i *bechici*, sì vulnerarj, che incisivi, fra i qua-

quali bisogna distinguere il fiore di belzoino, il balsamo di zolfo, quello del Lucattello, ec. I *suaorifici*, come il guajaco, la cina, e la sassapariglia, l'anti-ettico del Poterio, l'antimonio diaforetico, e la polvere dei Centofini, talvolta vi fanno gran bene, di pari che i *diuretici*, gli *aperienti*, e i *depuranti*, fra i quali i più adoperati sono i centogambe, l'Iride di Firenze, l'offimele di scille, l'etiope minerale, ec. Si fa gran conto in simiglianti occasioni dell'*acque* di Bonnes, di quelle di Granillac, di Bagneres, di Monte d'oro, di Seltz, ec. Il latte, e gli altri *adulcenti* sono ancora di gran momento, come altresì il mutar aria, l'esercizio a cavallo, ec. Ci vien riferito, che una tosse abituale, che aveva fatto testa a tutto, fu guarita coll'aria fredda: questa singolar guarigione può dar grandi lumi. Sono si veduti dei buoni effetti dei *vescicanti*, e da altri sgorghi artificiali, massime nei fanciulli, e in coloro, che per innanzi avevano sofferto alcun male cutaneo: finalmente è soverchio il dire, che fa di mestieri l'indirizzar sempre la medicatura verso la malattia principale, di cui la tosse è il sintoma, e la conseguenza.

CATARRO SOFFOGATIVO.

Trovansi poche veraci osservazioni intorno a questo morbo, ma molte opinioni; di modo che sarebbe difficile il non ismarrirsi, se si prendessero per iscorta gli Scrittori. Molti si son fatti a credere, che fosse un istantaneo stivamento del polmone; e in fatti da una tale idea si è cavata questa denominazione: la medesima è giusta rispetto ai fanciulli, ed ai vecchi, facendone fede le sezioni anatomiche; ma è falsissima rispetto alle altre età, alle quali è stata di pari applicata. Sarebbe un abusarsi dei termini, il considerare come *catarro soffogativo* l'ultimo stato della maggior parte dei mali del polmone, de' quali lo stivamento è il prodotto. Certuni hanno voluto considerare il cuore, come la sua sede principale, e per tal ragione hannolo denominato *Sincope cardiaca*; ma hanno costoro confuso questi due morbi senza fondamento. Ve ne sono fra gl'illuminati di quelli, che hanno riferito il catarro, di cui parliamo, ad un violento irritamento della laringe, preceduto da un'istantanea ruocaggine, e seguito da un soffogamento, che porta via in brev'ora i pazienti; se ciò fosse, assomiglierebbersi a quella spe-

zfe d'angina, che non è accompagnata da alcun tumore, nè interno, nè esterno; ma diciam meglio; ella si è la stessa infermità da alcuni appellata *angina*, e da altri *catarro soffogativo*, tuttochè l'attacco sempre inaspettato, e subitaneo di questo secondo, debba servire per distinguerlo dall'altra infermità. Talora è stato preso il parossismo dell'*asma convulsiva* per catarro soffogativo; ma il primo è un male cronico, ed il secondo dee esser considerato come uno dei più acuti. Uno s'inganna anche spesso col prendere il catarro soffogativo per l'apoplessia; ma nel primo l'oppressione precede sempre la perdita del sentimento; dove nell'apoplessia il paziente perde il conoscimento, prima che il petto si stivi.

Da ciò, che abbiamo esposto, ne viene, che è stato dato il nome di catarro soffogativo a varie sorte di mali, che appartengono ad altre classi. Nulladimeno ve ne sono due, che a mala pena hanno infra se rapporto, per i quali nuno forzari a adottarlo, per non introdurre termini nuovi nella nomenclatura dei morbi. Uno dipende dal *costringimento della giugide*, e l'altro dallo *irritamento dei bronchi*. Il primo investe talora quelli, i quali per fatica, ec. trovandosi riscaldati, si espongono imprudentemente all'aria fredda; le flussioni catarali abituali vi dispongono, di pari che la vita sedentaria, l'estrema grassezza, lo stravizzo del vino, ec. abbiamo detto, che i fanciulli, e i vecchi erano inclinati al secondo. L'uno, e l'altro male ha più gradi, i più leggieri dei quali non lasciano di farci temere: in tutt'e due si ha un brusco soffogamento accompagnato da fischiamento e da rantolo, e con frequenza da perdita di conoscimento: nella *prima specie* i pazienti si lagnano d'un irritamento, e d'uno strangolamento alla laringe, somigliante a quello, che potrebb'essere cagionato da alcuna porzione d'alimento, che fosse caduta nella sua cavità: nella *seconda specie* non si prova tal sensazione; ma un peso sul petto, che priva in brev'ora del conoscimento, lo che dura di più nel primo caso.

Quelle due specie di catarro soffogativo d'ordinario non durano più di poche ore, e sono quasi sempre mortali, massime quello ch'è prodotto da stivamento, poichè non vi è refugio se non se nella spettorazione, renduta quasi impossibile dalla debolezza dei fanciulli, e dalla siveolezza dei vecchi. Siffatti mali son più comuni
di

di quello altri si faccia a credere; ma difficilmente i Medici posson vederli, avvegnachè i pazienti vi rimangano oppressi prima che s'abbia tempo di chiamargli; oltre di che investono per lo più sulla mezza notte, circostanza, che toglie agli infermi d'ordinario ogni soccorso.

Le osservazioni anatomiche poste sotto questo titolo, sono più atte a precipitarci nell'errore, che a liberarcene, a motivo dei varj equivoci presi dagli Autori, i quali hanno preso de' suffogamenti isterici, de' mali del cuore, e del cervello, per catarrhi suffogativi. Non mi sono imbattuto, che in un solo caso della prima specie, ch'io possa giudicare con qualche certezza, appartenere alla malattia, di cui parliamo, qualora possa fidarmi della relazione fattamente da varj domestici, che videro ciò, che avvenne in quella notte. Trovai ventricoli del cuore, e singolarmente il primo, e i vasi grossi prodigiosamente stivati; non vidi cosa alcuna d'osservabile nè nella laringe, nè nella glottide, tuttochè s'argomentasse dai segni, che aveva fatto il paziente, non potendo parlare, che queste parti erano state la sede del male, di cui lo stivamento del cuore, e dei vasi non fosse stato verisimilmente, che il solo prodotto: aggiungerò, che il soggetto, di cui si tratta, era sommamente pingue, e che con molte cure, ed affari, che aveva, non faceva quasi niente d'esercizio. Mi è toccato più volte d'osservare la seconda specie, sì nei fanciulli, che nei vecchi, che ne erano morti in tronco: ho veduto nei loro cadaveri i bronchi, e anche la trachea-arteria pieni zeppi d'una materia mucosa, più o meno fissa, che ostruiva la maggior parte dei canali a un segno, che era quasi impossibile colà entro l'accesso dell'aria.

Non vi è dubbio, che le numerose cavate di sangue non si addicano al catarro suffogativo, che investe la glottide: l'emetico può avervi luogo, dopo che sonosi ben vuotati i vasi; ma senza una tal precauzione precipita i pazienti. Sarebbero manco da temere i purganti, se il poco tempo, che dà un male sì impetuoso, ci permettesse l'amministrargli: la cavata del sangue per la seconda specie è talora indispensabile, ma non si può moltiplicarla a talento: l'emetico, ed i purganti, nei quali entra il *Kermes minerale*, sono i più appropriati: ma è talvolta pericoloso il servirsene. I clisteri stimolanti son

proficui in tutt'e due i casi, di pari che le *coppette* di *raglio*, i *vescicanti*, i *sinapismi*, le *fregagioni*, le *legature* alle estremità, ec. Dopo il Parossismo d' ambe le specie, coll' intenzione d' impedirne il ritorno, amministransi i *becichi*, sì addolcenti, che incisivi: i *diuretici* ed i *diaforetici*, gli *antiasmatici*, e singolarmente il bianco di balena, la gomma ammoniacca, la terra sfogliata di tartaro, il sugo di ravanello, il sale di succinaccio, lo spirito volatile di corno di cervo, e del sale ammoniacco, ec. Ecco ciò che ho potuto rilevare fra la confusione, che regna in quasi tutto quello, che è stato scritto intorno a tal materia, e da alcune osservazioni comunicatemi, o finalmente da ciò, che ho avuta occasione di vedere io stesso. Sento ancora da alcune ottime relazioni, che un *cauterio* aperto è acconcissimo a dilungare il catarro soffogativo; ma un tale ajuto non può riguardare, che un secondo attacco.

INFIAMMAZIONE DEL PETTO.

Gli Autori hanno parlato con poca chiarezza anche della *peripneumonia*, e della *pleuritide*; e la maggior parte dei Pratici pare, che non vi facciano distinzione come quelli, che s'immaginano di medicare ogni giorno la vera *pleuritide*, che è tuttavia una rarissima infermità, qualora dobbiamo credere all' ispezione anatomica, la qual sola può decidere una tal questione. Sopra un grandissimo numero di soggetti morti dall' infiammazione del petto, se mal non mi sovviene, io non ne ho trovati che due, che fossero stati investiti dalla vera *pleuritide*. Non è già, che nell' infiammazione, la quale investe le parti esterne del polmone, la *pleura* non rimanga sovente alterata; ma, senza far abuso dei termini, non si potrebbe denominar *pleuritide* tale accidente, che nasce dal semplice contagio. Si è anche fatto, come dicemmo, un male particolare della *flogosi*, che occupa quella porzione della *pleura*, la quale cuopre il diaframma; e a motivo del delirio, che l'accompagna, si è collocato fra i mali della testa, sotto il nome di *parafrenitide*, tuttochè non differisca in alcun modo dalla vera *pleuritide*, la quale di pari che l' infiammazione del mediastino, può ugualmente eccitare il delirio.

I brividi, fa febbre, il dolore d' ambi i lati, ma con più frequenza del manco, dello sterno, della schiena, ec.

ec. gli sputi sanguigni, e lo stento in respirare, caratterizzano molto bene la peripneumonia: tuttavia lo sputo sanguigno non le è essenziale, mentre alcuni infermi ne sono esenti; e questo male è quello, che è piaciuto al Sydenham di chiamare *peripneumonia spuria* (*pseudoperipneumonia*); ma noi vedremo nel seguente Articolo, come tal denominazione s'adatta meglio a un'altra infermità di carattere assai diverso. La tosse, il dolore, e la difficoltà del respiro, possono pur non trovarsi insieme coll'infiammazione del polmone: ione vidi molti esempli nell'epidemia, che dominò l'anno 1754. ed importa molto l'essere al fatto di ciò: la *peripneumonia* è talora preceduta dalla colica, dall'angina, e da ogn'altro morbo infiammatorio. Il Lomnio, e il Boerhaave, dopo Ippocrate, e Galeno, hanno parlato della *resipola del polmone*: ma questa è un'opinione, che hanno prodotto senza prova: la *resipola* è una specie d'infiammazione, che appartiene alla sola cute: è ben vero, che la materia, dalla quale è prodotta, può gettarsi sul polmone, come sopra le altre viscere; ma il male, che ne risulta, non ha il menomo carattere di *resipola*. Nella *pleuritide*, e nella *parafrenitide*, non vi ha alcuno sputo sanguigno, eppure la violenza della tosse può cagionare questo accidente: il delirio è quasi inteparabile da ambi questi morbi: il dolore, la cui sede varia, quanto nella *peripneumonia*, è dei più acuti: il respiro è sommamente inceppato, e interrotto dalla veemenza del dolore: il polso è duro: la bocca arida; ed hannosi per lo più delle irregolari abbreviature: si crede, che ne sia la sede il diaframma, a motivo dei rutti, del vomito, della cardialgia, delle ansietà, del singhiozzo, ec. L'*infiammazione del cuore*, e del *pericardio* eccita a un di presso gli stessi sintomi; ma non abbiamo alcun segno certo, che possa farla distinguere da quella del *mediastino*, e del *diaframma*. Il sangue, che si cava in tutte le divise infermità infiammatorie, è d'ordinario sozzo, e coagulato, massime dopo la prima, o la seconda cavata.

Tutte le infiammazioni del petto, o sieno accompagnate da sputi sanguigni, o no, possono terminare colla risoluzione in tre, o in quattro giorni: la durata della febbre, del dolore, e degli altri accidenti, dopo un tal tempo, non lasciano alcun dubbio intorno alla suppurazione, e lo scivamento scirroso; arrivano que-

sse, quando son gravi, fino al decimoquarto, ed anche fino al ventesimo, e più in là. Seguono ancora nelle infiammazioni del petto, come in tutte le altre, delle più, o meno ree metastasi, relativamente alla parte, che ne diviene la sede. La *peripneumonia*, ch'è la più comune di tutte queste infermità, è tanto più grave, quanto più tardano a comparire gli sputi: si fa buono augurio degli sputi consistenti con poco sangue: i troppo fitti fanno temere; i serosi, i giallognoli, verdastri, o biliosi, come quelli, che sono in estremo carichi d'un sangue vermiglio, e spumoso, danno tristo augurio: funesti poi sono i veri. Siccome lo spettoramento è la crisi più naturale di questo morbo, si teme grandemente per coloro, che non l'hanno, o perchè non sienosi questi sputi fatti vedere, o perchè sien rimasti soppressi: se questa crisi, stabilendosi sul quarto giorno, si mantiene, il male termina col sudore nell settimo, nel nono, o nell'undecimo. Il cessamento del dolore (sussistendo la febbre, gli sputi biliosi, ec.) presagisce la cancrena.

Lo stato del polso, e il grado del calore debbono influir molto sopra il pronostico: può anche dipendere dalla violenza del dolore: quando questo è ottuso, si dee giudicare, che l'infiammazione occupi l'interno del polmone, ove vi è maggior facilità per lo spettoramento: se questo è acuto, si può presumere, che sia infiammata la superficie del polmone, e che il male stesso siasi comunicato alla pleura; circostanza perpetuamente rea. Accade però talvolta, che il dolore sia intensissimo, senza che sia intaccata la pleura; quei, che son versati nelle osservazioni anatomiche, hanno sovente incontrato questo caso, massime quando l'infiammazione è caduta sopra una parte del polmone, che prima era aderente alla pleura; lo ch'è noto essere comunissimo anche nello stato migliore di sanità. Nulla di bene ci dobbiamo promettere dal sudore copioso nel principio del male; ma negli altri tempi, e singolarmente sul settimo, spesso volte è critico, di pari che l'emorragia, e il vomito bilioso. Termina altresì talora la *peripneumonia*, per le orine, che depongono un sedimento bianchiccio, e fiso, ma di rado per la diarrea. Si opera bene dei furuncoli, che s'alzano sul dorso. Il rantolo, il delirio, la lingua arsa, e nera, le asinenze, e livide, e gli accidenti, che aumentano sul settimo giorno,

no, fanno reo presagio. Si è eziandio osservato, come la peripneumonia complicata colle scrofole, e collo scorbutto, ovvero che vien dietro all'angina, o ad altri mali infiammatorj, dava perpetuamente più da temere. La febbre lenta, la tifichezza, la vomica, l'empiema, e l'idropisia di petto, ne sono spesso le conseguenze: sonosi anche vedute delle metastasi portarsi sul fegato, o sopra alcun' altra viscera.

La *pleuritide*, e la *parafrenitide*, terminano per lo più colla cancrena: sonosi però vedute suppurare, e formare un abscesso più, o meno esteso, facendo talvolta un rialto in fuori, di cui non si lascia di trar profitto; ma comunemente apresi nel petto, e perciò apre la strada ad un *empiema*: si è veduto perfino forare il diaframma, ed aprirsi nel basso ventre, per formarvi un ascite purulento. Finalmente giova il sapersi, che le ricadute in tutti questi mali sono comunissime, e perpetuamente più pericolose del primo attacco.

Non ci mancano le *aperture dei cadaveri*, ma sono state per lo più fatte trascuratamente: ci fanno vedere polmoni lividi, stivati, e voluminosi: le loro superficie piene d'echimosi, di pustole con abscesso, e di tacche cancrenose con fortissime adesioni alla pleura. Vi si osserva ancora assai comunemente delle croste gelatinose, bianchicce, giallognole, o verdastre, più o meno estese, che sono leggermente aderenti alla superficie del polmone. Abbiamo detto altrove, che si trovava una materia somigliante sopra gl'intestini, sul fegato, e le altre viscere infiammate: incontrasi ancora sopra la pleura: io stento a dubitare, ch'ella non sia una specie di *suppurazione* fatta per *trapelamento*, non veggendosene talora altra traccia nei soggetti, i cui polmoni trovansi certissimamente in uno stato di flogosi: per altro si trova con frequenza questa materia inspessita con della marcia scorrente: vedesi comunissimamente nell'interno del polmone, uno, o più abscessi, delle infiltrazioni purulente, delle putrefazioni, ec. Fa d'uopo riflettere, che questi sconcerti non occupano se non che una porzione più, o meno estesa del lobo, del polmone destro, o sinistro; ma per lo più il lobo intiero è intaccato, e spessissimo da' due lati, tuttochè la maggior parte degl'infermi, che si erano trovati in quest'ultimo caso, non si fossero languati, che d'un lato solo. Si è trovato la pleura, che rivestiva le costole, il
dia-

diaframma, e formante il mediastino, livida, inspessita, infiammata, suppurata, o cancerenata: sonosi incontrati degli abcessi non meno nella pleura, che nel mediastino, i quali sono talora di tal volume, che il polmone n'è quasi sepolto. Bisogna osservare, che trovavasi spessissimo il polmone, e la parte della pleura che gli corrisponde, intaccati nella stessa guisa; ma allora è agevole il giudicare, che il male di questa viscerata si è comunicato a quella membrana, lo che segue quasi tutte quelle volte, ch'è intaccata la superficie del primo: si è anche veduto l'infiammazione primitiva della pleura comunicarsi al polmone. Non vi bisogna grande abilità per giudicare in queste complicazioni, quale sia stata la prima parte offesa, oltredichè ne può instruire perfettamente l'istoria della malattia. Gli stravasamenti serosi, saniosi, o purulenti, tanto nella capacità del petto, che nel pericardio, sono frequentissimi. Si è ancora scoperto la superficie del cuore bianchiccia, bombagina, o esulcerata: sonovisi vedute delle tacche bigiognole, formate da una specie di sfogliamento, di cui abbiamo già parlato: si è trovato il pericardio infiammato, cancerenato, e aderente alla superficie del cuore. Finalmente sonosi vedute delle infiammazioni, ed altri sconcerti nel fegato, dei vermi nelle prime vie, ec.

Le cavate del sangue in tutte le infiammazioni del petto, sono indubitatamente il punto più rilevante della medicatura; ma debbono avere i lor confini. Tutti i Pratici eccellenti sono convenuti, e l'esperienza quotidiana prova a chiunque è capace d'osservare, che tre, o quattro cavate di sangue, nei primi giorni del male, fanno maggior effetto di quindici, o venti amministrate in altri tempi, e che, in vece di placare allora gli accidenti (non parlo d' un sollievo leggiero, che talora queste procurano) ne eccitano dei nuovi e dei più terribili: e come? non è egli stato cento volte deciso, ch'erano contrarie alla suppurazione, che si stabilisce, come non se ne potrebbe dubitare, verso il quarto giorno? Il *Sydenham* nell' infiammazione del petto faceva cavare circa quarant' once di sangue in tre, o quattro volte. Il *Barbeirac* altro famoso Pratico non ordinava più di sei, o sette cavate più picciole: era questa ancora la pratica del *Riviera*, e di moltri altri Medici di gran fama. Quanto a me, se mi è permesso di dire

il mio sentimento, mi è sempre sembrato, che tre, o quattro cavate di sangue di dieci in dodici once nel decorso dei primi due, o tre giorni potessero bastare, e che assai di rado era necessario il riaprir la vena, qualora non sopraggiugnesse qualche pressante accidente: finalmente io credo, per dire alcuna cosa di più positivo, che i casi, che ne ricchieggono otto, sono assai rari; e che quelli, che ne voglion meno, sono comuni: si è anche osservato, che in molte epidemie le cavate di sangue erano micidiali, e ch'era assolutamente necessario l'astenersene. I partigiani della flebotomia non mancheranno di citare un gran numero di guarigioni operate dalle numerose cavate di sangue; ma che essi si facciano ad esaminare di buona fede, se non hanno veduto molti infermi, de' quali si è sparso tanto sangue, precipitare in tifichezza, in idropisia, od in qualunque altro morbo di languore, per non parlare di quelli, i quali, spogliati dalle cavate di sangue, non hanno avuto forza per espellere gli sputi, e son morti d'oppressione, o di cancrena.

L'*emetico*, dopo la prima, o la seconda cavata di sangue, è un rimedio sovrano; ma è molto raro, che si possa amministrar con sicurezza in altri tempi. I *purganti*, e i *lassativi* non convengono, se non verso il declinar del male: io ho veduto con gran frequenza accadere dei grandissimi sconcerti dal seguir la pratica contraria, benchè ai dì nostri sia molto alla moda: dee si tuttavia tenere il ventre libero a forza di lavativi emollienti, rinfrescanti, e rilascianti. E dicevole in questi mali il fare un grand'uso degli *allentanti*, degli *addolcenti*, e degli *spettoranti*: tali sono la liquirizia, la malva, la borraia, i cicoracei, le capillari, il piè di gatto, ec. l'olio di mandorla dolce, l'olio di lino, e il bianco di balena, lo sciroppo di malva, e quello di *nenusar*; le mucilagini di seme di lino, e di gomma dragacanta, le emulsioni, il brodo lungo di pollo, e simiglianti. I leggieri *diaforetici*, come il papavero erratico, la borraia, il cardo benedetto, la scabbiosa, e la scorzonera, vi sono assai adoperati: si può anche far uso del *Kermes minerale*, del sangue d'irco, e dell'antimonio diaforetico. Alcuni casi richieggono gli *assorbenti*. Si è anche amministrata con riuscita la *canfora*, massime nelle malattie, che addimandansi maligne. Quanto agl'*ipnotici*, per me non credo, che se no
pos-

possa far uso senza grandissima riserva, per non sopprimere gli sperti, o far precipitar la parte in cancrena. tuttavolta non debbo dissimulare, che il *Sydenham*, e altri famosi Pratici, gli hanno amministrati con grandissima familiarità; quantunque abbiano osservato, che i rimedj di questa spezie pettarono sovente un velo sopra la malattia, occultandone la sua carriera.

I *topici* in questo caso posson molto giovare: tali sono i *vescicanti*, le *coppette a taglio*, che s' applicano sopra la parte dolente, o altrove. Si può ammansare il dolore con dei cataplasmi emollienti, con delle vesciche piene di latte tepido, con delle unzioni di mandeche, di midolle, e d'unguento d'altea, coll' olio di vermi, di lauro, ec. ai quali si può aggiunger la canfora. Il balsamo tranquillo, e altri di questa natura non si debbono usare, se non se nelle massime necessità. Molti finalmente hanno sperimentato del giovamento dall' applicazione della metà d' una pagnotta uscita allora del forno; e questo topico non dev' esser disprezzato. Sonosi anche sperimentati ottimi effetti dal vapore dell' acqua calda; o facendolo immediatamente respirare, o presentando delle pezze, o delle spugne imbevutene. Per la pleuritide, e per le altre infiammazioni del petto, si osserva a un di presso il metodo medesimo, benchè variato a norma delle circostanze.

PERIPNEUMONIA SPURIA.

Questa infermità è poco nota, tuttochè sia molto frequente nei vecchi: il *Riviera* denominolla *peripneumonia puitosa*: il *Sydenham*, e il *Boerhaave* ne hanno parlato molto confusamente, e le loro descrizioni non s' appropriano alla stessa malattia; e finalmente sì l' uno, che l' altro hannovi mescolato molte ipotesi. Per me non credo, non si possa dare col *Boerhaave* questa denominazione allo stivamento del petto, che d' ordinario precede la morte, e ch' è la conseguenza molto ordinaria di tutte le malettie. La *peripneumonia spuria* esiste indipendentemente da qualunque altro morbo; ed è alcune volte tanto simile alla *peripneumonia vera*, che può distinguerle il solo stato del polso: è questa uno stivamento del polmone, che non appartiene all' infiammazione, e che, senza rischiar nulla, si può credere puitoso: l' oppressione, la tosse, e il dolore ottuso, e

aggravativo ne sono i segni principali: gli sputi per lo più son bianchi, colloso, schiumoso, e di rado sanguigni: la febbre non corrisponde allo stato del petto, ed il polso è talvolta picciolo, e lento: hannosi degli abbrividimenti, sì nel principio, che nel corso del male, oppure delle alternative di freddo, e di caldo; la lingua con frequenza è carica; lagnansi i pazienti d'ansietà, precipitano nel sopore, ec. Incerta è la durata di questo morbo, perchè rarissime volte è giustamente assegnato il suo principio: nulladimeno par, che tenga a un di presso il corso della peripneumonia vera, e termini talvolta, come quella, in tre, o quattro giorni: comunemente si confondono, o si medica quella, ch'è il soggetto di questo Articolo, per l'Asma. Può accadere, che la peripneumonia spuria trovi complicata colla vera, e che siamo obbligati a combinare, quando ciò si rileva, la medicatura dell'una, e dell'altra.

Il sopimento, il livore della faccia, e dell'unghie, la raucedine, le ansietà, ed il freddo delle estremità, sono in questo male *segni, che fan paura*: è il medesimo tanto più reo, quanto meno si conosce il pericolo, se non quando non abbiain più tempo di ripararvi; e la maggior parte degli infermi anche periscono, quando meno se lo aspettano. E' molto comune nei luoghi bassi, e pantanosi, e più frequente dominando stagioni, fredde, e piovose: i vecchi, le persone di temperamento flemmatico, i cachetici, e gli ubriachi, vi sono più che altri sottoposti.

Le aperture dei cadaveri, non meno quelle, che sono state fatte sotto i miei occhi, che quelle presentateci dagli Autori sotto altri titoli, ci mostrano il polmone gonfio, e edematoso: i bronchi ostrutti da un moccio più, o meno fisso, delle tacche cancerose, degli stravasamenti serosi, tanto nella capacità del petto, che nel pericardio, ed alcuni altri sconcerti, che non appartengono al nostro soggetto.

Questa infermità richiede un soccorso spedito, e abbiamo già osservato, che vi si apprestava troppo tardi: rade volte vi è necessaria la *cavata del sangue*, quantunque paja sovente, che il grado d'oppressione, la richiegga: questa può veramente procurare un sollievo passeggiero, ma aggrava la malattia, ed indebolisce grandemente gl'infermi. L'*emetico* per lo contrario vi è sommamente proficuo, massime se vi sieno del-

le

Le nausea . I *lassativi* , e i *clisteri purgativi* replicati amministransi perpetuamente con vantaggio . Deesi eziandio far grand' uso degli *allentanti* , dei *becichi* , sì addolcenti , che incisivi , degli *aperienti* , dei *diuretici* , e dei *sudorifici* : l' ellera terrestre , l' issopo , il nitro , la canfora , l' idromele , il bianco di balena , i saponi , l' offimele scillitico , il Kermes minerale , e lo spirito di corvo di cervo , sono i rimedj più impiegati . Pericolosissimi sono gl' *ipnotici* : i *vescicanti* , e le *coppette a taglio* posson produrre de' buoni effetti .

L' A S M A .

Questa è parimente una di quelle malattie , che si moltiplicano prodigiosamente ; e di dieci pretesi asmatici , a mala pena se ne trova uno , che sia veramente in questo caso . L' asma è un' abituale difficoltà di respiro , più o meno gagliarda , continua , o periodica , d' ordinario indipendente da ogn' altro morbo , e che non è accompagnata da febbre : ma non si dee così chiamare il respiro faticoso , ch' è comune a tutte le infermità del petto , nè quello , che nasce da più cagioni accidentali , delle quali ragioneremo nel seguente articolo . *Dispnoea* , *asthma* , e *orthopnoea* , sono i nomi assegnati dagli Autori a differenti gradi d' oppressione , e di cui i Pratici non servono gran fatto ; ma questi distinguono l' *asma secca* dall' *umida* , e fanno , che gli sputi in questa seconda sono di diversa natura , e compariscono talvolta purulenti . I *parossismi* d' ambe le specie sono più , o meno violenti ; allora il respiro inceppatissimo , segue comunemente con istrepito , e sibilamento ; ne è quasi inseparabile la tosse più , o meno vemente : questi accessi investono di notte , o dopo il pranzo , e per lo più durano quelle due , e tre ore : ve ne sono anche de' più lunghi , s' inoltrano perfino ai due , ed ai tre giorni . Quando il *parossismo* è *convulsivo* : il volto s' infiamma , gonfiansi le vene , ed i pazienti corron rischio di rimaner soffogati : quest' accesso è per lo più assai corto , ma può tornare assai spesso : d' ordinario viene annunziato da ruttii , dal gonfiamento dello stomaco , ec. Il ritorno dei *parossismi* è sommamente incerto : in parecchi segue indi a dieci , o dodici ore ; in altri più presto , o più tardi : si è osservato , che i più lunghi ammettevano intervalli maggiori : gli uni , e gli altri terminano il più delle volte in uno sgorgo
d' ori-

d'orina. Abbiamo detto, che l'*asma* era talvolta *continua*, lo che non è raro per l'*Asma* secca: tuttavia fanosi sempremai degli esacerbamenti, che s'accostano molto ai parossismi, de' quali abbiamo parlato, e che pare, che costituiscano il carattere dell'*asma*.

Le malattie cutanee tornate indietro, la gotta rimontata, il disseccamento delle vecchie ulcere, la soppressione de' menstrui, dello sgorgo emoroidale, ec. sono spesso fiate la *cagione* dell'*asma*: ella può anche essere il prodotto del malfrancesco, dell'infiammazione del petto, della febbre intermittente, delle affezioni itteriche, e ipocondriache, della cachessia, ec. L'eccessiva grassezza, e la rea conformazione del petto, possono spianar la strada ad un'*asma* continua: quei che respirano abitualmente un'aria piena di polvere, e singolarmente di quella di gesso; de' vapori minerali, del fumo del carbon fossile, ec. possono parimente acquistarla. L'*asma* invecchiata rarissimamente si guarisce; ma gli asmatici possono giungere all'estrema vecchiezza. Le palpitazioni, le sincope, la paralisi delle estremità superiori, ec. sono in questo male orribili accidenti: degenera spesso in cachessia, in leucostemmazia, in idropisia del petto, in tifezza, ec.

Non ci mancano le *Osservazioni anatomiche*; ma non è sempre agevole il distinguere le aperture dei veri asmatici, da quelle, che appartengono ad altre infermità: ci mostrano queste polmoni voluminosi gonfiati, edematosi, scirrofi, aderenti alla pleura, al mediastino, e al diaframma: veggionvisi delle idatidi, dei tubercoli, e delle pietre: vi si incontrano suppurazioni, e cancrene. I bronchi sonosi veduti ostrutti da diverse polveri, che eranli respirate, e da escrescenze più, o meno numerose, che occupavano la trachea-arteria, e le sue principali ramificazioni. Si è osservato, come il cuore era stato bene spesso la sorgente primaria di tutti gli sconcerti: si è questo trovato d'un enorme volume, e ulcerato nella sua superficie, sepolto intieramente nel grasso: sonosi vedute le sue valvule sì arteriose, che auricolari, ossificate, o petrificate: delle concrezioni polipose, non meno nei suoi ventricoli, che nelle sue auricole: si è anche trovato dell'acqua, o del sangue in copia, nel pericardio; l'aorta ossificata, ec. Si è pure veduto la pleura contrarre la solidità delle ossa, e formante una seconda carpenta da me trovata nelle adiacenze del

O

cuore,

cuore, che aveva quasi la stessa solidità, che la naturale. Scopronsi eziandio degli *abscessi*, dei tumori intaccati, e anomali; delle escrescenze carnose, aderenti, al polmone, alle pleura, al diaframma, ec. per non parlare delle inondazioni serose, e saniose, che qui sono comunissime. Ultimamente sonosi veduti degli iccirri, e degli *abscessi* al *fegato*, e questa viscera d'una grandezza mostruosa, per non far parola della *milza*, del *pancreas*, e d'altre viscere, nelle quali sonosi rilevati gli stessi sconcerti. Per altro non bisogna credere, che in tutti gli asmatici trovisi materia per delle osservazioni; poichè sonosene veduti di quelli, nei quali il polmone, di pari che le altre viscere, erano sanissime, tuttochè fossero stati investiti per alcun tratto di tempo da un' asma convulsiva, e periodica.

Da ciò, che abbiamo riferito, è agevole il giudicare, che dee essere in estremo difficile il fare una scelta adeguata dei *rimedj* adattati agli stati differenti delle parti, che posson esser tormentate in questo morbo, di cui, a parlar propriamente, non si considera che l'effetto. Siccome l'esperienza è la sola fiaccola, che ci possa far lume per questo tenebroso sentiero, così noi ci proporremo quelli soltanto, che pare, che sieno stati adoperati con più riuscita, tuttochè non si possa decidere, se il caso possavi aver avuto ugual parte, che la sagacità di coloro, che gli hanno amministrati. La *cavata del sangue*, rimedio universale, che si applica a tutto, in questo caso non è stato risparmiato: tuttavia non pare, che si addica, se non quando vi è la *plethora*, o soppressione d'alcuno sgorgo di sangue abituale, e io tengo per fermo, che negli altri casi non giovi a nulla: quei, che lo credono indispensabile negli accessi violenti, e convulsivi, debbonsi essere avveduti, che procura una calma soltanto passeggera, la quale, anzi che coadiuvare alla guarigione, la rende per lo contrario anche più maleagevole. I *vomitivi*, e i *purganti* convengono all'asma umida: i primi possonsi amministrare nel tempo dell'accesso; ma ci serviremo degli uni, e degli altri assai meglio, e con più sicurezza, dentro gl'intervali. Gli *al-lentanti*, e i *bechici*, sì dolci, che incisivi, appartengono a tutti i tempi: i più messi in opera sono il siero, i brodi di polmone di vitello, l'olio di mandorla dolce, di spermaceti, la ligurizia, la borrana, la ruffiagina, l'ellera terrestre, l'erisimo, la canforata, l'abrotano,

no, l'issopo, la favoreggia, il marrubio, l'oro, le coe-
cole di ginepro, la gomma dragacanta, la gomma ammo-
niaca, il sapone, l'acqua di teda, la trementina, lo
zolfo preparato, i fiori di benzoino, il balsamo del Lu-
catello, l'offimele di scille, ec. Si fa eziandio grand'
uso degli *aperienti*, e dei *diuretici*, come del dente di
cane, del brusco, del finocchio, dell'ontano, della
brionia, dell'Iride di Firenze, dei centogambe, dei ni-
trofi, dei marziali, ec.

Sono anche stati adoperati con buono evento i *surifi-
ci*, massime per le fioriture cutanee rientrate, e per la
gotta rimontata: tali sono la scabbiosa, il cardo bene-
detto, il guajaco, il saffra, la Cina, e la salsapari-
glia, l'antimonio diaforetico, e l'anti-ettico del Pote-
rio, ec. Gli *antispasmodici*, come il castoreo, il succino,
e lo zafferano, possono altresì far del bene, di pari che
gli *assorbenti*, gli *amari*, la china-china, il caffè, ec.
Quanto agl'*ipnotici*, credo, che non debbanfi praticare
nel tempo dell'accesso, e dubito, che se ne possa ri-
trarre alcun vantaggio negli altri tempi. Ultimamente
il latte; e le *acque minerali* di Youser, di Plombieres,
di Borton Lancy, di Barege, di Monte d'oro, di Cau-
teretz di Digne, di Bagnols, d'Aix la Chapelle, ec. so-
no per questo morbo, come per tanti altri cronici, aju-
ti noti a chiunque. Oltre i rimedj proposti contro il
parossismo, si deve far uso dei *lunativi* emollienti, ed
anche dei purgativi, e degli stimolanti, colla coloquin-
tida, col vino emetico, ec. Le *fiebagioni* alle gambe, e
la loro immersione nell'acqua calda, vi producono buon
effetto: si può altresì far uso, quando son lunghi, dei
vescicanti, dei sinapismi, ec. Ve ne sono di quelli, che
dilungano il parossismo con fumar del tabacco: altri
colla mira stessa, e colla medesima riuscita servono del
sugo di limone, dell'aceto, o di qualsivoglia acido ve-
getabile. Gli asmatici sono grandemente pregiudicati
dall'aria fredda e umida, di modo che debbono schi-
varla a tutto potere, e soprattutto debbonfi cooprir be-
ne il petto: quest'ultima circostanza, alla quale comu-
nemente poco si bada, non lascia d'essere di momento.
Ultimamente io dirò, che se l'asma è l'effetto della ro-
gna tornata in dentro, non vi ha cosa migliore del pro-
curare, che i pazienti la riacquistino; e questo espedien-
te non può mancare di produrre il suo ottimo effetto.

LA SOFFOGAZIONE.

Non è malagevole il conoscere la *soffogazione*; ma non è sempre facile il rintracciarne la causa. Non si dubiterà di quella, che nasce dal corso, o dalla collera, dall'aria troppo leggiera, o troppo pesante, che respirasi sulle cime dei più alti monti, o nelle caverne, o precipizj profondi: di quella altresì, che vien cagionata da un tumore comprimente la trachea arteria, e da alcun boccone, che si fermi nell'esofago, ec.. Si distinguerà similmente con molta agevolezza la soffogazione prodotta dall'incubo, dall'angina, dall'emorragia del polmone, o dall'apertura della vomica. Si potrà rilevare l'ostruzione della glottide, non meno per corpi eterogenei, che vi s'insinuano di fuori, che per tubercoli, e pietre rigettate dal polmone, e possono vizi impegnare; ultimamente si potrà argomentare dall'inondazione della trachea-arteria, e dei bronchj in conseguenza d'un'emorragia dal naso, o dalla bocca seguita nel tempo del sonno, siccome io stesso ho veduto accadere. Ma si stenterà talora a pronunziare, quando c'imatteremo in una soffogazione, che nascerà dall'affezione isterica, e ipocondriaca, da catarro soffogativo, dall'idropisia del petto, dall'empiema, dal laceramento degli aneurismi, tanto dell'aorta, che delle sue ramificazioni, da mali del cuore, ec. Nulladimeno tutte quelle infermità, delle quali la soffogazione non è che il sintoma, hanno i loro articoli particolari, nè risguardano il presente, il quale è destinato soltanto a quella specie di *soffogazione*, che nasce *per accidente*, come per l'acqua, pel vapore del vino, del carbone, delle miniere, ed altri fossili, dal fulmine, ec. E' vero, che lo stato di coloro, che si sono *annegati*, o di quei, che sono stati *strozzati*, che sono stati cavati fuori dalle cave, o dalle cantine riscaldate dalla fermentazione del vino, da luoghi sotterranei infetti, da camere, ove si era rinchiuso il vapor del carbone, ec. somiglia più all'ultimo grado della sincope, che alla soffogazione, poichè i pazienti non danno d'ordinario alcun segno di vita; ma non si può dubitare, attenendoci a ciò, che essi ci contano, che il male non sia cominciato dalla soffogazione, la cui violenza ha tolto loro il conoscimento, e il senso, e par che abbia sospeso tutte le funzioni vitali.

L' *Anatomia* ci presenta soltanto degli stivamenti di sangue, sì nel cervello, che nel cuore, e nel polmone: veggionsi comunemente delle tacche livide, o delle specie d'echimosi sopra le viscere, e singolarmente sopra il polmone: le membra sono irrigidite, ed inflessibili, ec. Finalmente fa di mestieri sapere, che non si trova mai acqua nello stomaco, e rarissime volte nella trachea degli *annegati*, contro la persuasione comune: importa molto l'esserne avvertiti, o disingannati, avvegnachè molte pratiche inutili, e verisimilmente dannose, son fondate sopra una sì fatta supposizione.

In simiglianti occasioni non si dee perdere un momento, e procurare di richiamare il sentimento, e dare il primo urto al sangue, che par privo d'ogni moto. Non bisogna lasciar là senza ajuto quei, che non danno segno alcuno di vita, sendo certissimo, che assai fiate non è realmente possibile, ch' altri s'accorga se sieno vivi, nè possa averli alcuna certezza della lor morte. Sonosi salvati degli *annegati*, che erano stati più ore sotto acqua, i quali, a giudicarne dalle apparenze, parevano senza vita da lungo tempo. Fa d'uopo farli incontanente trasportare vicino a un buon fuoco, e scuotergli molto, e ruotolargli; si procura poi di fargli vomitare sollecitandogli in gola con una penna: si versa loro in bocca dei più energici *liquori spiritosi*, fannosegli odorare, se gli stropicciano le narici, le tempie, ec. E' cosa buona il soffiar loro in bocca dell'aria, e dei più gagliardi sternutatorj entro il naso. Si praticano delle supposte, dei lavativi col tabacco, o altre materie delle più acri: cavasi loro tosto sangue: e finalmente si fa uso di tutti i soccorsi, che s'addicono ai mali comatosi, e alla sincope. Non bisogna contentarsi d'alcuni tentativi, che anzi per lo contrario si dee insistere per lungo tratto di tempo, avvegnachè sieno veduti di quelli, i quali non hanno dato alcun segno di vita, che dopo due ore; e questo è un punto dei più rilevanti; imperciocchè è cosa indubitata (è questo è il risultato di tutte le osservazioni, che abbiamo fatto intorno a tal materia) che sono stati abbandonati molti di costoro, che con gli adeguati soccorsi si sarebbero ricovati.

La medicatura, che s'adatta a coloro, che sono stati soffogati dal *vapore del vino, del carbone*, ec. non è gran fatto diversa da quella, che pur ora abbiamo proposta.

posta . La prima attenzione , che si dee avere , si è il trasportargli in un luogo bene esposto all'aria , di gettar loro dell'acqua fredda nel viso , di soffiar dell'aria entro la loro bocca , prendendo la precauzione di chiuder loro le narici , di far loro gustar dell' aceto , lo spirito volatile di sale ammoniaco , il sale d'Inghilterra , ec. Fa di mestieri altresì far loro aprir la vena colla maggiore speditezza possibile . Ultimamente debbonfi in questo caso impegnare i più emergici sternutatorj , i lavativi stimolanti , le coppette a taglio , ec.

L' E M O P T I S I .

Tuttochè questo morbo sia dei più manifesti , nulladimeno altri vi s'inganna talora , confondendolo , non meno col vomito sanguigno , che con lo sputo di sangue , che vengono da tutt'altra parte , che dal polmone . Tuttavia la tosse , gli sputi , più o meno carichi di sangue , congiunti al calore , all'agrezza , al prurito , alla gravezza , e al dolore che prova si nel petto , come maggiore , o minore oppressione , lo caratterizzano quanto basta : per altro il sangue , che vien dal polmone , è d'ordinario vermiglio , e spumoso : questo è talvolta sì copioso , che può esser preso per l'effetto d'una vera emorragia : la tosse ha varj gradi : alcuna fiata ancora ella manca , o non è sensibile . Tutte queste particolarità distinguono bastantemente la verace *emoptisi* (αιμόπτυσις) dagli altri *sputi di sangue* : è ancora agevole il rilevare , se venga dal naso , perchè se ne riceve nel fazzoletto , e a un tempo stesso se ne sputa . Se lo somministrano le gengive , oltre poterne con ogni facilità scuoprir la sorgente , si manda fuori senza forza col semplice sputo leggiero : quando ha la sua fucina nella parte posteriore della bocca , vi vuole un certo sforzo per istrascinarlo , che non si può meglio significare , che colla voce latina *screatur* . Si caccia quello , che scola dalla laringe per mezzo d'una specie di rantolo volontario , che lo porta seco : e più agevole l'ingannarsi in questo caso , che negli altri , poichè questo spurgo di sangue è perpetuamente accompagnato dalla tosse ; ma bisogna osservare , che questa è per lo più leggiera , e che non è mai molto il sangue , che si rigetta : sentesi per altro un'agrezza , o prurito nella laringe , che indica quanto basta la sede del male .

Il *sangue* , che viene dal corpo del polmone , pare ,
che

che talora vi si separi per mezzo d' un semplice *trasudamento*: allora ve ne ha a stento per ringere gli spati: ma la rottura dei vasi, cagiona il più delle volte l' *emoptisi*, e allora il sangue sgorga talvolta con tale impeto, che altri crede di vomitarlo. I Medici vi si possono ingannare, come gl' infermi, quando ne giudicano dalla semplice relazione, che loro vien fatta: ed è tanto più facile il deludersi, quanto che l' emorragia del polmone, come dicemmo, non è sempre accompagnata dalla tosse, che per altro è talvolta leggiera. Si dubita con qualche fondamento, se quel sangue vermiglio, che sovente si rigetta a bocca piena, sia arterioso. Si sa, che la febbre non è essenziale a questo morbo; ma l' accompagna con frequenza; e in questa circostanza, coloro, che non ne sono istrutti, posson prenderlo per la peripneumonia. Io sono stato più volte testimonio di questo granchio preso. Si pretende, che certuni abbian renduto col sangue delle porzioni considerabili della tunica interna dei bronchi: ma quei tali, ai quali ciò è accaduto, non eran eglino tifici per innanzi? poichè, e chi non sa, che sono esposti ad emorragie polmonari?

Gli sforzi del petto, che fanno si cantando, gridando, e tossendo; gli accessi di collera, le cadute, le percosse, ec. posson dar motivo all' *emoptisi*. Trova anche la sua sorgente nella soppressione degli sgorghi di sangue abituali; e ciò accade, o a motivo d' interrotte cavate di sangue, o di cessamento d' emorragie, o di soppressione de' mestrui, e dell' emorroidi. Debbesi porre altresì nel numero delle cagioni lontane la vita sedentaria, di pari che la soverchio laboriosa; la crapula; lo stravizzo colle femmine, e finalmente una disposizione ereditaria. La malattia, di cui ragioniamo, è molto familiare ai giovani, dai quindici ai trent'anni: gl' ipocondriaci, i letterati, e le donne, vi sono parimente sottoposti. L' *emoptisi*, che riconosce una cagione accidentale, e che s' incontra in un buon soggetto, non è gran fatto da temere, qualora lo sborso del sangue non sia eccessivo; ma se viene in seguito d' un morbo cronico; s' è abituale; se dipende da una disposizione ereditaria, dobbiamo aspettarcene ogni maggiore sventura: è noto bastantemente, esser questo il primo passo verso la tifichezza, massime nell' età da noi pur ora indicata: ella è meno da temere, quando supplisce alle fioriture mestruali; ma in tutti i

cafi , allorchè il fangue sgorga in copia , fi corre rifchio di rimaner soffogato , e fe fi fcanfa *quefto pericolo* debbonfi temer molto *le confequenze* .

L' *Anatomia* ci offre la trachea-arteria , e i bronchi pieni zeppi di fangue , e di fanie ; delle erosioni alla membrana , che gli vefte : dei chiodi , ed altri corpi eterogenei , che vi fi fono introdotti : i vafi del polmone grandemente dilatati : delle echimofi , e delle tacche cancrenofe nella fuperficie di quefta vifcera : delle aderenze con tutte le parti , che la circondano : delle flogofi , degli abfceffi , delle efulcerazioni degli fcirri , dei tubercoli , e delle pietre . Sonofi veduti degli aneurismi dell'arteria polmonare , e dell'aorta aperti , e comunicanti con i bronchi : fi è pure incontrato il cuore d'una groffezza prodigiofa ; la fua fuperficie efulcerata , e le fue auricole estremamente dilatate : fonofi vedute con frequenza delle inondazioni , non meno nel pericardio , che nella capacità del petto , e degli ftravafamenti di fangue nel teffuto del mediaftino : fi è inoltre offervato il fegato fcirrofo , e infiammato ; la milza enormemente gonfiata ; degli ftravafamenti nella vena porta ec.

Si può , generalmente parlando applicare all' *emoptifi accidentale* , e *recente* la medicatura delle emorragie : l' *abituale* ne vuole una , ch' è poco differente da quella della tifichezza . Le cavate del fangue , tuttochè neceffariffime nel primo tempo , non debbon effer foverchio inoltrate , per timore di precipitare i pazienti nella tifichezza , lo che pur troppo frequentemente succede : quefte fono impiegate con più vantaggio , per impedire il ritorno della malattia . I *rinfrifeanti* , gli *astringenti* , e i *vulnerarij* fono i rimedj ufati familiarmente , allorchè il fangue sgorga abbondevolmente : tali fono il rifo , l'ortica , la confolida maggiore , la piantaggine , la pimpinella , l' ellera terrefre , la vitalba ; le rofe roffe , e i balaufti ; le mucilaggini , il cafcìù , il fangue di drago , il fuccino , il corallo , la pietra ematite , la palla di Marte , i balfami naturali , quello del Lucatello ; l'allume , l'effenza di Rabel , o l'olio di vetriolo , ec. Ma bifogna amminiftrare con molta riferva quefti ultimi astringenti , e non gli ufare , fe non fe nei cafi urgenti . Gli *addolcenti* , e gl' *ipnoci* , fono acconciffimi a calmare la toffe , che non lascia di eccitare , o confervare l'emorragia : con que-
fta

sta mira si fa uso delle emulsioni , dell' orzata , della pitizana di malva , di nenufar , ec. dello sciroppo di papaveri bianchi , delle pillole di cinghioffa , dei trocisci di Karabè , ec. Nulladimeno anche i narcotici debbono amministrare con riserbo , come quelli , che posson produrre effetti perniciosi , dei quali abbiamo esempli infiniti .

Quando l'emorragia è gagliarda , si posson fare delle *legature* , oppure involuppar lo scroto con delle pezze inzuppate nell' *acqua fredda* , o nell' *essiccate* , e far uso degli ajuti mentovati altrove . Se lo stato delle prime vie addimanda *purganti* , si sceglieranno i più miti , come la cassia , la manna , ec. Ognun sa , che il latte , le creme di riso , d'orzo , e di avena ; i brodi di polmone di vitello , e di tartaruga , ec. sono i rimedj più efficaci contro l' *emoptisi abituale* . I pazienti debbono schivare con cura il freddo , astenersi dal vino , ed osservare in una parola il governo più esatto , che val più di tutti i rimedj : si deve altresì nel tempo del parossismo , non gli lasciar prender altro , che la sola bevanda , e qualche porzione d' emulsione , obbligarli alla maggior quiete , e a non parlare .

LA TISICHEZZA .

Questo morbo il più delle volte è preceduto dallo sputo di sangue , e della tosse secca , e leggiera , accompagnata da una *febbre abituale* , che non è molto sensibile , che verso la sera , o dopo il cibo : dal color rubicondo delle guance : dal calore alla palma della mano , ec. Ma gli sputi salati , collofi , e purulenti ; la febbre lenta ben manifesta , con esacerbamenti , la voce ruoca : il respiro inceppato con dolore al petto , o alla schiena ; l'emaciamento del corpo : la curvatura dell' unghie , ec. non ne lascian alcun dubbio : tuttavia la *tisichezza* non comparisce sempre con questa evidenza , incontrandosi alla giornata dei casi , nei quali non è agevole il decidere . La tosse è talvolta secca , quantunque il petto sia inondato di marcia : vi sono anche degl' infermi in questo stato , che non tossono , e respirano con molta libertà , senza sentirsi tampoco dolore il petto : per altro la tosse cronica , e l' asma umida , hanno sovente grande affinità col male , di cui parliamo intorno al quale però non si potrebbe dubitare , allorchè gli sputi sono *marciosi* ; ma è talora

Tora difficilissimo il giudicare, s'e' sien tali; conciossiachè veggansi ogni giorno, dopo un semplice reuma degli sputi, che hanno tutta l'apparenza di marcia, che anche calano a fondo nell'acqua, e che non hanno con tutto questo una tal qualità: sono anche equivoci il loro sapore, e il loro odore: per altro gli sputi purulenti gettati sul carbone acceso, esaleranno un fetore, che, quando si ha alcuna esperienza di queste prove, si può distinguere da ogn'altro odore.

La maggior parte dei *tisici* son privi del riposo della notte: stentano a coricarsi sul lato doloroso: vomitano dopo aver preso il cibo per la violenza della tosse: molti provano un calore per tutto il corpo, e singolarmente nel petto, ove sentono anche del dolore. Sopravvengono anche ai medesimi degli eccessivi sudori, e talvolta dei pruriti, e delle pustole per tutto il corpo, e comunissimamente uno scioglimento di ventree colliquativo. Si lagnano d'aver la bocca salata, che talora si cuopre tutta di aste: le orine portan seco una materia oleosa: gli occhi s'incavernano, il naso si affila, le palette sporgono in fuori; le forze si dileguano, cascono i capelli, e gonfiansi le gambe. Certunii finalmente insieme con gli sputi gittan fuori dei *tubercoli*, delle pietruzze, dei brani della tunica interna dei bronchi, dei pezzetti di polmone, ec. Eppure la lontananza di tutti i divisati segni, o sintomi non ci rende sempre sicuri, imperciocchè sonosi veduti parecchi infermi coricarsi, senza incomodo da tutti i lati, senza tosse, senza dolore, senza oppressione, ec. tuttochè avessero un latto del petto pieno di marcia, che occupava il luogo del polmone intieramente distrutto.

La *disposizione ereditaria*, un corpo delicato, e d'alta statura, e la *rea conformazione del petto* inclinano grandemente a questo morbo. Viene altresì cagionato dall'abuso del coito, del vino, e dei liquori; dalla soppressione degli sborfi di sangue abituali, dalla repulsione delle infermità della cute, dal disseccamento delle ulceri, ec. E' ancora la conseguenza dell'asma, della rosolia, del vajuolo, della peripneumonia, delle frequenti tossi catarrali, delle ferite, ec. Ultimamente è noto, la tifichezza esser sovente il sintoma del celtico, delle scrofole, dello scorbutico, della gotta, ec.

La tifichezza confermata, e l'ereditaria sono quasi incurabili: si può ricovrarsi da quella, che succede
alla

alla peripneumonia , al vajuolo , ec. La sintomatica segue d'ordinario, quando non si è soverchio avanzata, la sorte dell' infermità principale . La *febbre acuta*, che sopravviene con frequenza nel corso di questo morbo , è *pericolosissima* ; il più delle volte elle dipende dall' infiammazione dei tubercoli , e dalla loro suppurazione : prende questa talora l' aspetto della febbre intermittente , ma non ne ha il carattere . I copiosi sputi , e di rea qualità, la soffogazione , lo scioglimento del vente , e i sudori colliquativi ; la faccia piombina, la caduta dei capelli, la consunzione, i sudori arenosi, ec. annunziano una *vicina morte* . Per lungo tratto di tempo si posson portare dei tubercoli ; ma se questi s' infiammano , non se ne potrebbe schivare la suppurazione . Sonosi eziandio veduti dei tifici, che sputavano marcia vera , e reale , a motivo d' un certo dato governo, vivere venti, trenta, e perfino quaranta anni, a un dì presso nel medesimo stato . L' ulcera del polmone limitata dee allora esser considerata come un cauterio aperto, o come una specie di scolatojo, il disseccare il quale sarebbe cosa pericolosissima . Si sa, che la tifichezza si comunica fra quei dello stesso sangue ; ma non siamo ben certi , che questo contagio abbia luogo fra il marito, e la moglie .

L' *anatomia* ci offre nel petto gli sconcerti più rei , che si possano aspettare dalla suppurazione, e dalla putrefazione , e quelli soli, che gli hanno veduti , possono averne idea . Si è osservata la più gagliarda adesione del polmone con tutte le parti, che lo circondano : la tunica di questa viscera fissa , e callosa : delle esulcerazioni nei bronchj, e nella trachea-arteria, delle infiltrazioni purulente, degli abscessi, dei tumori anomali, degli scirri, dei tubercoli, delle materie pietrose di genere vario, delle ulcere fugedeniche, e fistolose, e finalmente l' annientamento d' una parte del polmone, e talvolta d' un lobo, o d' un intiero lato, con istravasamenti saniosi , e purulenti , non meno nel petto, che nel pericardio . In alcuni sonosi incontrati i disordini stessi nel fegato , nell' epiploon, nel pancreas , e nelle altre viscere del basso ventre .

La *cavata del sangue* è talora necessaria nel primo tempo della tifichezza ; ma è inutile , e anche dannosa , quando questo morbo si è a un certo segno inoltrato : non s' adatta meglio a quella febbre acuta , che

ci dà segno comunemente dell' infiammazione dei tubercoli; e quelle, che non ci lasciano di fare in tal circostanza, precipitano perpetuamente i pazienti: non vi è Pratico per poco attento, che non abbia osservato questo fatto più volte. Coloro, i quali, non saprei poi sopra qual fondamento, hanno voluto considerare la tosse dei tifici come stomacale, hanno introdotto l'uso dei *purganti*, ugualmente perniciosi, che le cavate del sangue: non è già, che non se ne possano alcuna volta amministrare, quando lo voglia lo stato delle prime vie; ma debbonfi scegliere i più miti, per non danneggiare il petto. Il latte dee porsi alla testa di tutti gli altri rimedj, non meno per troncargli il corso a questa malattia, che per guarirla, o palliarla: quello di donna, merita la preferenza; dopo di questo quello d'asinella, di giumenta, di capra, e di vacca: quest'ultimo, per quanto si può, si fa fare le intiere veci dell'alimento. Gli *allentanti*, i *temperanti*, i *bechici addolcenti*, e *detersivi*, in questo caso veggon messi in opera: tali sono la borrana, la polmonaria, le capillari, la tussilagine, la veronica, l'ellera terrestre, e il piè di gatto: la gomma ammoniac, i balsami naturali, quello del *Lucattelli*, l'acqua di teda; il siero, i brodi di polmone di vitello, e di tartaruga, le creme d'orzo, di riso, ec. E' stato anche fatto uso in alcune circostanze degli *assorbenti*. Gl' *ipnotici*, come il diacodio, le pillole di cinoglossa, e altre debbonfi considerare per meri palliativi, l'abuso dei quali dee molto temersi. Le *acque* di Bonne, quelle di Baresges, di Monte d'oro, di Coterès, di Bagnols, e di Seltz, posson dar qualche ajuto, allorchè non vi è peranche gran strage al petto: si stima anche l'*acqua di calcina leggiera*, che si mescola col latte: per quanto sospetto esser possa questo rimedio, non lascia d'essere appoggiato sopra ottime osservazioni. Viene anche proposto il mercurio, i sudorifici, gli aperienti, gl' incisivi, gli antiscorbutici, ec. Ma tutti i rimedj divisati convengono soltanto alla tifichezza sintomatica; ed è agevole il vedere, anche per le osservazioni lasciateci intorno a ciò, che con tal mezzo si è risanata la malattia principale, di cui la tifichezza era il mero accidente. Ultimamente ricavano i tifici grandi vantaggi dall' *esercizio a cavallo*, e dalla *mutazione dell' aria*; e soprattutto quella della campagna, e delle rive dei fiumi giova loro di più:

vi è stato chi ha sperimentato del bene dal porsi a fumare dell'erbe vulnerarie, e delle balsamiche: molti sono stati risanati col *serone*, o col *cauterio*, non meno alla nuca, che fra le palette.

LA VOMICA.

Questa, come confessano tutti i Pratici, è una *delle più occulte infermità*, la quale per lo più non si manifesta, se non dopo ch'è rotto l'abcisso, e che la marcia si fa strada per i bronchj, lo che si rileva agevolmente per la copia di questa materia, che si spurga colla tosse. La maggior parte però dei pazienti hanno avuto prima una tosse, ora secca, ora umida; una leggiera difficoltà di respiro, il fiato puzzolente, e un dolore ottuso nel petto: certuni hanno delle ansietà, dei sudori notturni, lo scioglimento del ventre, la fame canina, ec. La *febbre lenta* è altresì compagna indivisibile di questo stato. Se l'abcisso è il prodotto dell'infiammazione del polmone, si può sospettarlo verso il decimoquarto giorno del male, quando lo spettoramento è stato imperfetto, o è assolutamente mancato: quando la febbre si sostiene, e nella notte s'aumenta con dei sudori, e che sussistono il dolore, la tosse, e la difficoltà del respiro. Le dita in alcuni divengono livide, e gonfiansi loro i piedi: gli sputi, che seguono da vicino lo sfiancamento del *cisto*, comunicante con i bronchj, sono marciosi, bianchi, giallognoli, saniosi, o sono del color delle fecce del vino: si è veduto in brevissimo tratto di tempo rigettarne quasi una pinta, e alcuni son rimasi perfino soffogati. La tosse, le grida, lo sternuto, o qualunque altro sforzo del petto, danno luogo a questa apertura, che segue talvolta nella cavità del petto, ove la marcia si spande tacitamente, e quasi sempre malgrado del Medico, per quanto possa esser diligente, e illuminato. Sonosi veduti degli abscessi del polmone aprirsi un varco a traverso dei muscoli intercostali, del diaframma, e del fegato, e manifestarsi anche esteriormente per escrescenze, e tumori assai osservabili. La peripneumonia, le flussioni catarrali abituali, e le altre malattie del petto; gli sgorghi sanguigni soppressi, le fioriture cutanee rientrate, le suppurazioni seccate, le contusioni, le febbri putride, e maligne, ec. *spianano la via a simiglianti deposizioni*.

E' la *vomica* sempremai un morbo pericolosissimo: tut-

tuttavia non dà talora altro incomodo , che quello d'evacuarla di tratto in tratto , e veggionfi molti infermi, i quali in tale stato conservano il lor buon colore , o la lor carne . Altri dopo la prima apertura del sacco , continuano a sputar marcia , senza che ne segua loro alcun malore ; ma quando nel primo istante la marcia viene in soverchia copia , i pazienti , come dicemmo , corron pericolo di rimaner soffogati . Si è veduto accadere in giovani di buona costituzione , che poichè si è la vomica evacuata , in breve tempo si è consolidata , senza lasciare il menomo incomodo ; ma non dee altri lusingarsi del esito così felice per i cachectici , ed altre persone malsane: il *cisto* resta aperto , o si riempie di nuovo , per evacuarfi , della stessa materia , lo che si è veduto accadere nella malattia medesima venti , trenta , e anche quaranta volte . Se rimane aperto , degenera in ulcera , che fa dei progressi nel polmone , e per conseguente precipita nella tifichezza : non possiamo dubitarne , quando gli sputi marciosi durano più di quaranta giorni : i fetenti in tali circostanze debbon far temere la putrefazion del polmone . Abbiamo già osservato , che la vomica non s' apriva sempre dal lato dei bronchj , e che la marcia si spandeva talora fra il polmone , e la pleura , dal che ne risulta l'*empiema* , che farà il soggetto del seguente Articolo : può la marcia gettarsi anche sulle parti esterne , o scavando le più prossime , o formandovi per via di *metastasi* dei nuovi abscessi , che disseccano quello del petto . Si è ancora osservato , come la materia purulenta rimontata aveva preso la strada degli escrementi , e delle orine ; ma in tali felici riuscite niuna parte vi ha l'arte nostra : son questi perpetuamente opera dalla Natura , la quale però possiamo imitare , con istabilire delle suppurazioni , o degli scolatoj nei luoghi a tale effetto i più adattati .

Le *cavate del sangue* , checchè se ne dicano gli Autori , rade volte in questo caso sono necessarie : è bene conservar libero il ventre , non meno con dei *rilaschanti* , che con dei clisteri : questi rimedj , di pari che i *diuretici* , posson giovare , quando il *cisto* è intiero , mentre la marcia , come dicemmo , p'ò prender la strada delle fecce , o dell'orina . Se l'abscesso è aperto , si dee medicar questo male come la tifichezza . La veronica , il miele , la trementina , il balsamo di

zolfo, le pillole di Morton, ec. sono i *vulnerarij deter-
sivi*, che sono stati messi più in opera. Si fa anche
un grand'uso d'ogni spezie di latte, delle creme d'or-
zo, di riso, ec. Le acque di Bonne, di Baresges, di
Monte d'oro, e altre *minerali bituminose*, possono in
questo caso fare un gran bene. Sonosi veduti effetti
maravigliosi dal cauterio aperto sopra il lato offeso, o
in alcuna altra parte vicina. Finalmente si possono ri-
chiamare gli sputi, stati troncati dall'aria fredda, o
dalle passioni d'animo, col far respirare i vapori dell'
acqua calda.

L' EMPIEMA.

Così addimandasi l'*inondazione marciosa* del petto,
o dipendente dalla peripneumonia, e dalla vomica, o
da qualunque altra suppurazione, tanto del polmone,
che della pleura, del mediastino, del diaframma, del
segato, e d'altre parti adjaçenti. Chiamasi anche em-
piema lo *stravasamento del sangue*, o del chilo nella
medesima cavità, siasi la conseguenza di percosse, o di
piaghe, siasi per isfiancamento d'aneurisma, ec. Ma
questi mali, che risguardano altri Articoli, non han-
no alcun rapporto col presente. L'*empiema*, che incon-
transi con più frequenza, è quello, che sopravviene al-
la peripneumonia: dobbiamo sospettarne, allorchè gli
sputi non sono stati copiosi, e che la febbre più, o
meno gagliarda, sussiste con esacerbamenti verso la se-
ra dopo il decimoquarto, o il ventesimo giorno del
male: ma se ne avrà qualche certezza, se i pazienti
si lagnino d'un peso sul petto, con difficoltà di respiro,
e d'una tosse secca; se stentano a coricarsi sopra un
lato, ch'è il sano; se sentono in bocca un gusto di
putrefazione, con perdita dell'appetito: se hanno dell'
enfisagioni edematose, dei sudori notturni, dei brivido-
ri irregolari, delle ansietà. Ma la fluttuazione della
marcia, che alcuni pazienti distinguono bene, non al-
tramente che l'undulazione, che si può scuoprire, e il
rialzamento, che forma questo liquido accostandosi agli
integumenti, non lascian motivo di dubitarne. I più
copiosi sputi non ci assicurano contro l'empiema; io
ho veduto alcuna volta il petto pieno di marcia in
persone, che avevano prodigiosamente sputato fino al-
la lor morte: coloro, ai quali è nota la conformazio-
ne di questa cavità, e l'estensione del polmone, deb-
bon

bon giudicare, che questo caso non dee esser raro: orra ciò si è più, e più fiate osservato. Non sono meno equivoci gli altri segni, massime quando l'empiema è una conseguenza della vomica, o di ogn'altra suppurazione lenta: io ho veduti in queste circostanze alcuni infermi, che respiravano liberamente, che si coricavano in tutte le situazioni, che a mala pena tossivano, e in una parola, che non parevano malati nel petto, nei quali si è tuttavia trovato dopo la lor morte totalmente distrutto uno dei polmoni, ed il suo luogo occupato tutto dalla marcia: non mancano osservatori, i quali nelle medesime circostanze hanno parimente incontrato le rovine stesse da noi divise.

Non parlerò altramente delle aperture dei cadaveri, tuttochè ne abbiamo in gran copia, poichè mi somministrano principalmente la materia del presente Articolo, come del precedente, i titoli dei quali altronde le suppongono. Farò soltanto osservare: che sono trovati nella peripneumonia degli empiemi belli, e formati innanzi al decimoquarto giorno del male: questo è un avvertimento, il quale si vede bene quanto importi; ma quello, che vi ha anche di più sorprendente, si è la totale distruzione di un intiero lobo del polmone, seguita in meno di trenta giorni: mi sono imbattuto veder ciò in un soggetto, che aveva goduto perfettissima sanità prima d'essere attaccato dalla peripneumonia, e ch'era morto sul trigésimo secondo giorno del male: la marcia, che occupava in luogo del polmone, era bianca come il latte, senza il menomo reo odore.

Abbiamo varie osservazioni, le quali par, che provino, che la marcia stravasata, o dispersa, come quella degli abscessi, può essere riassorbita, e scaricata poscia, per la via delle fecce, o per quella delle orine; ma questo è perpetuamente lavoro della Natura: avvegnachè i tentativi fatti per far prendere alla marcia questa carriera, d'ordinario sono stati inutili. Nulladimeno possiamo far uso dei lassativi, dei diuretici, ed anche dei sudorifici, allorchè la natura mostra di tendere a liberarsi per quelle strade, che sono sottoposte a siffatti rimedj. Ma se il male è dichiarato, senza perder momento di tempo in tutte quelle prove, si deve por mano all'operazione, ch'è il solo rifugio, che si offre, e che ha salvato la vita a molti pazienti: ma fa d'uopo praticarla, quando la malattia non è per

per anche invecchiata ; senza una tal condizione ella precipita i pazienti , e talvolta gli uccide sul fatto stesso . Si dee avere attenzione , allorchè la marcia è in gran copia , d'evacuarla in più tempi per risparmiare le forze . Se questa è bianca , e di buona qualità , si dee molto sperare dall'operazione ; ma se è saniosa , e fetente , forz'è aspettarli la morte . Il *caustico* per fare questa apertura , è sovente da preferirsi agli *strumenti taglienti* . E' soverchio il dire , che dopo l'evacuazione del sacco , dobbiamo praticare le *injezioni vulnerarie* , e *deterfive* : quanto agli altri rimedj , bisogna cavargli dall' Articolo della Tifichezza , colla quale ha una massima relazione il morbo , di cui ragioniamo .

IDROPISIA DEL PETTO.

Questa specie d'Idropisia è più comune di quello si creda ordinariamente : prova ciò quanto basta l'apertura dei cadaveri : ella non è meno difficoltosa a rilevare , di quello s'ialo l'empiema , da cui non si può distinguere , se non per mezzo degli antecedenti : questi due morbi trovansi anche con frequenza insieme : facilmente vengon confusi coll'asma , massime quando il rumore , ed il soffiamiento del petto non accompagnano questa seconda infermità : equivoco per altro , che può essere di sommo momento . L'*idropisia del petto* trovasi spesso complicata con quella del pericardio ; ma rarissime volte con quella del mediastino , e della pleura , che si considera come infaccata , tuttochè sienosi trovati nella sostanza del polmone dei veri *cisti* , o sacchi pieni d'acqua , ai quali s'addice forse meglio tale denominazione : l'*ascite* , e l'*anasarca* s'uniscono ancora spessissimo all'idropisia del petto : e l'*anasarca* è pure assai comunemente la sorgente di tutti gli altri malori . Sopra il solo concorso di più segni noi possiamo congetturare , avervi dell'acqua nel petto : tali sono il respiro difficoltoso , e frequente , molto più faticoso in una situazione orizzontale : questa è maggiore la notte , che il giorno , specialmente nel primo sonno , cui interrompe con sommo incomodo : molti sono perfino forzati ad abbandonare il letto , non potendo respirare se non sulla seggiola , ed anche piegati davanti : una sensazione di gravezza sul diaframma , con un dolore alla cartilagine xifoide , e talora alla spalla , o al braccio del lato offeso : la tosse con maggior frequen-

za secca, che umida; ma i più negli ultimi tempi sputano del sangue, come nella peripneumonia: io però ne ho veduti di quelli, che non avevano, nè tosse, nè sputo. La febbre lenta con esacerbamenti notturni, e con brivide irregolari, accompagna per lo più questa infermità: il polso è picciolo, disuguale, e intermittente: la sete è talora inquietante; ma meno che nell'ascite: l'enfiagione edematosa delle gambe, e dello scroto, d'ordinario va innanzi all'idropisia del petto: dove per lo contrario è la conseguenza dell'empie-
ma: l'edema sul petto, e nel braccio; il gonfiamento del volto: la tensione del ventre; la curvatura delle unghie, ec. sono ancora segni, che s'incontrano talvolta; per non far parola delle palpitazioni, delle sincope, dei sudori notturni, e d'altri accidenti comuni a tutte le infermità. Ma non vi ha cosa, che meglio caratterizzi l'idropisia del petto, della fluttuazione dell'acqua, che alcuni pazienti sentono, e distinguono: si può anzi accostando l'orecchio al loro petto, rilevare una specie di gorgogliamento, fatto più, o meno sensibile dall'agitazione.

Afficurano tutti gli Autori, che coloro, i quali sono investiti dell'idropisia del petto, come dall'empie-
ma, non possono coricarsi sopra il lato offeso; questo è vero; ma non lo è sempre: ho io veduto il contrario talvolta nell'uno, e nell'altro caso; ne sono anche stato instruito dall'apertura dei cadaveri, e importa infinitamente l'esserne avvertiti. L'inondazione è talora tutta rinchiusa nel pericardio: ma non abbiamo alcun segno, che possa farci conoscere questa specie d'idropisia, benchè frequentissima: io però non applico questo nome a quella picciola quantità d'acqua, che trovasi quasi in tutti i cadaveri, e ch'è il prodotto della maggior parte delle malattie; ma bensì a quel cumulo, che dà al pericardio molto maggiore estensione di quella, che aver dovrebbe. Ho osservato in alcuni infermi, che si trovavano in questo caso, una singolar lentezza di polso: il Diemerbroek ha fatto l'osservazione medesima: ne ho veduto uno, che non aveva più di venti pulsazioni per minuto, trovandosi le sue forze, e il suo appetito in ottimo stato: eppure questo segno, se è tale, è mancato nella maggior parte degli infermi, che ho avuti fra mano: torna però sempre bene il sapere, che talvolta s'incontra, e fors'anche com-
fre-

frequenza. L'idropisia del mediastino, e quella della pleura, molto rare, sono più difficili a rilevare.

La peripneumonia, l'asma, la tifichezza, e le altre malattie del petto; con grandissima frequenza danno luogo a quella, che è il soggetto del presente Articolo: ella è ancora una conseguenza delle scrofole, dello scorbutto, del malfrancesco, ec. I cachetici, e le persone di costituzione debole, vi sono più degli altri soggetti. Sono veduti parecchi infermi, per quanto se ne è potuto giudicare, viver più anni con dell'acqua nel petto: non pare altresì, che possa dubitarsi, che molti sieno stati risanati da un tal morbo; ma è anche certissimo, che se ne potrebbe contare sopra tutte le osservazioni, che abbiamo fatto intorno a tal soggetto, poichè non vi è che l'apertura dei cadaveri, che possa darci una piena sicurezza della sua esistenza. La febbre acuta, che sopravviene all'idropisia del petto, la grande oppressione, gli sputi sanguigni, le sincopi frequenti, ec. annunziano la morte.

Le osservazioni anatomiche sono in questo luogo numerosissime; queste ci insegnano, che trovati di rado il polmone sano, e semplicemente lacero; ma che trovati comunissimamente calloso, scirroso, suppurato, putrido, e cancrenato, e che la maggior parte delle idropisie del petto sono la conseguenza della peripneumonia, della tifichezza, ec. Si è anche veduta la pleura fissa, e cartilaginosa, il diaframma esulcerato, le ossa cariate, ec. L'acqua, che cova nel petto, è talvolta limpida, e spumosa, ma il più delle volte limacciofa,fangosa, saniosa, purulenta, e fetente: si è incontrato un liquore lattiginoso, proveniente dallo sfiancamento del condotto toracico. L'idropisia del mediastino, ed altre infaccate, sono, come abbiain detto, molto rare; ma quella del pericardio è comunissima: si è anche veduto questo sacco, di pari che la superficie del cuore, esulcerato, contenente della sanie, e della marcia, o incollato a questa viscera. Sono finalmente trovati degli scirri, delle suppurazioni, delle putrefazioni, e delle cancrene, nel timo, nel fegato, nella milza, nel pancreas, nello stomaco, nelle budella, ec.

Coloro, che prendono l'idropisia del petto per l'asma, non lasciano di praticare la cavata del sangue, e per tal mezzo d'abbreviar la vita ai loro infermi. L'idropisia, di cui parliamo, vuole la stessa medicina.

dicatura da noi proposta nell'Articolo generale: si rag-
 gira questa intorno ai *catartici*, ai *fortificanti*, agli *ape-
 rienti*, e singolarmente *diuretici*. Non vi è dubbio, che:
 i purganti idragoghi, non abbiano operato alcune gua-
 rigioni; ma colla maggior frequenza altresì hanno pre-
 cipitato i pazienti nello stato contrario, vale a dire:
 nel marasmo: non vi è luogo di temere lo sconcerto
 stesso dai diuretici, i quali per altra parte disimpegna-
 no il petto con più sicurezza, come ci vien conferma-
 to da numero grande d'esempi. I purganti, i quali
 par che sieno stati amministrati con riuscita migliore,
 sono, la gialappa, il turpito, il diagridio, l'elatterio,
 la polvere cornacchina, il mercurio dolce, ec. Si è as-
 sai sovente osservato, come la gomma-gutta si addiceva
 meno a questa idropisia, che alle altre. Non mi farò qui
 a noverare la copia d'altri rimedj, che sonosi impiega-
 ti in questo male: dirò soltanto, che i Pratici hanno
 dato la preferenza alle *Scille*, alla brionia, al rabarba-
 ro, alla cassia legnosa, ai centogambe, allo zafferano,
 e al sale di Marte; al tartaro calibeato, al sale di toma-
 risco, ec. Ma il *vino*, e l'*ossimele scilítico* in questa oc-
 casione mi sono sempremai sembrati superiori agli altri
 diuretici tutti: ho veduti altresì ottimi effetti dal *Ker-
 mes minerale* dato per lungo tempo, e in picciole dosi.
 I depuranti, i sudorifici, e gli antiscorbutici, che pur
 vengon proposti, convengono meno all'idropisia del pet-
 to, che alla malattia, dalla quale ella può dipendere.
 I bechici sono palliativi, de' quali non si potrà far di-
 meno: possono anche operare più specialmente, quando
 è necessario di sostentare lo spettoramento.

Tutto il da noi proposto dee però cedere alla pun-
 tura, la quale, a dir vero, non porta via, che il so-
 lo prodotto del male, ma che sormonta un ostacolo,
 che fa testa agli altri rimedj: non si può porre in dub-
 bio, che per tal mezzo non sienosi risanati parecchi in-
 fermi. La quantità d'acqua, che si può estrarre per
 mezzo di tale operazione, fa sbalordire: se ne è vedu-
 ta scaturire fino a sei pinte, senza che il paziente sia-
 ne rimasto apparentemente indebolito; ma è cosa più pru-
 dente il cavarne meno quantità per volta. Nulladime-
 no i segni equivoci di questo morbo non permetton sem-
 pre a un Medico saggio il determinarsi per la puntura,
 sapendosi altresì, che più e più volte è stata praticata
 con tragico evento, con rammarico estremo di coloro,

ai quali stava a cuore la vita dell'infermo ; ma è permesso il tentare alcuna fiata qualche mezzo in una infermità riputata oggimai incurabile . Una sola puntura non basta ; bisognando talvolta replicarla più volte : la cosa intal caso è più breve , facendo l'apertura con un istrumento tagliente , e conservarvela , fino a che sia seccata la sorgente . Abbiamo eziandio alcune osservazioni molto favorevoli al *cauterio* , ed anche alle scarificazioni delle gambe .

PALPITAZIONE DEL CUORE .

Non ho gran cosa da esporre intorno ai mali del cuore , perchè le vedute dei Pratici sono state perpetuamente sopra di ciò limitatissime : si troverà però rispetto a questa materia tutto quello , che ci possiamo promettere dalle più profonde cognizioni , e della più consumata esperienza nella seconda edizione del Trattato del Cuore di M. *Senac* primo Medico del Re . Il male, che fa il soggetto del presente Articolo, si manifesta al tatto , e alla vista : alcuna volta anche si sente all'orecchio ; ma è sovente difficile il distinguere la palpitazione del cuore essenziale della *sintomatica* . Non si potrebbe dubitare , che il moto straordinario di questo agente principale della circolazione , di cui si risentono le arterie tutte , non sia convulsivo : questo è talora sì violento , che intacca il respiro , e la voce , che sloga perfino , e sfianca le costole : quando è leggiero , si può confonderlo col tremore , il quale nel cuore non è , se non se uno stato di debolezza , bastantemente indicato dal polso languido , e disuguale , dall'abbattimento , degli svenimenti , dai sudori freddi , e da altri forieri della morte . Il polso nella palpitazione è picciolo , disuguale , intermittente , e soggetto ad altre variazioni : provansi eziandio in questo male delle vertigini , dei bagliori , delle flatuosità , ec. Precede talvolta la sincope : s'unisce all'asma convulsiva , all'idropisia del petto , alla leucostemmazia , ec. I cachetici , le isteriche , come quelle dal color pallido ; gl' ipocondriaci , gli scorbutici , i gottosi , e gli asmatici : quei che vivono nella crapula , e nell'inazione , i valetudinarij , ec. vi sono più sottoposti . La pletora , la soppressione di sgorgi abituali di sangue , il disseccamento dei mali cutanei , e delle vecchie ulceri , le malattie di stomaco , le febbri , ec. vi danno motivo con frequen-

quenza: è ancora eccitata dall'estrema allegrezza, dal timore, da terrori, da disgusti, e da altre passioni d'animo; da certi particolari odori; da un violento esercizio, e somiglianti.

E' noto, che la palpitazione proveniente da una cagione nota, e passeggera non è da temersi, e che si guarisce altresì con facilità la sintomatica, e quella, che dipende dalla sola affezione dei nervi; ma se questa riconosce un vizio locale, che non lascia di renderla frequente, e anche continua, dobbiamo considerarla incurabile; imperciocchè quand'anche si potesse giungere a rilevare la natura dello sconcerto, che la produce, non avremmo niente più avanzato, mentre ci mancherebbero perpetuamente i mezzi per rimediarvi.

Ci ha l'*Anatomia* scoperto varie infermità del cuore, che posson dar luogo a quella, di cui parliamo: tali sono l'infiammazione, e la suppurazione di questa viscera: dei tubercoli nelle sue varie parti: delle ulcere nella sua superficie: la sua straordinaria grossezza: gli stivamenti de' suoi ventricoli, come delle sue auricole, e de' suoi grossi vasi. Sonosi vedute con molta frequenza delle ossificazioni dell'aorta, dell'arteria polmonare, delle arterie coronarie, e delle valvule: delle concrezioni pietrose, tanto nel corpo di queste animali, che nei ventricoli, e nel pericardio: le vene coronarie varicose, e stivate. Abbiamo incontrato delle fistuosità, dell'acqua, della sanie, della marcia, e dei vermi, entro il pericardio: questo sacco carico di grasso, carnoso, cartilagineo, ossificato, e strettissimamente unito alla superficie del cuore. Sonosi osservati degli aneurismi nell'aorta, e nell'arteria polmonare, e la dilatazione straordinaria, ma semplice di questi vasi: molti pretendono d'aver veduto dei vermi nei ventricoli del cuore; ma io mi prenderei la permissione di dubitarne. Ultimamente sonosi trovate le costole esposte alle percosse del cuore, rotte, staccate dalle loro cartilagini, e slogate: per non parlare dell'idropisia del petto, e dei diversi sconcerti, sì del polmone, che delle viscere del basso ventre.

In coloro, che soffrono delle palpitazioni di cuore, sono spesso necessarie le *cavate del sangue*; ma è inutile il dire, che queste non convengon mai, quando v'è sono dei segni sensibili di spollamento di qualunque natura essere si possa: danno un lieve ajuto nella palpi-

tazione

tazione idiopatica : non si lascia di praticarle , perchè son palliative , di pari che gli altri rimedj tutti , che si posson fare in questo caso . Utili sono i *purganti* , non solo , quando lo stato delle prime vie , ed anche della testa , gli ricchieggiono , ma eziandio in parecchie altre circostanze ; tuttavia non dobbiamo far uso , se non dei più miti , e non moltiplicargli . Gli *allentanti* , e i *rinfriscanti* , come la bevanda più semplice , il latte , il siero , le acque minerali , tanto termali , che acide , e marziali , sono i rimedj praticati con più felicità . Lo zafferano di Marte , il tartaro marziale , il sale di tartaro , i centogambe , il sapone , e gli altri *aperienti* fanno anche gran bene . Ci serviamo anche con efficacia , massime contro i *tremolamenti del cuore* , degli *stomachici* , degli *assorbenti* , e degli amari : tali sono il fumosterno , l'aristolochia tonda , il rabarbaro , la china , il garofano , la cannella , l'elixir proprietatis , ec. Gl' *ipnotici* in questo caso son detestabili ; ma si possono in vece loro sostituire altri *calmanti* , a cagion d'esempio , il nitro , la polvere temperante , il liquore anodino minerale , il sale sedativo , ec. Si ritraggono vantaggi grandi dagli *antispassmodici* , vale a dire , dalla canfora , dal castoreo , dal succino , dai fiori di benzoino , dall'acqua di fior d'arancio , dalla melissa , dal tiglio , ec. A molti finalmente giovano i clisteri purgativi , e carminativi ; le fomentate emollienti ; i mezzi bagni , il pediluvio , le mignatte applicate alle emorroidi , ec. Ma , io torno a ripeterlo , noi non dobbiamo perder d'occhio , per la scelta dei rimedj , l'infirmità , che può conservare la palpitazione , o che può averla cagionata .

LA SINCOPE.

La cardiaglia , la debolezza , il pallor del volto , l'oscurarsi della vista , il tintinno delle orecchie , la perdita del moto , e del senso , e le estremità fredde , caratterizzano imperfettamente la *Sincope* ; ma ciò , che la distingue più particolarmente dall'apoplessia , o da altri morbi , nei quali vi entra pure la perdita del moto , e del senso , si è lo stato del polso , e del respiro , di cui par , che la sola sincope tronchi le funzioni , a tal segno , che molti infermi sono stati presi per morti , ed anche abbandonati con frequenza come tali : nulladimeno le membra in questo stato conservano la loro flessibilità ; e questo è per avventura il solo segno di

vita , che possiamo scuoprire . E' noto bastantemente , che la Sincope ha varj gradi , i più deboli de' quali si denominano *svenimenti* (*typothimia*) : è questa comunemente annunziata dai segni da noi riferiti in primo luogo ; ma ella investe talora in un subito , e senza summate ; incerta è la sua durata ; comunemente è d'alcuni momenti ; talvolta d'una , o di più ore , ed anche di più d'un giorno : se uno si ricovra , prova una straordinaria stanchezza , che si dilegua col tempo .

La debolezza , e lo spossamento , sorgenti ordinarie del morbo , di cui parliamo , nascono spesso da mancanza d'alimenti , o da alcuna grande evacuazione ; dalla stessa evacuazione delle acque , o di qualunque altro liquido covante in alcuna parte del corpo . Le passioni violente ; la veduta d'alcuno oggetto dispiacevole , come d'un corpo morto , d'un serpente , d'un sorcio , ec. posson far cadere nella Sincope . Certi odori , sì gradevoli , che disgustosi , come della rosa , del gelsomino , del muschio , dell'ambra , ec. i vermi , i narcotici , i veleni , e gli alimenti perniciosi , danno similmente motivo a questo male . Può esser finalmente la conseguenza della gotta irregolare , delle affezioni isterica , e ipocondriaca , dei parti difficili , d'una cavata di sangue , ec. I cachetici , le persone deboli , e i convalescenti , vi sono , più che gli altri , soggetti . E' talvolta la sincope il forier delle febbri : ella è ancora nel numero de' sintomi di quella , come di varj altri mali : *sintoma* perpetuamente *formidabile* . Disse Ippocrate , che coloro , che cadono in Sincope , senza cagione evidente , morirebbero in un subito ; e l'esperienza conferma pur troppo la veracità di questo Aforismo . Nulla si teme tanto nella Sincope , quanto i suoi frequenti attacchi , e la sua durata ; ma altri non se ne fa gran paura , quando nasce da cagione accidentale , e passeggera .

L'anatomia ci svela il cuore strettamente unito al pericardio ; questo sacco carico di grasso , pieno d'acqua , di sangue , di marcia ; il suo laceramento , od il suo annientamento . Si è trovato il cuore d'una grossezza smisurata , infiammato , e suppurato : delle ulcere nella sua superficie , e nelle sue appendici ; la prodigiosa dilatazione dei suoi ventricoli , e delle sue auricole : dei tumori , e delle pustule nelle sue varie parti : delle ossificazioni , tanto delle arterie coronarie , che dei vasi grossi , e delle loro valvule . Si è trovato in quei , ai qua-

quali era stato cavato molte volte sangue, o che ne avevano sofferto grandi sgorghi, le vene piene d'aria, lo che si rilevava più manifestamente in quelle del cervello. Credo inutile il riferire in questo luogo l'infiammazione, e la suppurazione del polmone, del mediastino, della pleura, e del diaframma; le inondazioni del petto, e i varj sconcerti dello stomaco, del fegato, del pancreas, della milza, dell'utero, delle ovaie, ec. Ma debbon parlare delle concrezioni sanguigne, o linfatiche, che s'incontrano tanto comunemente, sì nel cuore, che nelle auricole, e nei vasi grossi, di che si è fatto tanto rumore, sotto il nome di *polipo del cuore*: morbo, intorno a cui si è scritto, e ragionato tanto, e che alla perfine non esiste: io non temo d'afficurar, che coloro, i quali pretendono d'averne trovati, non parlano, che il linguaggio del pregiudizio, o dell'ignoranza.

Se per *polipo* si dee intendere un'escrescenza carnosissima, o fungosa, quale con frequenza s'osserva nelle narici, egli è certo, chechè altri se ne possa dire, che questo *non esiste*: farebbe, secondo me, cosa ben singolare, che nell'esame di ben due in tre mila cadaveri non mi fosse venuto fatto d'incontrare ciò, che persone, le quali hanno a mala pena assistito all'apertura d'alcuni pochi in tutta la lor vita, pretendono d'aver rinvenuto sì comodamente: veramente ai dì nostri nelle menti illuminate ciò non vien più dubitato, e queste fanno a dir vero menzione di *concrezioni*, che si è voluto appellar *polipose*; ma è troppo noto, che quei corpi bianchicci, fibrosi, in apparenza, e talvolta sommamente compatti, sono meramente sanguigni, o linfatici, e che non appartengono ai ventricoli, e alle auricole, che per accidente, vale a dire, a motivo delle colonne, e delle briglie delle valvule, nello spazio di mezzo delle quali si è informata, e impegnata questa materia *accrecibile*, come per tante radici. Ma simili concrezioni, per quanto compariscono solide, non posson esser elleno considerate, come la *cagione della Sincope*, o della morte improvvisa? Se trovassene ogni dì delle simili in tutte le generazioni di morbi, sì lenti, che acuti, siccome l'abbiam già vedute nei precedenti Articoli; questo non accade egli piuttosto, a motivo del cessamento del moto, e del calore del sangue nel momento, o poco tempo prima, o anche dopo la mor-

morte, per una particolar disposizione di questo liquido, che lo rende più atto a fissarsi, siccome si vede seguire in quello, che si è cavato colla flebotomia, e che si chiama *colloso*, o *infiammatorio*, differentissimo dal sangue coagulato?

Non vi è chi non sappia ciò, che debba farsi per dileguare la sincope, nè vi sono neppure chiamati i Medici. Si stende il paziente sulla schiena in un luogo, ove possa respirar l'aria pura; se gli gitta dell'acqua fredda sul volto; si scuote, se gli fa il solletico, o si procura di fargli sentir dolore: se gli fa annasare dell'aceto, dell'acqua della Regina, dell'acqua dei Carmelitani, dell'acqua di Lucia, lo spirito di sale ammoniac, ec. Posson giovare anche gli sternutatorj, tuttochè vengano poco adoperati. Si applicano anche dei crostini di pane inzuppati nel vino aromatizzato alle palme delle mani, alle piante de' piedi, alla regione dello stomaco: s'invilluppano l'estremità fredde con drappi caldi; si fanno delle frizioni, ec. Ultimamente s'amministrano internamente dei *cordiali*, e dei *cefalici*, come il buon vino, l'acqua di cannella, l'imperiale, la triacale, ec. Ci contentiamo di versarne loro in bocca, quando non possono inghiottire; ma questo si dee fare con cautela, per timore, che questi liquori non colino entro la trachea arteria, e non rendano questo accidente la malattia mortale, come abbiám veduto accadere. Posson dar qualche ajuto i clisteri più stimolanti, di pari che le coppette a taglio, i vescicanti, ec. La *cavata di sangue* nel tempo del parossismo, rade volte è necessaria, e spesso pericolosa: il sangue stesso tentato, stenta a scorrer fuori; ma questa può essere un preservativo, o palliativo in altri tempi. S'impedisce il ritorno di questo male, coll'indirizzar le sue mire verso le cagioni, che hannolo prodotto: vi è sempre mai essenzialissimo il governo: vi sono spesso necessarij gli emetici, e i purganti; o almeno si dee tener obbediente il ventre con altri mezzi. Gli assorbenti, gli stomachici, e gli amari, sono i rimedj con più familiarità impiegati, di pari che i fortificanti marziali, nati fatti per dar l'azione al cuore, ed ai vasi.

IL SINGHIOZZO.

E' noto, che il semplice, e passeggiero è la più leggiera di tutte le indisposizioni; ma quando dura lun-

go tempo, è un morbo, e bene spesso de' più ostinati. Il *singhiozzo* è talora periodico, ma i suoi accessi di rado son fissi, e determinati; incertissima si è la sua durata; si può contare per giorni, per settimane, per mesi, o per anni; poichè si è veduto durare fino per trenta anni: ha il *singhiozzo* più gradi, e talora è sì violento, che può sentirsi di molto lunghi, e ne possono i pazienti restar soffogati. Le persone voraci, e i bevitori; i bambini, le isteriche, e gl' ipocondriaci, son più degli altri *sggetti al singhiozzo*, sì accidentale, che abituale: questo secondo ha spesso la sua *sorgente* nella soppressione delle evacuazioni abituali; nella repercussione della gotta, nel regresso delle resipole, e d'altri mali cutanei: i rei fughì, che covano nello stomaco, gli emetici, i purganti drastici, i veleni, ec. danno motivo all' uno, e all' altro: è ancora il medesimo un accidente, che sopravviene alle febbri acute, all' infiammazione dello stomaco, del fegato, o d'alcun' altra viscera, alla passione iliaca, al morbo colera, alla disenteria, all' emoragia; e allora passa perpetuamente per sintoma di rea indole.

Le aperture dei cadaveri hanno scoperto il polmone infiammato, e un' infermità d' altri sconcerti nel petto: si è veduto lo stomaco rigurgitante di bile, e d' altri rei fughì; il fegato d' una grossezza mostruosa: questa viscera infiammata, di pari che il ventricolo, gl' intestini, i reni, la vescica, ec. E' stato trovato scirroso l' epiploon, e strascicante lo stomaco: ultimamente sonosi vedute delle putrefazioni, e delle cancrene in tutte le parti per non far parola delle piaghe, dello slogamento della cartilagine xifoide, ec.

Le circostanze, che son precedute al *singhiozzo*, o che lo accompagnano, debbon farne variare la *medicatura*. L' *accidemale* si dileggia per se medesimo, o colla semplice bevanda fredda: si può ancora fermarlo, sospendendo per alcun tempo il respiro: l' applicazione, o la contenzion dello spirito, la sorpresa, ed altre affezioni dell' anima producono l' effetto medesimo. Per l' *abituale* fa per lo più bene la cavata di sangue: non si debbon lasciare indietro gli eretici, e i purganti, di pari che i clisterj rinfrescanti: efficacissimi vi sono gli *allentanti*, come la bevanda copiosa, il tè, il siero, le emulsioni, il decotto, il riso, l' olio di mandorle dolci, ec. Dopo questi rimedj generali, si dee far

far uso degli *stomachici*, e degli *assorbenti*, cioè, della menta, degli anaci, dell' aneto, della china, del corallo, del cascìu, del diascordio, della triaca, ec. sono talora con riuscita amministrati i *deosfuenti*, come, le radici aperitive, il rabarbaro, i centogambe, i marziali, l' aceto scillitico, ec. Gli *antispasmodici*, ed i *calmanti*, convengono anche molto in questo male: tali sono lo zafferano, il castore, il succino, il liquore anodino minerale, il laudano, il diacodio, ec. Tuttavia debbonfi amministrare gl' *ipnotici* con riserva: ultimamente si è avuto ricorso ai *sudorifici*, al latte, alle acque di Forges, di Passy, di Vals, di Balaruc, ed altre minerali. Hanno fatto del bene anche i bagni, di pari che le fomenta, e le pittime colla menta, colla salvia, colla ruta, coll' assenzio, col garofolo, colla canfora, colla triaca, ec. I linimenti rilascianti col grasso umano, con quello d' orso, ed altri; e finalmente le coppette a vento, applicate allo stomaco, e alla schiena, hanno prodotto de' buoni effetti.

Molti dei divisati rimedj posson essere anche adoperati pel *singhiozzo sintomatico* delle malattie acute: tali sono il brodo lungo di pollo, il siero, le emulsioni, l' olio di mandorle dolci, il corallo, la china, il diascordio, il liquore anodino minerale, il castore, il diacodio, ec. si può anche far uso nei casi medesimi delle pittime rilascianti, e fortificanti, delle coppette, ec.

S E Z I O N E I V.

Malattie interne del basso Ventre.

L' I N D I G E S T I O N E.

LA vera *cognizione dello stomaco* è nella Medicina forse la più importante, e la più trascurata. La costituzione di questa viscera, particolare a un individuo, non s' assomiglia a quella degli altri, più di quello assomigliansi i tratti del volto: una tal differenza, che ci è unicamente nota da alcuni effetti, è prodigiosamente variata; e fra molte migliaia d' uomini a grande stento due si troverebbero, che avessero a questo riguardo le medesime facoltà. Per ogni stomaco vi è una

è una certa data dose d' alimento , oltre i 'limiti della quale le sue funzioni sono sconvolte : ve ne sono di quelli , com' è noto , che ne vogliono pochissimo , dove se ne veggiono altri , che reggono a qualunque trasmodamento : quante persone non hanno bisogno di riposo , e anche di sonno dopo i loro pasti , dove per lo contrario i più non digeriscono a dovere , se non se nell' esercizio ? L' acqua per la maggior parte è il migliore di tutti i dissolventi ; eppure si sa , che ve ne sono di quelli , che hanno bisogno del vino , e anche dei liquori . Il caffè , la cioccolata , ec. s' addicono ad alcuni , e fanno del male ad altri : il latte , il migliore peravventura di tutti gli alimenti , è il più pernicioso : le frutta , i legumi , l' olio , il burro , la carne dei quadrupedi , degli uccelli , dei pesci , ec. producono alla giornata in differenti soggetti effetti contrarissimi : si sa , che molti hanno un' aversione invincibile per una specie d' alimento , come pel latte , pel formaggio , per l' anguille , per l' ostriche , per varie spezie di frutta , ec. che piacciono alla maggior parte ; per non parlare del bizzarro appetito delle ragazze , e delle donne incinte , ec. Noi non c' impegneremo nell' esporre in questo luogo per minuto queste strane varietà : elle sono bastantemente note , senza però esservi fermati , quanto richiederebbe veramente l' importanza del soggetto . Non si può dubitare , che lo stato dello stomaco non abbia una grandissima relazione con quello di tutte le altre parti , e singolarmente della testa , come abbiamo detto più volte ; quai lumi non darebbe all' arte , ch' esercitiamo , questa relazione conosciuta a dovere ? Ella è cosa senza dubbio sorprendente , che nelle immense fatiche , che si sono fatte intorno all' economia animale , non si trovi quasi alcuna ricerca , che abbia avuto questo oggetto .

Lo stato della bocca , i rutti , e il vomito , possono farci conoscere la natura delle *materie depravate* , che covano nello stomaco , e che sono l' effetto delle *ree digestioni* ; ma è qui appunto , ove siamo forzati di fermarci , poichè faremmo dei vani sforzi per portarci fino al vizio organico di questa viscera . Queste *materie* sono *acide* , *amare* , *mucose* , o *putride* : noi ci faremo ad esaminarle separatamente . 1. I rutti agri , la tumefazione , lo sconvolgimento , e l' ardore dello stomaco , il dolore , o gravezza della testa ; la tosse ,
il

il singhiozzo , la costipazione , e talvolta si tenesmo , sono i segni di ciò , che addimandasi *crudezze acide* , le quali non sono , che una specie di putrefazione , che contrae questa qualità . 2. L' amarezza della bocca , la lingua arida , la caribalgia , il calor delle viscere , il color giallo , e verdastro delle materie , che si vomitano , lo scioglimento del ventre , ec. manifestano bastantemente i *sughi amari* , che dipendono principalmente dal reflusso della bile verso lo stomaco . 3. La bocca pastosa , la tenacità della saliva , la perdita dell' appetito , le flatulenze , i rutti , che dopo cinque , o sei ore hanno il gusto , e l' odore degli alimenti , che si son presi ; le *mucosità* , che si vomitano , e si rendono colle fecce : alcuna volta finalmente la lienteria , provano quanto basta , che lo stomaco è intonacato d' una specie di moccio , che ammortisce il suo senso , e lo rende poco atto alla concozione degli alimenti . 4. Il gusto di putrefazione , o d' uova covate , che sentesi in bocca , e che vi conservano i rutti dell' indole medesima ; la gravezza di stomaco , le ansietà ; le flatulenze ; i vomiti fetenti , e lo scioglimento del ventre , non ci lasciano da dubitare , che lo stomaco contenga ciò , che addimandasi *evuacuzzi nidorosi* ; vale a dire , materie , che hanno sofferto una putrefazione alcalica .

Il *disgusto* , ed anche l' aversione per gli alimenti , sintoma comune a quasi tutte le infermità , accompagnano d' ordinario tutte le divise indispofizioni : elle sono anche seguite da una tristezza sovente invincibile , da intorpidimento nel capo , da svenimenti , da ansietà , da flatulenze , dalla tensione agl' ipocondri , dal vomito , e da altri accidenti , che ritraggono la loro origine da ree digestioni . E' altresì l' indigestione il prodotto dell' intemperanza , e quei che hanno lo stomaco in ottimo stato , non ne sono al coperto ; ma la medesima è più rea , e da più da temere , allorchè incontra i rei sughi , de' quali abbiamo parlato . L' indigestione viene annunziata da dolori di viscere , talora acutissimi , da ansietà , dalla tumefazione dello stomaco , da rutti , dal singhiozzo , dal vomito , dallo scioglimento del ventre , ec. Il sopimento , il delirio , ed altri gravissimi sintomi , talvolta l' accompagnano ; di pari che la febbre più , o meno energica , che inganna alcuna fiata i Medici più avveduti , e fa loro prendere uno per altro male .

Prova la quotidiana esperienza , che la *contensione di spirito* turba la digestione : si può anche , senza ipotesi , accertare , che tutto quello , che ferma il corso libero della materia , qualunque ella siasi , che i nervi portano allo stomaco , ne altera le funzioni : la vecchiaia , e lo spoffamento , gli rendono languidi : i vizj della saliva , e la mancanza di trituramento nella bocca , producono gli effetti medesimi ; per non parlare dei vizj organici dello stomaco , e delle parti vicine , che risguardano altri Articoli . Gl' ipocondriaci , e le isteriche , son sottoposti a putrefazioni acide : i flemmatici , e quelli , che sono più suscettibili delle flussioni catarrali , provano sovente l' indigestione mucosa , dalla quale non sono esenti i melancolici : le persone violente , e le più inclinate alla colera , sono esposte a rigurgitamenti di bile : i valetudinarij , e quelli , che mangiano molta carne , generano maggior putredine . Tutte le diviate *disposizioni dello stomaco* , alle quali non mai si bada quanto bisognerebbe , sono tuttavia da temersi grandemente per le loro conseguenze : le medesime posson esser la sorgente di molte infermità , sì acute , che croniche : è cosa evidente , che le febbri , intermittenti la gotta , la nefritide , le ostruzioni , lo scioglimento del ventre , ec. d' ordinario dipendono da quelle : non si potrebbe dubitare , che le putrefazioni acide non sieno il fondamento di molte croniche infermità , che i sughi amari , e putridi non ispiantino la via alle febbri più acute ; tuttavia non bisogna farsi a credere , che la putrefazione , e il depravamento delle materie contenute nelle prime vie , costituiscano , siccome molti credono , la febbre putrida ; ma possono cagionarla col passare entro la massa del sangue .

Le *indigestioni per ripienezza* , o sieno di crapula , hanno più gradi ; ve ne sono delle pessime , ed anche delle mortali : si stimano più terribili , allorchè trovansi unite all' ubriachezza : il vomito , e lo scioglimento del ventre ne sono le crisi ordinarie . La svogliatezza nei fanciulli , e nei vecchj , nei convalescenti , ed in quei , che soffrono un abituale scioglimento di ventre , è sempre da temersi . Ha osservato il *Baglivi* , come il grande appetito , che soppraviene in un subito nelle malattie croniche , dopo una lunga svogliatezza , annunzia la morte ; ma questa sua osservazione non è stata perpetuamente confermata dall' esperienza .

L' apir-

L' *apertura dei cadaveri* non ci somministra grandi lumi rispetto alla vera sorgente delle ree digestioni ; ma ci insegna, come il più delle volte lo stomaco non soffre , se non relativamente ad altre parti , che sono la primaria sede del male . Si è incontrata questa viscera inzuppata di varie materie , delle quali abbiamo parlato: si è veduta sopraccaricata di grasso , prodigiosamente dilatata , o raccorciata ; le sue tuniche estenuate, i suoi imbrigliamenti cancellati , piena zeppa di bevanda , o di flatuosità ; intonacata d' un sugo nero, d' una crosta grassa , e fissa, contenente delle pietre, ec. Sonovisi trovate delle callosità , dei tubercoli , degli scirri, delle ulceri, della putrefazione , dei fori , ec. Si è finalmente trovata fuor del suo sito , e calata di là dal bellico : è noto , che questi slogamenti sono comunissimi , quando vi è l' epiplocele . Tutti questi sconsciati , come abbiain detto , non sono ordinarij: ma sono più comuni quelli, che ora scorreremo: tali sono gli itivamenti scirrofi del fegato ; il suo colore bianchicchio, e piombino, la sua aderenza allo stomaco ; la sua smisurata grossezza , che giunge talora fino al bacino ; il suo disseccamento ; la sua sostanza contenente degli abscessi , dei tubercoli , delle idatidi , e con frequenza esculcerata , putrida , e cancrenata . Si trova ancora con maggior frequenza la milza estremamente picciola , lacera , callosa ; in uno stato di putrefazione , e talvolta intieramente distrutta : finalmente sonosi osservati gl' intestini prodigiosamente gonfiati , cancrenati , ec. degli scirri, delle suppurazioni , e dei marcimenti nel pancreas , nell' epiploon , nel mesenterio , nei reni , nella matrice , ec.

Dopo l' esposizione fatta dee altri comprendere , che la medicatura , la quale risguarda i *vizi delle digestioni*, o dello stomaco , è ravvolta in grandissime difficoltà ; di modochè noi non veggiamo , che tentativi . Ci sono esattamente notti i mezzi di combattere alcuni effetti , che si manifestano per mezzo dei segni da noi additati ; ma le nostre nozioni non si stendono per avventura più lontano ; e se le nostre congetture s' azzardano d' oltrepassare questi confini , la riuscita non ne prova perpetuamente la giustezza . Tuttavia non è dubbio , che tutti questi stati , siasene poi quale esser si voglia la sorgente , non vogliono se non se *evacuarsi* , e un ben inteso governo ; ma siccome in brev' ora

ora si rinnovano , così forza è ricorrere ad altri rimedj: tali sono 1. per le *crudezze acide*, dopo gli *emetici*, e i *purganti*, gli *allentanti*, gli *stomachici*, gli *assorbenti*, e gli *amari*: il rabarbaro, la china-china, l'aloè, i marziali, l'estratto di ginepro, l'*elixir proprietas*, quello del Garus, del Stoughton, ec. sono gli adoprati con maggior efficacia: importa il non ignorare, che in questa disposizione dello stomaco, i vini, le confetture, e le frutta, agevolmente s'inacidiscono: con tutto questo il Boerhaave consigliò più spezie di vini, e perfino l'acquavite: ma vorrei sapere, se ciò, che dice, sia fondato sull'esperienza, o sopra le sue particolari opinioni. 2. Quando nello stomaco domina l'amarezza, dopo avere evacuato tutto quello, che in esso covava, si dee combatterla con gli *allentanti*, ed i *rinfrascanti*; le *acque minerali fredde*, come quelle di Vals, di Passy, di Forges, ec. sono in questo caso d'un grandissimo ajuto: gli *acidi*, sì *vegetabili*, che *minerali*, come il sugo di limone, quello di mele granate, lo spirito di zolfo, di vetriolo, ec. sono eziandio sommamente proficui. 3. Se lo stomaco è sozzato di mocchi, non vi è dubbio, che non si debba procurare di portargli fuori a forza di *emetici*, e di *purganti*; ma questi non produrranno l'effetto, se non dopo d'aver fatto precedere gli *allentanti*: torna anche bene d'amministrargli allora entro un gran veicolo; e le acque di Plombieres, di Vichy, di Balaruc, di Bourbonne, ec. sono nate fatte per tale effetto, e s'uniscono perfettamente con i *purganti*: si fa in seguito uso degli *stomachici aromatici*, *fortificanti*, e *amari*: tali sono la menta, e la salvia, l'assenzio, e la centaurea minore; le mele cotogne, la scorza di cedro, e d'arancia; il rabarbaro, la china, e l'aloè; l'acoro, il cipero, la canna aromatica, la cannella, la noce moscada, il pepe, il garofano, i mirobolani, il cascù; la noce candita, l'oppiata di Salomone, il Mitridato, la triaca ec. Vi si impiega eziandio il vino, e principalmente quello di Spagna, di Cipro, ec. Finalmente giova a molti affaissimo il coprirsi lo stomaco con una buona pelle, ec. 4. Per le *crudezze corrotte*, o sia *putrefazione alcalica*, fa di mestieri, di pari che nei casi antecedenti, amministrare gli *emetici*, e i *purganti*, e fare una buona scelta degli alimenti; quindi si passa agli *stomachi-*

ci, ai fortificanti, agli amari, e agli acidi, a norma che questo stato si è trovato complicato con gli altri: pare che altri siasi servito con molta riuscita della menta, e dell'aurora; dei cotogni, e dei tamarindi della limonata, del rabarbaro, della genziana, ec. Le acque minerali, sì fredde, che termali in questo caso riescono pure utilissime. Dal detto finora risulta, che la *svogliatezza*, la quale, come è noto, è comune a tutte queste indisposizioni, tuttochè non le accompagna perpetuamente, richiede una medicatura variata; e lo prova quanto basta l'esperienza quotidiana.

L'*indigestione per istravizzo*, la quale tende sempre mai verso alcuno degli stati, dei quali abbiamo ragionato, deve esser talora considerata come una malattia grave, il cui aspetto in fatti fa gran paura. L'*astinenza*, e la *bevanda copiosa*, unita ad alcuni clisteri sono comunemente tutto quello, che può farsi di meglio. Le è contraria la *cavata del sangue*; ma non quanto la gente se lo immagina: quando è patente la pleuritide, la febbre violenta, e che si deve anche combattere il sopimento, il delirio, e i dolori intensi, si può benissimo far aprire la vena: tuttavia bisogna allontanare, per quanto è possibile, questa operazione dall'ultimo passo, e lasciar passare, quando l'urgenza non sia somma, le prime ventiquattr'ore. I *vomitivi purganti* in questo luogo sono indubitatamente i più efficaci, ma lo stato dei pazienti non ci permetted'adoperargli perpetuamente: è stato talvolta fatto uso, dopo le discevoli evacuazioni, dei fortificanti, degli amari, o degli acidi; ma questi rimedj di rado son necessari; e par che assai siate sieno stati dati a caso. Finalmente quando vi s'incontra l'*ubriachezza*, dobbiamo esaminare il grado: se questa è leggiera, bisogna combatterla col tè, o colla *limonata*; ma quando è gagliarda, possiamo ricorrere alla *cavata del sangue*, e all'emetico.

I L V O M I T O .

Noi diremo di passaggio, che il *Vomito*, del quale tutti conoscono i forieri, è prodotto dal solo moto dello stomaco, e del condotto intestinale, e non dalla pressione del diaframma, e dei muscoli, del basso ventre, siccome per lungo tempo è stato creduto sull'asserzione del celebre M. Chirac. Siffatta verità, di cui

troverassi la prova nelle Memorie della R. Accademia sotto l'anno 1752. , può grandemente influire , come ben si vede, sopra la medicatura di questo male. Gli alimenti, il vino, i veleni, i rei fughj, dei quali parlammo nell' Articolo precedente, e tutte le materie stimolanti, possono eccitare il vomito. Egli è ancora una conseguenza necessaria dell' infiammazione, dello scirro, dell' ulcera, o di qualsivoglia altro vizio dello stomaco: ma il più delle volte è *sintomatico*, e dipende da mali della testa, del fegato, della milza, dell' epiploon, ec. Non vi è ombra di dubbio sopra l' effetto della micrania, dell' ubriachezza, sì del vino, che del tabacco; delle percosse di testa, ec. dalle osservazioni anatomiche ci vengono manifestati gli altri casi. Egli è pure un *sintoma*, o una *crisi* dei morbi acuti, di tutte le spezie di coliche, ec. una conseguenza della repulsione della gotta, della sciatica, e del reumatismo: della traspirazione troncata, della soppressione dei menstrui, delle orine, ec. si fa inoltre, che il vapor del carbone, la veduta di cose disgustanti, il moto del vascello in alto mare, ec. producono tuttora l' effetto stesso. I fanciulli, i grandi mangiatori, e bevitori; gl' ipocondriaci, e scorbutici; i cachetici, ed i valetudinari; le donne dal color pallido, o oppilate, le gravide, ec. vi sono più che gli altri soggette. Il vomito è alcuna fiata periodico: si è veduto imitare a capello la carriera della febbre quartana: molte persone, che per altro godono sanità perfetta, vomitano ogni mattina; certuni una volta la settimana, una volta il mese, ec. ultimamente vi sono di quelli, che vomitano dopo ogni pasto.

Per mezzo del vomito non solo si restituisce tutto quello, che si racchiude entro lo stomaco, ma eziandio quello, che stanZIA nel duodeno, ed anche nelle altre budella, vale a dire, tutto quello, che altri può avere ingojato, la bile, i fughj, castrico, e pancreatico, del sangue, della marcia, dei vermi, delle pietre, ec. non farò parola di quei vomiti favolosi, dei quali molti Autori privi di lumi, o di troppo buona pasta hanno ragionato. Chi farà mai sì gonzo da credere, che si possano gettare per questa strada dei rospi, delle lucertole, delle serpi, dei topi, dei piccioli gatti, e somiglianti? Il vomito *mucoso*, o *bilioso*, di pari che quello, che viene eccitato dalla quantità, o dalla qua-

lità degli alimenti , è perpetuamente proficuo : molti vomitano ogni mattina una pituita muccosa , senza che sembri quindi pregiudicata la loro sanità ; ma dobbiamo temer tutto , quando si vomitano materie saniose , purulente , nere , o putride . Il vomito abituale senza cagione manifesta , può riconoscere un vizio locale , siasi nello stomaco , siasi nelle parti adiacenti ed in tal caso rade volte è curabile . Il vomito sul principio delle infermità acute , non dee temersi ; ma non è lo stesso negli altri tempi , massime se è laborioso , perchè di rado è critico : è un *reo segno* il *simbiaccio* , che l'accompagna .

Ci fa sapere l'Anatomia , trovarsi di rado una reale conformazione dello stomaco ; che è molto più comune il suo slogamento , che trovasi spessissimo questa viscera in alcuna delle sue parti scirroso , ma principalmente nel piloro , che molte volte par , che sia cartilaginoso : non va esente da questo male lo stesso duodeno : si è anche veduto il piloro raccorciato dalla flogosi , e da concrezioni pietrose , ostrutto da un pezzo d'argento inghiottito , ec. si è incontrato lo stomaco contratto , carico di pustole d'indole varia , producente tumori anomali , infiammato con degli abscessi , ulcerato , cancrenato , lacero , o foracchiato ; per non parlar delle piaghe provenienti al di fuori , che hanno di pari somministrato la materia a molte osservazioni . Fra tutte le viscere il fegato è stato con più frequenza intaccato , siasi per infiammazione , e abscesso , siasi per scirro , cancrena , putrefazioni , o adesioni col diaframma , collo stomaco , ec. sono inoltre osservate delle concrezioni biliose nella cistifellea , e nel condotto comune : si è veduto quest'ultimo aprirsi in vicinanza dello stomaco , ed anche nella cavità di questa viscera . Gl'intestini son comparsi prodigiosamente gonfiati , strangolati , impegnati negli anelli dei muscoli dell'addome , di pari che l'epiploon , ec. sono pure osservate delle flogosi , degli abscessi , degli scirri , ed altri vizi , nella milza , nel pancreas , nell'epiploon , nel mesenterio , nei reni , ec. per non far parola dello slogamento della cartilagine xifoide , e di varie altre malattie , sì nel capo , che nel petto , che eccitano dei vomiti sintomatici .

E' soverchio il dire , che non vi è che il vomito , la cui violenza , o durata posson dare dell'inquietudine ,
che

che voglia *rimedj*. Le *cavate del sangue* non hanno luogo in questa medicatura: talvolta possonvi entrare gli *emetici*; ma vi vuol molto, perchè il preceto: *Vomitus, vomitu curatur*, sia applicabile ad ogni specie di vomito. I *lassativi*, quando si può fargli passare, sono utilissimi; e sono di grande ajuto i lavativi stimolanti. Gli *allentanti*, e i *rinfriscanti*, come il brodo di pollo, il fiero, la limonata leggiera, l'acqua fatta agretta collo spirito di vetriolo, o di zolfo, ec. s' adattano a parecchi casi. Si fa uso con riuscita anche dei *calmanti* tratti dal nitro, del sale *de duobus*, del liquore anodino minerale, delle gocce anodine del Sydenham, delle pillole di cinoglossa, ec. Servonsi ancora familiarmente degli *stomachici* fortificanti, degli *assorbenti*, e degli *amari*: tali sono la mente, la salvia, l'assenzio, il rabarbaro, l'euula campana, le rose rosse, i cotogni, la scorza di mele granate, il masticice, il corno di cervo, la sinopia, gli occhi di granchio, i marziali, il balsamo del Perù, l'estratto di ginepro, la triaca, la confezione di giacinto, ec. Finalmente s'amministra con molta riuscita il sale d'assenzio fermentato col sugo di limone contro il vomito sintomatico delle febbri. Il latte, le acque di Forges, di Vals, di Passy, di Bourbon Lancy, e d'Archambaut; di Balaruc, di Coteres, di Sant-Amando, ec. sono ancora ajuti a tutti noti. Torna bene talvolta, che gl' infermi si stieno in letto; ed è sempremai necessario, che osservino una dicevole dieta. Dirò in questa occasione, che alla maggior parte giova un copioso bere, dove per lo contrario alcuni son forzati a sopprimerlo totalmente, e prendere dei sorbetti, delle creme, dell' uova fresche, ec.

Si può similgiamente ritrar del vantaggio dai topici, nei quali vi si fa entrare la polpa di cotogno, la menta, la melissa, l'assenzio, il garofano, lo zafferanno, l'acqua della Regina, l'aceto, la triaca, ec. che si applicano alla regione epigastrica, come anche dei crostini inzuppati nel vino aromatico. Finalmente presentasi al naso dell'aceto, dell'acqua della Regina, delle arance, dei limoni, ec. Ha talora giovato l'immerger le mani nell'acqua fredda. E' soverchio il dire, ch'è necessario riasettare la cartilagine Xifoide slogata, e riparare, per quanto è possibile, agli altri mali, dei quali il vomito è il sintoma: con tal mira ap-

punto si sono felicemente amministrati talora gli *apertivi*, e i *sudorifici*; si son fatte applicar le *mignatte* ai vasi emorroidali: sonosi aperti dei *cauterj* ec. Ultimamente calmasi il vomito soverchio lungo, o soverchio violento eccitato dall'emetico, con gli acidi minerali, vale a dire, collo spirito di vetriolo, o di zolfo, de' quali si pongono alcune goccioline nella bevanda.

VOMITO DI SANGUE.

Abbiamo già fatto osservare, che veniva presa talora l'*emoptisi* pel vomito di sangue, quando ce ne stavamo alla relazione degl'infermi: il sangue però, che viene dal polmone, è puro, vermiglio, e spumoso: per lo contrario quello, che sgorga dallo stomaco, è più nero, e mescolato con materie varie, che vi s'incontrano: per altro la tosse, che precede il primo, non permette all'attento Medico il prendere equivoco. Il male, di cui parliamo, vien d'ordinario preceduto da un calore, e da un dolor gravativo dello stomaco, come dalla tensione agl'ipocondri: la febbre l'accompagna di rado; ma talora sopravvengono delle ansietà, delle sincopi, ed altri gravissimi sintomi. Il sangue sgorga in maggiore, o in minor copia: talvolta è nericcio, e fetente: se ne rende per lo più per secesso, massime se i vasi mesenterici, di pari che i gastrici ne somministrino; la qual cosa può far rilevare la sede del dolore: indica anche questo il vizio della milza, se occupa la regione di questa viscera, quello del pancreas, se si riporta ai lombi, ec. La pletora proveniente da soppressione di sgorgi abituali, è spessissimo la sola cagione di questo morbo: gli emetici, i purganti drastici, e i veleni, posson darvi motivo. I melancolici, gl'ipocondriaci, e gli scorbutici, vi vanno, più che altro, soggetti: finalmente si è veduto, sebbene di rado, epidemico.

Il vomito di sangue cagionato dalla soppressione dei menstrui, e delle emorroidi, ci dà poco da temere, qualor non sia trasmodante: lo fa cessare il ritorno di queste evacuazioni. Per lo contrario è pericolosissimo, se riconosca un vizio nella milza, nel pancreas, ec.; se il sangue vomitato è nero, e fetente; se vi entra la febbre, o s'è sintoma d'un male acuto. Questa emorragia talvolta uccide i pazienti bruscamente, anche prima d'esserli manifestata col vomito: in questo

caso alcuni rigettano poco sangue ; ma ne resta pieno il loro stomaco ; e questa circostanza ingenera cardiache, sincopi, e sintomi i più tremendi, se questo liquido, che agevolmente si corrompe col suo stanzare, non s'apre un varco per gl' intestini . Coloro , che hanno avuto degli affalti da questo male, non lasciano di provarne le recidive .

L'apertura dei cadaveri ci scuopre le vene dello stomaco stivate, e varicose: questa viscera corrosa, esfacelata; la milza estremamente gonfiata, scirroso, e infestato di putrefazione: il pancreas indurito, stivato, e putrido: gl'intacchi medesimi, sebben più di rado, nel fegato: la cistifellea estremamente distesa dalla bile; per non parlare del polmone riarso, scirroso, e degli altri sconcerti, non meno del petto, che del basso ventre, i quali mostrano di non avere, che un rapporto molto lontano col vomito di sangue.

Il riposo, e la più severa dieta con frequenza vincono questo male, tuttavia vi è necessaria la *cavata del sangue*, quando il soggetto è vigoroso, e che il sangue vomitato è vermiglio: è pure indispensabile, quando vi è soppressione d'alcuna sanguigna evacuazione. *I rinfrescanti*, i *temperanti*, i *vulnerarij*, e gli *astringenti* leggieri, come la limonata, il siero, il brodo di pollo, e le emulsioni: la cicorea, l'agrimonia, la pimpinella, l'ortica, la consolida maggiore, l'ellera terrestre, la piantaggine, le vulnerarie svizzere: il riso, l'orzo, i cotogni, il rabarbaro, il cascìu, il nitro, il corallo, il balsamo del Perù, quello del Copahù, ec. in questo caso sono d'un uso grande: sonosi altresì veduti degli ottimi effetti dall'acqua ghiacciata. Per gli energici *astringenti*, come la pietra ematite, il sangue di drago, l'allume, l'essenza di Rabel, lo spirito di vetriolo, ec. non debbonsi dare, se non se nei casi pressanti, e quando ci mancano ripieghi, sendosene veduti perniciosissimi effetti; ed è degna d'acerba riprensione la condotta d'alcuni Pratici in tal riguardo. Molti pure fanno un uso troppo familiare del diacodio, dei trocisci di Karabè, e d'altri *ipnotici*, i quali, a dir vero, in alcuni casi posson dar grande ajuto, ma che non s'addicono in alcun modo a tutti i pazienti. I *purganti* non posson essere ammessi in questa medicatura, se ne eccettuiamo il rabarbaro, i tamarindi, e *mirobolani*, i quali pure debbonsi permettere con gran

riserva : ma importa sempremai moltissimo il tener libero il ventre con dei clisteri . Vi si addicono anche meno gli *emetici* , tuttochè alcuni abbiano avuto l'imprudenza di dargli la sola ipecacuana in picciole doserelle può esservi adoperata . Nel tempo del *parossismo* fanno le *legature* , oppure delle *fregagioni* alle estremità : s'immergono le mani , e i piedi nell'acqua calda , o fredda : si applicano al ventre dei tovaglioli caldi ; si fomenta con l'*officrate* , o coll' aceto , ec. Finalmentes si può impedire il ritorno di questo male con una dieta refrigerante, col latte, colle creme, ec. con i lassativi, con i marziali, e con altri aperienti ; colle cavate di sangue, ec.

F A M E C A N I N A .

Così addimandasi quell'appetito vorace, o quella *fame insaziabile* , alla quale i pazienti non posson far testa . Distinguonsene due specie , una accompagnata dal vomito, da lienteria , e da atrofia , e questa è la vera *fame canina* ; l'altra , che non ha seco nè vomito , nè scioglimento di ventre , che eccita delle gravezze allo stomaco, e delle oppressioni , ed è quella , che diciamo *fame bovina* (*bulimia*) . L'una e l'altra precipitano in debolezze , sopimento , ec. Ma non si dee , siccome si fa ad ogn'ora , prendere per queste infermità , che sono rarissime, quell'appetito vorace , che provano alcune femmine incinte, alcuni giovani , molti melancolici, e convalescenti, senza che ne nasca alcuno dei diversati accidenti .

Ci ha l'*apertura dei cadaveri* fatto vedere lo stomaco estremamente dilatato , e gonfiato , contenente del sangue stravasato, un liquor nero simile all'inchioostro ; una bile ruginosa , e come vetriolica ; una quantità prodigiosa di marcia : si è veduto questa viscera ricevete immediatamente il condotto biliare: il suo piloro rilasciato, ec. Si è osservato il fegato scirroso, e d'enorme grossezza ; la milza mostruosa, e putrida : i loro vasi estremamente stivati , ec. Abbiamo pure scoperti molti lombrichi negl'intestini ; il verme solitario ; un solo intestino tendente all' ano senza la girata dello stomaco , ed altri difetti di conformazione , come altresì diversi sconcerti nel mesenterio, nel pancreas, ec.

Contro la fame canina adopransi sempre con vantaggio gli *evacuanti* . Gli *emetanti* , e i *calmanti* , come
il

il decotto, o acqua di riso, e di pollo, il siero, il laudano, il diaconio, le pillole di cinoglossa, ec. vi fanno gran bene. Alcuni sono liberati da questo morbo, col far entrare nei loro alimenti quantità di grasso, e d'olio. I *mercuriali*, e gli altri *vermifughi* ne sono i soli specifici. Gli *assorbenti*, come il corallo, la creta, la pietra ematite, la limatura di ferro, possonvi aver luogo con vantaggio. E' stata amministrata con buono evento l'*ambra grigia*, di pari che la *triaca*, e gli altri *stomachici aromatici*, i quali par, che operino in questo caso, più come calmanti, che come fortificanti.

DOLORE DI STOMACO.

Non vi è nella pratica cosa tanto difficile, come lo è il distinguere questa malattia essenziale dalla sintomatica, quando è intensa, dalla colica duodenale, dall'epatica, ec. Questo dolore corrisponde perpetuamente alla fossa del cuore, dal quale non trovasi lontano l'orifizio superiore dello stomaco stesso; ma non vi è limitato; conciossiachè spandasi il medesimo non solo sopra tutta la regione dello stomaco, ma eziandio sopra quella del diaframma, del pericardio, e d'altre parti, delle quali nota è la connessione. Ha questo più gradi, ed anche differenti caratteri: se è ottuso, e languido, addimandasi *ansietà*; allora provansi delle grandi inquietudini, si mandano dei sospiri, e dei gemiti, ec. è noto, che il vomito vien preceduto da una sensazione di questa natura: se il dolor dello stomaco è più gagliardo, e più mordente, senz'essere eccessivo, se gli dà il nome di *cardiaglia*, la quale si suppone, che abbia la sua sede nell'orifizio superiore dello stomaco, detto *cardia* dagli Antichi: è questa la comunissima conseguenza delle faticose digestioni, ed il più delle volte viene per parossismo: s'è abbrugiante, addimandasi *ferro caldo* (*soda*): si stende comunemente lungo l'esofago, ed è prodotto da sughi vetriolici, che covano entro lo stomaco, e si manifestano per via di rutti, ai quali son grandemente sottoposti i melancolici: finalmente se il dolore è acuto, e trinciante, addimandasi *colica stomachica*: dipende questa il più delle volte da flatulenze, o da un' affezione spasmodica pur troppo indicata da gonfiamenti molto sensibili, e da frequenti rutti; ma quando è accompagnata dalla febbre, dee temersi l'infiammazione di questa viscera, molto più

di quello si pensi . Tutte le divise specie di dolori vengono presentate dagli Autori antichi sotto varie denominazioni , e con molta confusione : i moderni per la maggior parte , i quali , a dir vero , ne hanno parlato con maggior chiarezza , per mala ventura hanno esposto meramente ciò , che immaginavano . I dolori di stomaco , per la loro violenza , o per la loro durata possono sconvolgere tutte le funzioni : eccitano questi orrendi vomiti : cagionano *palpitazioni* , brividi , e tremori , sudori freddi , freddo alle estremità , ec. talvolta precipitano i pazienti abbattuti dal loro stato , in inquietudini , in prostrazione di corpo , e di spirito , non domabili da tutta la loro ragione . Quelli , ai quali noti sono i due cordoni di nervi , che vanno a perdersi nel corpo di questa viscera , non debbono far maraviglia di tutti gli sconcerti da questa malattia cagionati , e dal formidabile treno dei sintomi , che l'accompagnano . I dolori di stomaco sono comunemente eccitati da materie piccanti , acridi , e rodenti , che travansi attualmente nella sua cavità ; tali sono i rei fuggi , che risultano dalle digestioni viziose , dagli emetici , dai purganti , dai veleni , ec. Gli alimenti di malagevole digestione , le flatulenze , i vermi , le contusioni , le ernie epiploiche , ec. vi possono dar motivo : e talvolta il prodotto della collera , della tristezza , e delle altre violente passioni , oppure un sintoma della colica intestinale , mesenterica , duodenale , epatica , e nefritica ; delle febbri maligne , delle eruzioni , ec. Possono questi aver la loro origine dalle oppilazioni , dalle evacuazioni abituali di sangue sopresse , dalle eruzioni rientrate , dalla gotta rimontata , dalla dissenteria troncata , ec. Gl'ipocondriaci , le isteriche , i gotosi , i calcolosi , ec. vi sono di pari soggetti . I dolori di stomaco accompagnati dalla febbre , minacciano l'infiammazione : gli abituali sono spesso indomabili , malgrado il vantaggio , che abbiamo di portare il rimedio immediatamente alla parte offesa : non credo esser necessario il dire , che il singhiozzo , i sudori freddi , gli svenimenti , nei casi da noi riportati , son sempre pessimi segni .

Dalle sezioni anatomiche ci viene manifestato nella cavità dello stomaco il ristagno d'una bile rugginosa , nera , e inacidita ; delle flatulenze , che d'ordinario la distendono , e talora del sangue stravasato : l'enorme di-

dilatamento di questa viscera , come anche del duodeno ; le sue tuniche indurite , fisse , e bianchicce . Gli scirri , la cui sede varia molto , vi sono comuni : vi s' incontrano talora delle flogosi , e degli abscessi : la sua superficie interna corrosa : delle ulcere sì interne , che esterne : si è anche trovata forata , cancrenata , e putrida : sonosi veduti nella sua cavità dei vermi , delle vesciche piene di marcia , delle pietre di varie forme , e grossezze , delle pillole , dei noccioli , degli spilli , del calcinaccio , del carbone , ed altri corpi eterogenei inghiottiti : dei tumori anomali , e infaccati , delle escrescenze fungose , dei porri , ec. e finalmente l'inserzione del condotto biliare . Sonosi con gran frequenza rilevati degli scirri nel fegato , nel piloro , nel duodeno , nella milza , nell'epiploon , nel mesenterio , ec. delle suppurazioni , e putrefazioni in tutte queste viscere : la cartilagine xifoide fuor di luogo , la cistifellea prodigiosamente stivata , e piena di moltissime pietruzze , delle ernie epiploiche : l'aneurisma della ciliaca , ec. per non far parola dell'infiammazione del mediastino , e del pericardio , dell'enorme grossezza , e degli altri vizj del cuore , delle pietre nei reni , ec.

E' necessaria la *cavata del sangue* , allorchè lo stomaco è minacciato d'infiammazione , se il dolore è acuto , e la febbre violenta ; ma di rado s'addice agli altri dolori , massime se sieno cronici . I *vomitivi* , e i *purganti* sono indubitatamente i rimedj più acconci a toglier via tutto ciò , che stanZIA nello stomaco ; ma non è sempre lecito l'amministrargli , e siamo bene spesso forzati a smorzarne la loro azione con dei *calmanti* . La copiosa bevanda , il brodo lungo di pollo , il siero , le emulsioni , l'olio di mandorle dolci , tutti gli *allentanti* , e gli *addolcenti* , in questo caso fanno gran bene : molti non hanno potuto liberarsi da questi dolori abituali , se non lasciando di ber vino : i *temperanti* , come la borrana , la cicoria , la pimpinella , il tumo-sterno , il cerfoglio , la pazienza , e i gamberi , sonosi pure molto adoperati . Dopo tutti i divisati rimedj si può dar di mano ai *calmanti* , agl' *antispassmodici* , e agl' *ipnotici* : tali sono il nitro , il liquore anodino minerale , la canfora , i fiori del tiglio , il castore , la polvere di gutteta , le goccioline anodine del Sydenham , il diacodio , ec. Ricorriamo eziandio agli *stomachici* , ed ai *carminativi* : tali sono la menta , la salvia , la maggiorana ,

rana, e soprattutto i fiori di camomilla, l'anacio, il finocchio, la china, l'enula campana, il rabarbaro, ec. l'estratto di ginepro, d'affenzio, la triaca, ec. Finalmente dannosi dei casi, che vogliono degli *assorbenti*, degli *antelmintici*, i *marziali*, e altri *aperienti*, i *sudorifici*, gli *antiscurbutici*, ec. In tutti si raccomandano i clisteri addolcenti, lassativi, e carminativi.

Importa sommamente nella *medicatura* di questa specie di dolori, e soprattutto in quello detto il *ferro caldo*, l'esaminare, sia per i rutti, sia pel vomito, e per altri sintomi, se le materie stanzianti nello stomaco tendono all'acidità, o all'alcalescenza, per fare una scelta adeguata dei rimedj, che abbiamo proposti: si vede bene, che le *materie agre*, dopo le preliminari evacuazioni, e gli allentanti, come il tè, il brodo lungo di pollo, o l'acqua pura intepidita, richieggiono gli assorbenti, come i boli, il corallo, gli occhi di granchio, la magnesia, ec. e che debbon essere investite le *materie alcaliche*, dopo i rimedj generali, coll'acqua nitrata, colla limonata, e con altri *liquori aciduli*. Per quanto numerosi, e variati sieno i rimedj, dei quali abbiampieno il presente Articolo, nulladimeno talvolta non bastano; e siamo forzati a ricorrere alle acque minerali di Vals, e di Forges, di Plombieres, di Balaruc, di Monte d'oro, ec. Il latte, le creme di riso, d'orzo, ec. hanno similgiamente fatto del bene a parecchi; per non far parola di molti altri rimedj, che posson convenire all'infermità principale, di cui il dolor di stomaco non è, che il sintoma.

Quantunque non possiamo far conto dei topici; tuttavia non dobbiamo disprezzargli: si applicano dei linimenti, dei cataplasmi, ed anche dei sacchetti aromatici, balsamici, spiritosi, e canforati: gl'impiastri di coccole di lauro, di tacamahaca; delle fomenta emollienti, ec. Si possono parimente ritrarre dei grandi vantaggi dai bagni caldi, ed anche dall'immergere i piedi nell'acqua calda, ec. Ultimamente fa d'uopo difendere dal freddo la regione dello stomaco; e questa sola attenzione ha fatto alcuna volta cessare dolori, che avevano fatto testa a tutti i rimedj.

PASSIONE ILIACA.

L'intestino *ileum*, onde trae la sua denominazione questo morbo, non n'è per altro perpetuamente la sede:

sede : si è veduto con frequenza nel *coecum* , e nel *colon* ; talvolta anche nel *retto* : il nome di *valvolo* , che alcuni Scrittori danno alla passione iliaca , è relativo ai contorcimenti , che incontransi talora nell'ileo : finalmente il compassionevole stato , in cui questo crudel vomito riduce i pazienti , gli fa anche dare il barbaro nome di male del *miserevere* . L' affezione iliaca viene più o meno lentamente , ma perpetuamente per gradi : prima di tutto si vomita ogni materia , che trovasi entro lo stomaco ; quindi si restituisce la bile , la materia chilosa , e gli escrementi , fino ai lavativi , e alle supposte , sendo chiusa affatto la strada del secesso : il ventre si tende , e si gonfia : provansi dolori , e coliche intensissime , di cui sembra , che la fucina trovisi nel bellico : provasi dell' oppressione , e con frequenza il singhiozzo : quindi vengono in iscena le convulsioni , gli svenimenti , i sudori freddi , il raffreddamento delle estremità , ec. I veleni , gli emetici , ed altre materie acri , e stimolanti , possono aprire il varco a questo morbo : il medesimo è stato alcuna volta eccitato da un accesso di collera , da un correre trasmodatamente , ec. I grandi mangiatori , quelli , che sono sottoposti alla colica convulsiva , e che hanno delle ernie , trovansi più che ogn' altro esposti agli affalti di quest' orrido male .

L' esame delle materie , che vengono restituite , può far giudicare del luogo , ove trovasi il *vizio locale* , avvegnachè non può esser rigettata , se non quella materia , che si trova sopra lo strangolamento ; ed una tale cognizione può influire non meno sopra la medicatura , che sul pronostico . Non vi è chi non sappia , che questa è una delle più pericolose infermità , specialmente quando vi si scuopre alcun segno d' infiammazione , come la febbre violenta , il dolore acuto , la tensione del ventre , ec. Il cessamento del dolore , sussistendo gli altri sintomi , annunzia la *cancrena* , e la *morte* , che segue d' ordinario nel terzo , o nel quarto giorno del male ; ma questo è anche più lungo , e può , allorchè dipende da un' altra cagione , durare delle settimane , e perfino dei mesi .

Le osservazioni anatomiche confermano ciò , che abbiamo detto della sede di questo male , che occupa quasi colla stessa frequenza l' intestino cieco , e il *colon* , che l' *ileo* : si è anche veduto offeso il solo *retto* . Sonosi in
mol-

molti incontrate le budella prodigiosamente gonfiate, infiammate, cancrenate, forate, e lacere, e ciò, che in esse contenevasi, sparso nella cavità del basso ventre: sonovisi veduti degli abscessi, e dei tumori scirrofi, il cui volume occupava il passaggio del canale: si sono scoperti con molta frequenza degl' invaginamenti, ovvero delle porzioni d'intestino rientranti nel proprio loro canale: io ho anche più volte rilevato, ed hannolo altri eziandio osservato, che queste specie di duplicature s'incontravano sovente in soggetti, i quali non avevano giammai vomitato. Sonosi trovati degli strangolamenti prodotti dall'ernia, o da un vizio locale degl'intestini, dei contorcimenti di questi canali, che talvolta comparivano intralciati, e come annodati: delle ostruzioni fatte dalle materie fecciose disseccate, da concrezioni gessose, da vermi aggomitolati insieme, per non parlare delle diverse specie di stravasamenti, e di tumori, che posson comprimere il condotto intestinale.

Questa malattia vuole pronti soccorsi: prima di tutto si dee esaminare, se vi sieno ernie, le quali, come è noto, non son sempre apparenti, massime nelle donne: in tal caso il solo rimedio da farsi si è il ristabilimento del budello strangolato. In questo caso rendono indispensabili le *cavate del sangue*, non meno per combattere l'infiammazione, che per oviarla. Quindi si fa grand' uso degli *addolcenti*, e dei *rilascenti*, come del brodo lungo di pollo, dell' olio di mandorle dolci, dei brodi grassi, delle emulsioni allungate, o del seme di lino, del siero, ec. I *calmanti*, come il nitro, la canfora, il liquore anodino minerale, il diacodio, le goccioline anodine, ec. son rimedj sperimentati ogni giorno efficaci: si può col favore degl' ipnotici far passare alcuna volta dei *lassativi*, dai quali ci dobbiamo promettere ottimi effetti. Si fa anche inghiottire, quando non vi sono nè ernie, nè infiammazione, delle palle di piombo, intorno a una libbra di mercurio crudo nell'acqua, o nel brodo grasso: osserverò quel di passaggio, che questo mercurio ha talora prodotto la salivazione. In oltre si fa uso grande dei lavativi emollienti, purgativi, e stimolanti: si è talvolta soffiato entro l'ano del fumo di tabacco coll'istrumento, di cui ha dato la descrizione, e la figura il *Dekkers*: sonosi eziandio gonfiate le budella con grosso soffietto; e questi mezzi in molti son riusciti. I *topici emollienti*,

ti, e rilassanti in questo caso son molto proficui; oltre le fomentè, e i cataplasmi dotati di tal qualità, danno anche i bagni, e i mezzi bagni, non meno coll'acqua calda, che con un decotto emolliente, oppure l'olio d'oliva. Sonosi sperimentati ottimi effetti dall'applicazione di animali, di quella dell'epiploon, o della pelle d'un castrato, da un linimento fatto col grasso, e con la canfora; da un cataplasma con la triaca; dall'olio di menta, e somiglianti.

IL MORBO COLLERA.

Il male, che forma il soggetto del presente Articolo, fa anche più terrore di quello, che abbiamo pur ora esaminato: si sa, che il vomito, e la diarrea, il cui attacco è istantaneo, ne sono i segni principali; ma non ne costituiscono già il carattere, avvegnachè segua tutto di, che altri soffra questa doppia evacuazione per motivo di semplice indigestione, o in alcun'altra circostanza, che non potrebbe, senza abusare dei termini, chiamar *Colera*: questa è accompagnata dai più formidabili sintomi: tali sono i dolori acutissimi, ed il calore abbruciante delle viscere, la tensione del ventre, la cardialgia, il singhiozzo, le ansietà, gli svenimenti, l'eccessiva sete, la febbre col polso disuguale, picciolo, e intermittente, le convulsioni, la contrazione delle membra; il granchio, o sia uno stiramento doloroso nelle gambe, i sudori freddi, il raffreddamento delle estremità, ec. Vi soccombono talora le più robuste persone in ventriquatt'ore, o in due, o tre giorni: le evacuazioni sono biliose, gialle, porracee, rugginose, nere, ec. Non parlo in questo luogo del copioso sbocco di ventosità, non men di sopra, che di sotto, ch'è a certuni piaciuto di chiamare *Colera secca*.

I meloni, i citrioli, i petonciani, ed altri alimenti perniciosi; i purganti drastici, i veleni, ec. posson dar motivo a questo morbo. Alcuna volta è il medesimo il sintoma delle febbri maligne, e d'altre, dell'infiammazione del basso ventre, ec. Le persone ardenti, e colleriche, che si sa esser con frequenza tormentate dalla bile, vi sono più d'ogn'altro soggette: questo male è più comune sul terminare dell'estate, che negli altri tempi dell'anno, ed è anche con frequenza epidemico. Bisogna riflettere, che ha più gradi, i più leggeri dei quali appena meritano il nome di *Colera*: in que-

questo caso è d'ordinario *salutare*, ma è perpetuamente *da temersi*, allorch'è accompagnato dalla maggior parte dei sintomi da noi divisati, massime quando non può attribuirsi ad alcuna cagione manifesta, e che le materie, che restituisconsi per i due sbocchi, si allontanano dallo stato lor naturale, rispetto all'odore, ed al colore.

Veggionsi nei *cadaveri* tutti i segni del rigurgitamento della bile: spesso troviamo il fegato ostrutto, e riarsito: sonosi incontrati dei dilatamenti della cistifellea, e del condotto comune: abbiamo scoperto l'inserzione di questo secondo vicino allo stomaco, o nella sua propria cavità: finalmente abbiamo rilevati dei segni di flogosi, e di cancrena nello stomaco, nel condotto intestinale, ec.

Sarebbe pericoloso il seguire nella medicatura di questo male la carriera indicata dalla maggior parte degli Scrittori, che hanno fatto uno strano abuso dei rimedj, eziandio i più contrarj alle mire, che si debbono avere, non seguendo in questo se non se i loro pregiudizj; o l'esempio d'alcuni altri, che non ne sapevano più di loro. Coloro, che fanno entrar per tutta la *cavata del sangue*, non lasciano d'applicarla alla *Cottura*: veramente dannosi alcuni casi, nei quali è permesso il servirsene; ma questi sono rarissimi; e quelli, pel maggior numero, che s'arrogano il dritto di guidare gli altri, sono incapaci di discernergli. Gli *evacuanti*, tanto emetici, che purganti, se ne accettiamo i tamarindi, e la cassia, che si son fatti prender talora con molta riuscita, debbon esser banditi, tuttochè molti se ne servano con un ardore, il quale, come abbiain detto altrove, si trova in ragione inversa della loro scienza: e non è questo uno spronar chi corre? Non son meno da temere gli astringenti, massime sul principio del male: eppure trovansi parecchi Autori, che hanno principiato la loro medicatura da questi rimedj: ma lasciamo da un lato tutti questi capricci dell'arte, o per meglio dire, dell'ignoranza, ed additiamo i soccorsi più approvati, ed i più efficaci. Tali sono gli *allentanti*, gli *addolcenti*, e i *rinfriscanti*, che sono i rimedj migliori, ed anche i soli, che d'ordinario abbianfi a porre in opera nella maggior tempesta del male: con questa mira empionsi i pazienti di *siero*, di brodo lungo di *pollo*, o di *limonata*: in mancanza di questa possiamo servirci dell'acqua fatta
aci-

acidetta con alcune goccioline di spirito di vetriolo ; o finalmente dell'acqua pura, o fredda, o intepidita : applicansi nel tempo stesso ai medesimi dei lavativi addolcenti , e rinfrescanti : se abbiavi alcun sospetto di veleno, il latte, il brodo grasso, l'olio di mandorle dolci, ec. Sono i rimedj più appropriati: i *calmanți*, sì *ipnottici*, che *antispașmodici*, sovente giovano: divengono necessarj, se attribuiscafi il male all'effetto d'un purgante violento, od a qualunque altra simigliante cagione: il laudano, il diacodio, le goccioline anodine, il cattore, ec. sono quelli, che con più frequenza adopriamo, dopo che gli allentanti, e le sufficienti evacuazioni hanno posto le prime vie in istato di ricevergli. Si posson ritrarre altresì grandi vantaggi dai testacei, dagli occhi di granchio, e da altri *assorbenti*. Non è permesso, se non se dopo le prime sette, od otto ore, l'amministrare talora i *fortificanti*, come il diascordio, la triaca, la confezione di giacinto, ec.: i *topici stomachici* vi sono pure stati messi in opera: ma in un male sì impetuoso, e che dobbiamo prometterci da rimedj, che operano con tanta lentezza? I *rilascenti*, e gli *emollienti*, sono affai più dicevoli; ma il poco riposo, che hanno i pazienti, non permette di servirsene gran fatto.

LA DIARREA.

Questa è di tre sorte, vale a dire 1. la *diarrea*, in cui le dejezioni più, o meno frequenti, sono stercoracee, biliose, serose, mucose, argillose, untuose, purulente, ec. E' questa sovente accompagnata da svogliatezza, da ansietà, da debolezza, da flatulenza con romoreggiamenti: da dolori, più, o meno acuti, ed estesi; dal tenesmo, dalla tensione del ventre, da granchi, o tiramenti, ec. Le urine in questo male con frequenza sono rossicce, e scarse. 2 Il *flusso ciliaco*, in cui rendono le materie, bianchicce, bigiognole, e chilose: ha questo d'ordinario la sua sede nel mesenterio, i cui vasi lattei sono ostrutti, o compressi: dipende talora anche dalla copia dei mucchi, che intonacano il condotto intestinale; e questa cagione si manifesta colle dejezioni mucose: questo male è per lo più accompagnato da svogliatezza, da rutti agri, dalla sete: da dolori, che corrispondono ai lombi, e bene spesso dalla febbre: le urine sono parimente torbide,

bide, e poco abbondanti. 3. La *lienteria*, nella quale restituisconsi gli alimenti poco cangiati, succede questa talvolta alla diarrea, e alla dissenteria, o vien dopo alcune altre malattie croniche: è accompagnata, ora da una grande svogliatezza, ora da una specie di fame canina; da una grande oppressione, e da altri accidenti, da noi già additati: le orine sono più, o meno fangose, e scarse. Tali sono le superficiali *differenze*, che debbonsi osservare in queste specie di *scioglimenti di ventre non sanguinosi*; ma ve ne sono parecchi altri cavati dall'età, e dal temperamento; dagli effetti infinitamente variati degli alimenti, dai rimedj, e da accidenti, che son preceduti al male, o che lo accompagnano; cognizioni, come ben si vede, che influiscono sopra la scelta dei rimedj, e che risparmiano all'infermo il dispiacere di prendere tante medicine inutili, prima d'aver incontrata la buona, cui egli riceve anche talvolta da una mano forestiera, dopo aver provato per lunghissimo tempo tutti i tentativi di quel tale, nelle cui mani si era confidati. I biliosi, i cachettici, i gottosi, ec. sono più degli altri sottoposti alla diarrea: dipende questa talora dall'aver patito freddo alle gambe, dall'indole, o dalla qualità degli alimenti, dal cambiamento dell'acqua, ec. Dannovi anche motivo i *catartici*, e allora addimandasi *soprappurga (hypercatarsis)*. I fanciulli sono i più esposti al flusso ciliaco; e gli scorbutici alla *lienteria*.

La diarrea cagionata dal freddo, dall'acqua, e dagli alimenti, è senza pericolo, e dura poco tempo: ma merita grande attenzione, quando dipende da una cagione interna, quando indebolisce grandemente i pazienti, e che è invecchiata: tanto più questa è da temersi, quanto più le dejezioni si dilungano dallo stato naturale, sì pel colore, che per l'odore, e che è accompagnata da rei sintomi, vale a dire, da svogliatezza, dalla febbre, e dalla sete: dai dolori, e dal tenesmo; da singhiozzo, e da ansietà, da sudori freddi, da svenimenti, ec. La *biliosa* talvolta s'avvicina al morbo colera, e degenera con grandissima frequenza in dissenteria: l'*aaiposa*, che addimandasi *colliquativa*, precipita in brev'ora nel marasmo: la purulenta può asciugare gli ascessi del petto, e del basso ventre, di pari che le ulcere interne, ed esterne. La *diarrea* nelle malattie acute è sovente *critica*; ma non
biso-

bisogna riguardarla, come tale, nel principio del male. Il vomito, i sudori, e lo sgorgo d'orina, risanato comunemente dallo scioglimento del ventre; e deesi *presagire bene*, quando l'orina si schiarisce, e che divien più copiosa. Se la diarrea non solleva punto gl'idropici, gli precipita, è di reo augurio nelle piaghe della testa; si teme per le donne gravide, e soprattutto per quelle di parto: i polmonici finalmente, di pari che gli etici non ne debbon temer tanto. La *lienteria* è un male pericolosissimo in tutte le età; ma è più funesta ne' vecchi. Il *flusso ciliato* è anche più grave, qualora dipenda da un vizio locale; ma se è prodotto da abbondanza di mucosità, si cura con maggiore agevolezza.

L'*apertura dei cadaveri* ci manifesta delle flogosi, delle ulcere, delle cancrene, e delle putrefazioni nello stomaco, e nel condotto intestinale; l'intonaco vellutato di questo secondo è comparso talora distrutto. Si sono osservate in alcuni, nei quali la diarrea era stata preceduta dalla dissenteria, numerose cicatrici, che chiudevano l'ingresso delle vene lattee: sonosi veduti gl'intestini nelle loro circonvoluzioni, incolate insieme, e formanti una sola massa. Si è trovato il fegato offeso, ora d'una grossezza straordinaria, e ora disseccato, ed anche sritolabile: si è veduto infiammato, scirroso, racchiudente uno, o più abscessi, ovvero altri tumori infaccati. La cistifellea è comparsa prodigiosamente dilatata, sfivata d'una bile rugginosa, o nera, contenente varie pietruzze, ec. Abbiamo trovato la milza d'una mostruosa grossezza, callosa, e putrida: il pancreas scirroso, con delle pietre, e della bile nel suo canale, ec.: le glandule del mesenterio della grossezza d'una fava, o d'una nocciola: l'epiploon scirroso, o distrutto; per non far parola dei diversi tumori, degli stravasamenti saniosi, e purulenti, e d'altri sconcerti, non meno nel petto, che nel basso ventre, che hanno una relazione più lontana col male, di cui parliamo.

La *cavata del sangue* è talvolta necessaria: ci dobbiamo regolare intorno a ciò sopra la costituzione, e le forze del paziente, sopra lo stato del polso, e sopra la violenza dei dolori. Abbiamo detto, che il vomito spontaneo guariva con frequenza lo scioglimento del ventre: da una tale osservazione risulta, che possiamo ritrarre il vantaggio stesso dall'*emetrico*, e ce lo

fa vedere alla giornata l'esperienza: l'*ipecacuana*, in una dose conveniente, sembra essere la più propria per reprimere questa infermità. Non si danno con minore buon evento i *purganti miti*, come il rabarbaro, i tamarindi, i mirabolani, la manna, la cassia, ed altri. I *rinfriscanti*, come l'acqua di riso, e la nitrata, il fiero, la limonata, ec. riescono a maraviglia in tutte le diarree biliose, o che nascono da irritamento, o da calore: i *calmanti narcotici* nei casi medesimi, come nelle soprappurghe, sono utilissimi: il laudano, il diascodio, la tintura anodina, e le pillole di cinoglossa, sono quelli, che s'adoprano con più familiarità; ma non s'addicono a tutte le specie di diarrea, e singolarmente alla ferosa. Non debbonsi amministrare gli *stomachici*, se non se dopo aver fatto precedere i rimedj divisati, come l'assenzio, la centaurea minore, la china, la cannella, e gli altri aromati, l'estratto di ginepro, il diascordio, il vino di Cipro, oppure di Spagna, ec. Debbonsi anche dare con maggior riserva gli *astringenti*, come la simarouba, il cascìu, la brionia, i balausti, le rose rosse, il cynorrhodon, la scorza di mela granata, il sommaco, la bistorta, e la tormentilla, il sangue di drago, l'acacia, i marziali; lo sciroppo magistrale, di rose secche, di mele cotogne, ec. Non dobbiamo porre in opera i divisati rimedj per la maggior parte, se non quando sono andati a vuoto tutti gli altri ripieghi, avendo noi veduto, che allora quando abbiamo avuto soverchia fretta d'utargli, hanno dato motivo ad infiammazioni, o ad ostruzioni più ree della malattia medesima. Finalmente veggionsi degli scioglimenti di ventre ribelli a tutti i rimedj, da noi indicati, che non cedono se non al latte, o all'acqua minerali, come quelle di Forges, di Balaruc, di Plombieres, di Bourbon-l'Achambaut, ec. Si sa, che la *diarrea febbrile* richiede gli *addolcenti*, i *lassativi*, i *calmanti*, e talora gli *assorbenti*, e i *diaforetici*: tali sono il brodo lungo di pollo, la cassia, e la manna; il diascodio, gli occhi di granchio, il decotto bianco; il Kermes minerale, il diascordio, ec.

La medicatura della *Lienteria* differisce poco da quella della diarrea, se ciò non fosse, che in quella si pongono in opera con minor riserva gli *assorbenti*, e i *fortificanti*, come il corallo, l'assenzio, il rabarbaro, la china, i cotogni, la noce moscada, candita, i cro-

stini

fini inzuppati nel vino , ec. Pel *flusso ciliaco* , che si crede dipendere dall' ostruzione delle vene lattee , dannosi gli *aperienti* , e gli *amari* , come il rabarbaro , i marziali , l' assenzio , la centaurea minore , ec. I lavativi addolcenti , i calmanti , e gli astringenti sono anche molto messi in opera contra tutti gli scioglimenti del ventre , e le circostanze ne regolano la scelta . Si usano eziandio , sebben più di rado , i *topici stomachici* , e fortificanti . Abbiamo detto , che il sudore reprimeva la diarrea ; dal che si può conchiudere , che i *sudorifici* , l' esercizio , i viaggi , le *fregagioni* , i *bagni caldi* , l' uso della fenella , ec. sono utilissimi ; e l' esperienza conferma ogni dì la giustezza di tale illazione : è noto altresì , che assai fiato ha prodotto l' effetto medesimo l' uso del matrimonio ; ma un *beninteso governo* dee essere considerato , come il punto più essenziale : consiste questo principalmente nell' astenersi dalla carne , dall' insalata , dai frutti crudi , ec.

FLUSSO SANGUIGNO.

Ve ne sono tre specie , come del precedente , vale a dire , il *dissenterico* , l' *epatico* , e il *mesenterico* , senza contare il *flusso emoroidale* , che incontrandosi talora collo scioglimento del ventre , può ingannarci . La dissenteria ora è acuta , ora cronica : sì l' una , che l' altra sono bene spesso epidemiche , e dominano sul terminar dell' estate , o nell' autunno : la febbre preceduta dalle brividiure , e accompagnata dalla sete ; i dolori colici , ed il calore delle viscere ; le dejezioni mucose , e untuose , gialle , porracee , e sanguigne , i premiti , ec. sono i segni , che la distinguono bastantemente dai flussi epatici , mesenterici , ed emoroidali ; ma questa malattia è suscettibile di tanti gradi , ed offre tante varietà , che non è sempre agevole il pronunziare sopra il suo carattere . La *febbre dissenterica* sul principio è leggiera ; ma va in progresso rinforzandosi , e diventa con frequenza l' infermità principale . Le dejezioni cominciano da esser biliose , nè divengon sanguigne , se non dopo alcun tempo e i pazienti perdono comunemente l' appetito , il sonno , e le forze ; alcuni son tormentati da cardialgie , ed anche dal vomito : le loro dejezioni divengon saniose , e purulente , cariche talvolta di filamenti , e di stracci dell' intonaco vellutato degl' intestini ; finalmente a questo male unisce talora

ra la lienteria. In alcune epidemie segue, che le dejezioni non sieno sanguigne, tuttochè vi concorrano gli altri segni: in tal caso la dissenteria differisce poco da quella specie di morbo colera, che non è accompagnata da vomito: diciamo meglio, è quello stesso male, che a certuni è piaciuto nominar *colera*; ed a certi altri *dissenteria*.

Distinguono i Pratici due sorte di *dissenteria*, una benigna, che non è accompagnata da alcun reo accidente, e che anche trovasi senza febbre; l'altra *maligna*, ch'è inseparabile dalla febbre, e che può comunicarsi: in questa seconda restituiscesi il sangue talora puro, e vivo; prova il paziente grandi oppRESSIONI: la lingua s'inaridisce, s'inzavarda di bave, e si screpola: formansi delle afte nella bocca: hannosi alcuna volta orridi vomiti: la cute s'empie di tacche porporine; sopravviene il singhiozzo, le convulsioni, ed altri accidenti, de' quali facemmo parola nell'Articolo della febbre maligna. Gl'intestini delicati sono i primi d'ordinario a rimanere offesi; quindi il male si scaglia sopra le grosse budella, ove fa le maggiori stragi. La dissenteria, il tenesmo danno talvolta motivo al prolapsio del retto, o alla paralisi dell'ano, che in tal caso resta perpetuamente aperto. I gottosi, e gli scorbutici vanno grandemente soggetti alla dissenteria: talora viene in seguito della febbre biliosa: coloro, che malamente si nutrono, che transodano nel mangiar meloni, citrioli, petonci, ed altre frutta estive, vi sono *sommamente esposti*.

Il *flusso epatico* è un male assai raro: tuttavolta non vi è Pratico, che non abbia in vita sua incontrato più volte. Non ha questo altra affinità colla dissenteria, se non quella, ch'ei ritrae dalla tintura rossa delle dejezioni, che prenderebbonfi per lavatura di carne fresca, e da un leggero tenesmo, che talora l'accompagna: è inseparabile dalla febbre lenta; i pazienti perdono l'appetito, hanno la bocca amara, e sono soggetti a flatulenze: la loro orina è carica di bile: la regione del fegato è più, o meno dolorosa, e talvolta tesa: hanno gl'infermi un colore giallognolo, e toffono, con qualche difficoltà di respiro: finalmente vengono di quelli, che rendono il sangue pel naso con i mocchi, o per le altre strade. Alcuni moderni si son fatti a credere, che questo fosse un flusso emorroidale interno; ma le osservazioni anatomiche pare, che pro-

vino,

vino, che avessero ragione gli Antichi, che l'attribuivano al fegato; oltredichè il sangue emorroidale, da qualunque luogo sgorgi, non è mai intimamente mescolato con gli escrementi: si è in oltre osservato, che il flusso epatico era succeduto all'itterizia, all'epatitide, e ad altre malattie del fegato: più d'ogni altro vi vanno soggetti gl'ipocondriaci.

Importa moltissimo l'essere avvertito, che si può restituire molto sangue per secesso, il quale non è, nè dissenterico, nè epatico, nè emorroidale, come spesso altri si persuade. Quel *flusso di sangue*, che diciamo *mesenterico*, per distinguerlo dagli altri, accompagna con frequenza il vomito della stessa natura, e può essere somministrato, non meno dai vasi gastrici, che dai mesenterici: è questa una semplice emorragia, più, o meno considerabile, la cui sede è sempre incerta, onde seguono grandi varietà nelle dejezioni, che rendono infinitamente simile alle precedenti questa infermità.

La veemenza della febbre, la violenza dei dolori colici, il grado d'oppressione, le aste della bocca, il vomito, il singhiozzo, il ventre dato giù, le fecce in estremo fetenti, purulente, che portan seco delle pelliciatole, e dei frantumi di carne, il cessamento dei dolori, senza la diminuzione degli altri accidenti, le estremità fredde, ec. fanno bastantemente conoscere il pericolo della dissenteria: quella, che ha la sua sede nelle picciole budella, lo che si rileva dal bellico addolorato, dalle dejezioni più liquefatte, e dal tenesmo manco importuno, risveglia talvolta l'infiammazione; quanto è più copioso il sangue, tanto è più da temere. Quanto alle *dissenterie bianche*, o non sanguigne, d'ordinario epidemiche, elle sono ugualmente da temersi, che il morbo colera, al quale abbiamo detto, che appartengono. La dissenteria dei fanciulli, e dei vecchi, dei cachetici, degli icorbutici, e delle donne di parto, è perpetuamente *pericolosissima*. E' soggetta a ree recidive, quando non si bada ad impedirla, e degenera talvolta in ostinatissima diarrea. Il *flusso epatico* incomoda meno della dissenteria, ma è più malagevole a guarirsi, e va a finire comunemente nella cachessia, nell'idropisia, e nel marasmo. Quanto al *flusso mesenterico*, non è da temersi più del vomito sanguigno, ed è cosa molto rara, che queste due malattie portino a ree conseguenze.

Le *osservazioni anatomiche* numerosissime intorno alla *dissenteria*, ci scuoprono dei ristagni d'una bile porracea, scura, o nera, non solo entro i proprj suoi conservatorj, ma anche negl'intestini; che questi secondarj veggiono talora disseccati, come la carta pecora: che i medesimi sono in certuni prodigiosamente dilatati dalle ventosità, e ripieni d'una materia purulenta: s'incontrano infiammati, con abscessi, esulcerati, sfacellati, e perfino forati: si è osservato, che trovavansi incollati insieme, e che vi si erano formati degli scirri dei tubercoli, delle callosità, ec. finalmente il colon, e il retto son comparsi con frequenza la sede di questo morbo. Sonosi vedute, sebben di rado, delle ulcere nello stomaco, o qualche altro vizio: si sono scoperti degli scirri, la cancrena, o la putrefazione nel fegato, e nel mesenterio: si è veduto l'omento verdastro, scirroso, e putrefatto; la milza gonfiata, e putrida, ec. si è osservato in alcuni soggetti morti dopo un *flusso epatico* il fegato putrido, totalmente distrutto, oppure in parte; la sua tunica offrendeci un sacco, che racchiudeva di questa materia saniosa, o somigliante a lavatura di carne, che era stata perpetuamente renduta dai Pazienti: se talora non si sono trovati, che degli stivamenti nel fegato senza putrefazione, siamo noi certi, che quelle tali pertone fossero state veramente attese dal flusso epatico? Si è ancora osservato, se non ci siamo ingannati, che a questo male era succeduta l'infiammazione del fegato. Pare, che da simili osservazioni altri potesse conchiudere, che il vero flusso epatico dipende dalla putrefazione, e dalla dissoluzione del fegato; ma non possiamo accertare alcuna cosa sopra la strada, che prende questa materia per giungere al condotto intestinale, tuttochè pajà somamente verisimile, che debba seguire quella dei vasi biliari: è inutile, secondo me, il dire, che s'incontrano con frequenza delle putrefazioni nel fegato, senza che vi sia mai stato vestigio di flusso epatico. Quanto al *flusso mesenterico*, mi veggio ridotto alle sole mie proprie osservazioni: in alcuni, che vi erano andati soggetti, ho veduto degli stivamenti scirroso nel fegato, o il suo disseccamento; ma questi vizj, che sono comunissimi, e rade volte producono questo effetto.

Le *cavate del sangue* nel principio della *dissenteria* sono indispensabili, qualora non vi si opponga lo stato del

del polso, e delle forze. L'emetico è anche più necessario della cavata del sangue: l'ipacacuana sì celebre per la dissenteria, ha poco vantaggio sopra gli altri vomitivi: è noto abbastanza, che non solo questa radice, ma eziandio la *simarouba*, e il *vitrum antimonii ceratum*, nel capo della maggior parte dei nostri passano per gli specifici di questo morbo: sono questi a dir vero, grandi rimedj; ma l'esperienza non ha perpetuamente confermato i caricati encomj, che sono stati lor dati, quando avevano anche il seducantissimo merito della novità. I *laxativi*, come la manna, i tamarindi, il rabarbaro, e il *carbolium*, in questo caso vengono adoptrati con molta riuscita. Fassi altresì grand' uso degli *allentanti*, degli *addolcenti*, e dei *rinfriscanti*, come del brodo lungo di pollo, o di vitella, la ptisanina di consolida maggiore, o di pimpinella, il decotto bianco, l'olio di mandorle dolci, lo spermaceti, ec. Certuni danno anche il latte fatto bollire in tre quarti d'acqua; ed una tal bevanda è dicevolissima, allorchè la febbre ne permetta l'uso. I *calmanti*, dopo le necessarie evacuazioni, in questo caso riescono efficacissimi; tali sono il nitro, la canfora, il laudano, il diacodio, le goccioline anodine del *Sydenham*, ec. Si possono mescolare gl'ipnotici con i purganti, oppure fargli prendere dopo l'azione di questi secondi; ma bisogna bandirgli, quando vi ha alcun sospetto di cancrena. I *vulnerarij*, e i *balsamici*, come l'iperico, la brionia, il balsamo del Copahu, quello del Lucatello, ec. hanno luogo acconcissimo in questa medicatura. Si può talora far uso degli *assorbenti*, degli *stomachici*, e degli *astringenti*, come del corallo, e delle mele cotogne, del cascium, del diascordio, della triaca, delle rose rosse, e dei balaufti; della bistorta, e della tormentilla; dell'acaccia, del mastice, dell'allume, dei marziali, ec. Ma tutti i divisati rimedj ricchieggono molta circospezione, nè possono aver luogo, se non dopo avere amministrati gli altri. Sono eziandio prescritti con gran riuscita i *diaforetici*, come la scorzonera, il diascordio, la cina, ec. Finalmente il latte, l'acqua di Forges, e le altre *minevali* fredde ci danno grandi ajuti contro le dissenterie ostinate; come altresì il mutar aria, che per molti è stato il solo rimedio efficace.

Avremmo dovuto piuttosto parlare dei *lavativi*, che sono in questo male uno dei più rilevanti punti della cura.

cura : gli *addolcenti* , e i *deterfivi* sono i messi in opera con più familiarità : il latte , il brodo di trippe , di curatella di vitello , e di testa di castrato : i decotti di malva , di verbasco , di seme di lino , ec. somministrano la materia dei primi : la perforata , o sia iperico , la brionia , le rose , e lo zucchero rosso : i torli d'uovo , il miele , la trementina , ec. sono i principali ingredienti dei secondi : si fa uso anche talvolta dei topici , ora rilascianti , ora fortificanti ; ma non dobbiamo gran fatto fidarci dei loro effetti . Tutti i proposti rimedj possono essere applicati ad ogni specie di dissenteria ; ma dobbiamo combinarli con quelli della febbre maligna , allorchè la dissenteria ne prenda il carattere . Finalmente bisogna sapere , che in quasi tutte le epidemie conviene cambiar metodo ; a cagion d'esempio , le cavate di sangue , che sono state necessarie in un tempo , sono micidiali in un altro : si è fatta l'osservazione stessa rispetto all'ipecacuana , e agli altri emetici , rispetto alla simarauba , al latte , ec. Questa osservazione è delle più rilevanti in questo genere .

Non mi rimangono cose maggiori da suggerire pel *flusso epatico* : ciò , ch'io leggo negli Autori , non merita d'esser riferito , e la mia esperienza intorno a questo è stata limitatissima . Nulladimeno mi sembra (e ciò è il risultato di tutto quello , che m'è venuto fatto di raccogliere) che le *piante* , le quali senza ragioni sono state denominate *epatiche* , e le *amare* , come l'*agimonia* , la *cicoria* , l'*indivia* , la *scolopendra* , il *ra-barbaro* , la *centaurea minore* , ec. dopo i *rimedj generali* sono quelli , che più s'addicono a questo male : si sono anche amministrati gli *aperienti* , i *sudorifici* , gli *assorbenti* , e gli *stomachici* ; ma sembra , che non sieno state ritratti grandi vantaggi . Ho veduto dei buoni effetti dal latte ; ma pochi pazienti posson soffrirlo . Il *flusso mesenterico* dee esser curato come il vomito sanguigno , o come il flusso emorroidale , come quello , che tiene una strada di mezzo fra l'uno , e l'altro .

I L T E N E S M O .

E' noto , che addimandiamo mal de' pondi , o *premi* la voglia frequente di scaricare il ventre , e che in tale stato rendonci con frequenza delle mucosità bianche , sanguigne , e purulente : abbiám detto , che il tenesmo era un sintoma della dissenteria , e della diarrea ; ma appar-

appartiene eziandio a parecchi altri mali , come alla stranguria risvegliata dalla presenza della pietra , o da qualsivoglia altra cagione ; dalle emorroidi , dalle ascaridi , dall' esulceramento dell' ano , o dalla sua fistola . Dee temersi il *tenesmo* nelle femmine incinte , che vi sono grandemente soggette , come quello , che può dar motivo all' aborto : negli altri casi è più , o meno reo , a proporzione del male , di cui è sintoma , e verso il quale dobbiamo indubitatamente indirizzare la *medicatura* : questo però non vieta , che ponghiamo in opera alcuni rimedj colla mira di rintuzzare l' irritamento , come delle emulsioni , del brodo di riso , o di pollo , del siero , del latte , ec. I *lassativi* sono anche appropriati a tale effetto : tali sono la manna , la cassia , i tamarindi , il rabarbaro , ec. Gli *assorbenti* , e parecchi altri rimedj interni da noi proposti nell' articolo della dissenteria , posson giovare , da qualunque male dipendasi il tenesmo . I *clisteri* addolcenti , e deterfivi , che si posson render narcotici , col farvi bollire delle teste di papaveri , in questo caso fanno gran bene : possiamo ritrarre del vantaggio dal decotto dei fiori di sambuco nel latte , e da varie altre *fmente emollienti* , e risolutive ; dai *vapori* dell' acqua calda , dal decotto di brodo bianco , dalla malva , e da altre piante emollienti : dai *mezzi bagni* , dai *linimenti* fatti col *populeum* , ec.

LA COSTIPAZIONE.

Non è cosa rara il trovar delle persone , che stanno cinque , o sei giorni , senza scaricarsi il ventre : ve ne sono perfino di quelle , che aspettano a farlo dopo dieci , e dodici giorni , senza loro incomodo ; ma non veggionsi rispetto a ciò intervalli di venti , di trenta , o più giorni , qualora la persona non s' astenga da ogni alimento ; ed un tal caso non appartiene a questo articolo . Tuttavia quelli , che sono di *ventre infingardo* , vanno esposti a molti accidenti : tali sono le flatulenze , la colica , l' emorroidi , la tensione , e la gravezza del ventre , la svogliatezza , l' amarezza della bocca , le angietà , ed alcuna volta l' oppressione , la gravezza , e il dolore di capo , le vertigini , talora la passione iliaca , l' infiammazione del basso ventre , ec. Sonosi veduti di quelli , che negli sforzi per iscaricarsi il ventre son caduti apopletici , ed anche , come si pretende , epilettici . Nulladimeno un tale stato non dà molto da temere ,

re, qualora non è accompagnato da alcuno di questi accidenti. Quei che vivono nella dieta bianca; quei che son sottoposti a copiosi sudori, i melancolici, le isteriche, gli scorbutici, i gottosi, i letterati, ec. vi si trovano più d'ogni altro esposti.

Coll'ispezione anatomica abbiamo scoperto le budella prodigiosamente stivate d'alimenti, di bevanda, e d'escrementi, senza il menomo vizio apparente: sonosi vedute incavalcate, e prodigiosamente distese dalle flessure. In alcuni è comparso stivato il solo duodeno; e tenente in collo le materie, che doveva trasmettere alle altre budella: si è trovato lo stesso imbarazzo con assai frequenza formato da materie riarse, e indurite nel cieco, nel colon, e nel retto: nell'ileo, e nel colon si sono rilevate delle callosità, e dei fissamenti cartilaginei, che abbracciavano il canale, e formavano uno strangolamento. Sonosi trovati gl'intestini cancerati, putridi, e forati, con istravasamento nella capacità del ventre: vi si è trovata una materia mucilaginosa, abbondante, e riarisa; dei tumori fungosi, che chiudevano il passaggio; delle pietre, ec. Si sono osservati dei bernoccoli fatti dalle cicatrici nella loro superficie interna, ora in uno, ora in altro luogo; il colon stranamente dilatato, e fuor di luogo; il retto gonfiato, enormemente disteso, e stivato d'una materia calcinosa: finalmente si è trovato fuor di luogo lo stomaco, dante origine a tumori infaccati; il fegato scirroso, la cistifellea accasciata piena di pietruzze in secco: l'omento assai inspessito, ed incollato alle budella, dei tumori in altre parti comprimenti il condotto intestinale: la vescica estremamente dilatata dall'orina, racchiudente grosse pietre; dei tumori nella matrice, nella vagina, ec. che facevano la stessa pressione; per non parlare del raccoglimento d'acqua nel cranio, e nel condotto della midolla spinale, ed altri sconcetti, che possono dar motivo alla perilsità delle budella.

L'indisposizione, di cui parliamo, non sempre addimanda *rimedj*, ne gli dobbiamo amministrare, se non quando rendono necessariissimi; sendosi vedute persone, che hanno vissuto lungamente, cioè, fino agli 80. anni, e di vantaggio, che non si scaricavano, se non ogni tre, o quattro giorni, ed altri ogni sei, ed ogni otto, e che godevano per altro ottima sanità: quando però questo disordine la sconcerta, dobbiamo ricorrere ai *rimedj*.

medj. Talvolta vi è necessaria la *cavata del sangue*, singolarmente se vi sia motivo di temere l'infiammazione. Gli *allentanti*, i *rinfrascanti*, e i *lassativi* in questo caso son molto adoperati: tali sono il siero, i decotti di bietola, di brionia, di cavolo rosso, di mercuriale, d' uve secche, di fusine, l'infusione fredda di fiori di malva, l'olio di mandorle dolci, la cassia, la manna, i tamarindi, ec. A molti ha giovato il prendere ogni giorno una doserella di China-china, le pillole di *Schat*, lo sciroppo di genziana, ec. Talora siamo costretti ad amministrare la senna, il sale policresto, quello di Eptom, ed altri purganti; ma se ne dee schivare il frequente uso, sendosi cento volte sperimentato, che infievolivano il paziente, che dopo la loro operazione il ventre si costipava molto più di quello, che fosse per innanzi; il tartaro crudo in dose adeguata entro un brodo, con frequenza purga a dovere in questo caso, senza esporre l'infermo al divisato incomodo. Coloro, che hanno il ventre infingardo, debbon cibarsi di pane di segale, e di carne fredda; prendere il latte freddo, ec. L'erbe, le frutta, e più che altro le mele cotte, son loro proficue: a molti fa bene il servirsi della segale a guisa di caffè, il bere un buon bicchiere d'acqua prima di porsi in letto, il respirare il fresco della mattina, ec. Si può altresì ritrarre vantaggio grande dai *lavativi emollienti*, e purgativi, dei quali fanno i principali ingredienti l'olio, il burro, il sal gemma, il diasfenico, il *catholicum*, ed altri elettuarij: le *supposte* son parimente acconce a sollecitare il ventre: vi si fa entrare il sal gemma, la gialappa, l'agarico, l'aloë, la coloquintida, ec. Le *unzioni* con l'unguento d' arthanita, se non sieno per i bambini, sono d'un debole ajuto: i *bagni*, i mezzi bagni, sì semplici, che emollienti, con frequenza si praticano vantaggiosamente. Allorchè le fecce s' indurano, e si disseccano nell'intestino retto, lo che accade spessissimo a coloro, che fanno abuso d'assorbenti, debbonsi rompere con una spatola, affinchè i lavativi possano portarle fuori: ho trattato delle donne, che non potevano altramente scaricarsi: vi sono finalmente delle persone, che hanno trovato del vantaggio a camminare a piedi scalzi sopra un solajo freddo, e bagnato; ma un tal rimedio non è senza pericolo.

LA COLICA.

Questa infermità, alla cui etimologia non si bada punto, riconosce tante *cagioni*, ed ha una *sede così indeterminata*, che non è da maravigliarsi, che gli Autori non abbiano parlato colla maggior confusione del mondo: ne eccettuo però i Metodici, sì quali ce ne hanno descritte con molta nettezza le varietà; ma seguendo in ciò la sola loro immaginazione. Sanno i più esercitati Pratici, ch'è difficile il pronunciare sopra il *carattere*, e la sede di ciò, che si sono avvissati di chiamar *Colica*, e che le conseguenze, o l'apertura dei cadaveri smentiscono tutto di il giudizio precipitato, che n'è stato fatto: tanto son simili infra loro le *differenti specie*. Dico anche di più: uno s'inganna con grandissima frequenza intorno al genere, medicando per colica intestinale, ch'è un male passeggero, i dolori del fegato, dei reni, e delle altre viscere, dipendenti da abissi, da ulceri, da scirri, e da altri intacchi, che sono di lunga durata. Se, seguendo l'esempio di tanti altri, mi prendessi in questo luogo la libertà di tener dietro alle mie idee, potrei formare sopra questa infermità un Articolo, che potrebbe appagar coloro, che non sono esercitati nella Pratica; ma siccome io non ragiono, che sopra l'osservazione, la quale lascia perpetuamente dei gran vuoti, così altri non dee promettersi in ciò quell'ordine, e quel piano, che si ammira nell'altre Opere. Tratterò soltanto della *colica biliosa*, della *flatulenta*, della *spasmodica*, e di quella dei Pittori, perchè tutte le altre possono riferirsi a queste quattro specie, che ci si offrono più familiarmente.

La *colica biliosa* si manifesta coll'amarrezza della bocca, e colla sete; pel calore abbrugiante delle viscere, e per la qualità delle materie, che si restituiscono non meno per vomito, che per secesso. Il dolore più, o meno intenso, ora è fisso, ora errante: corrisponde al bellico, quando il digiuno, e l'ileo sono intaccati: si riferisce allo stomaco, o agl'ipocondri, quando occupa il colon, e allora si stende anche fino all'anguinaja: si fa sentire nel dorso, se ha la sua sede nel duodeno, o nel principio del digiuno: la maggior parte dei pazienti si lagna d'un dolor simile a quello, che potrebbe risvegliare una corda, che gli ferrasse. Il vomito, e lo scioglimento del ventre nella colica biliosa, sono

talora eccessivi: si cangia questa anche in passione iliaca, o in morbo colera, e può anche dar motivo alla paralisi, e perfino alle convulsioni. Non è questa di lunga durata; ma ella torna con empito orribile, che risveglia talora l'infiammazione: bene spesso, quando se ne giudica soltanto dalla sede del dolore, s'assomiglia alla nefritide; ma non vi segue, come in questa seconda, il ritiro del testicolo: oltredichè il vomito, e le evacuazioni per secesso nella biliosa sollevano l'infermo, e non arrecano alcun sollievo nell'altra: inoltre nella prima le orine son fisse, e per lo contrario nella seconda son chiare, o mancano totalmente.

Importa l'osservare, che la *colica biliosa* ha con frequenza la sua sede nel solo duodeno: allora assomigliasi molto alla caldialgia, alla colica epatica, e alla nefritica, ed anche si medica d'ordinario per l'uno, o l'altro di questi mali. Dirò qui di passaggio, crederli con molto fondamento, che il duodeno sia la fucina della maggior parte delle febbri, e che i dolori di schiena, che ne sono il sintoma più ordinario, vi son tramandati dal mesenterio. Si congettura altresì, che le ansietà, e i dolori, che precedono la colera, e il vomito bilioso, hanno la principal sede loro in questo intestino: non solamente può eccitarvi delle grandi sensazioni la bile depravata, e stanziate nella sua cavità; ma eziandio i vermi, che vi si trovano con non minor frequenza, che nello stomaco, o nelle altre budella.

La *colica flatulenta* ha grande affinità colle seguenti, e par, che dipenda comunissimamente da un' affezione spasmodica: i borbottamenti, e i tormini; l'emissione delle ventosità, sì per bocca, che per secesso; il gonfiamento, e la tensione del ventre, e sovente la difficoltà del respiro, la distinguono bastantemente dalle altre coliche. Il dolore più, o meno acuto, è talvolta fisso, ma con più frequenza errante; è più terribile nel duodeno, e nelle altre budella delicate: la parte superiore del colon ne è con grandissima frequenza la sede; e la vicinanza dello stomaco, e del fegato, fanno sì, che talvolta se ne possa a stento far giudizio. È accompagnata da sbadigliamenti, da nausea, dalla cardialgia, dalla costipazione, e da altri sintomi da noi già indicati: il distendimento delle budella è talora tanto violento, che viene ad essere sforzato il bellico, e viensi a formare un'ernia.

La *colica spasmodica*, la quale tutt'chè frequente, è per lo più ignota, dipende dall'intacco dal sistema nervoso, e conseguentemente non ha alcuna sede fissa neppur nello stesso attacco, come possono agevolmente osservar coloro, che ne sono prevenuti: i dolori vaghi gettandosi sopra diverse parti, imitano la colica stomachica, l'intestinale, l'epatica, la renale, ec. ed è tanto più facile l'ingannarsi, quanto queste eccitano sintomi stessi, come il vomito, la costipazione, la soppressione delle orine, il tremore, l'oppressione, le ansietà, gli svenimenti, il singhiozzo, i sudori freddi, le convulsioni, il delirio, ec. In tali circostanze il polso è duro, picciolo, e talvolta febbrile; il respiro inceppato, ec. I dolori d'ordinario mutan luogo; ora si credono nello stomaco, ora negl'intestini, nel fegato nei reni, nella vescica, ec. Hanno questi delle intermittenze, e durano meno di quelli, che riconoscono un vizio locale, fisso, o mobile, nelle viscere pur or nominate. Tuttavia gli ultimi talora danno luogo a quello, di cui parliamo; e queste complicazioni sembrano anche molto comuni. In questo caso importa assai più il conoscere perfettamente il suo soggetto, ed esser affatto di tutto quello, ch'è innanzi accaduto. La colica spasmodica è sottoposta alcuna volta a periodi, ma non riconosce di pari, che le altre tutte, alcun disordine nel governo. Più che ogn'altro vi vanno soggetti i melanconici, e i letterati.

La *colica dei Pittori* potrebbe aver luogo nella classe della precedente, come quella, che pare ugualmente spasmodica; ma la natura della sua notissima cagione non ci permette il confonderle. I dolori, in quella, di cui ragioniamo, la quale è molto comune, e talora anche epidemica, son meno erranti, e perpetuamente rinchiusi nel condotto intestinale, o nel mesenterio: i medesimi son crudeli, e la malattia è più lunga: si nomina anche la *colica dei vasa*, e dei *piombaj*, ec. Unisco alle mie osservazioni quelle, che si è compiaciuto di comunicarmi M. Senac primo Medico del Re, che ha avuto occasione di medicarne grandissimo numero, e con tutta quella riuscita, che altri si può promettere dalle sue cognizioni. Questo morbo, che dura il più delle volte quei dodici, o quattordici giorni; ma che può terminare in quattro, o in cinque, par che abbia la sua sede, come dicemmo, nel mesenterio: è

con-

considerabilissimo a motivo di sua veemenza , che precipita alcuna volta i pazienti in una specie di disperazione: questi non hanno per lo più ; nè sete, nè febbre : il lor polso è inceppato; i dolori si stendono sopra varie parti del corpo , e più spesso son fissi , che erranti, ma con remittenze; eccitano questi nausea , e talora un orrido vomito. Le flatulenze son più, o meno manifeste: le orine si fermano, o sciolano assai scarsamente; e il ventre è a segno costipato, che si stenta assai volte a far passare i lavativi. I muscoli del basso ventre si tendono accostandosi alla spina, ed il bellico par che s'incaverni: questo segno si considera anche come patognomonico. Sono gl'infermi perpetuamente vessati da inquietudini, e smanie: provano dei brividi, e talvolta delle contrazioni, o degl'intorpidimenti di membra; per non parlare del singhiozzo, delle convulsioni, dei sudori freddi, degli svenimenti, ed altri atroci sintomi, che talora accompagnano questa crudele infermità: può la medesima degenerare in paralisi, in asma convulsiva, ovvero lasciare dopo di sé l'itterizia, lo scioglimento del ventre, ec. Tuttavolta non vi ha cosa, che meglio la distingua dalle altre specie di colica, della cognizione della sua cagione, che consiste nello scioglimento del piombo, che porta la sua azione sopra le prime vie.

Coloro che bevono il vino addolcito col *litargirio*; Pittori, che fanno uso di varie *preparazioni di piombo*; quei, che lo purificano, e lo separano dall'argento: i vasaï, che lo fanno entrare nelle vernici loro: quei, che bevono dell'acqua passata per canali, o vasi di piombo, ec. vi sono grandemente esposti. Molti operaj, che ne hanno fatto una trista esperienza, se ne difendono coll'astenersi dal vino, il quale, senz'essere adulterato, può servire di dissolvente alle particelle di questo metallo, le quali s'incontrano nelle prime vie: altri se ne difendono col prendere ogni giorno nell'acqua alcune goccioline d'olio di tartaro per *aliquo*, che è noto, essere un potente correttivo d'gli acidi.

La colica generalmente parlando può essere il sintomo d'un altro morbo, come dell'affezione ipocondriaca, e isterica, dello scorbutico, della diarrea, e della dissenterie, dell'infiammazione del basso ventre, delle ernie, ec. Ella è la conseguenza delle febbri maligne, della traspirazione troncata, della soppressione dei men-

firui, o dello sgorgo emoroidale, delle fioriture cutanee, della gotta, del reumatismo, del calcolo dei reni, del porro, della dentificazione, ec. E' la medesima eccitata dagli emetici, dai purganti, e dai vermi; dai vermi, dal rattenimento delle fecce, dal raffreddamento dei piedi, ec. Ella si è parimente il preludio d'alcune febbri intermittenti, della fioritura menstruale, ec. Ma tutti questi casi riguardano altri Articoli di pari che un'infinità di dolori, che hanno la loro sede nel fegato, nella milza, nel pancreas, nella matrice, nei reni, ec. Quasi sempre spiana la strada alla colica un qualche fallo nel governo, siasi questa di qualunque specie essere si voglia: le più terribili, e pericolose sono la *spasmodica*, e quella *dei pittori*; quella che dà manco da temere si è la *flatulenta*. Credo inutile il dire, che si teme meno la colica: che muta luogo, di quella, che rimane immobile: è anche abbastanza noto, che il singhiozzo, la febbre, e i brividi, le ansietà, gli iverimenti, ec. son pessimi sintomi: ho già fatto osservare, come la medesima può dare origine a dissenteria, in passione iliaca, in morbo colerico, ec. ovvero, che era talvolta seguita dall'iterizia, dall'epilessia, dalla paralisi, dalla cecità, ec. Si è finalmente veduto più volte la colica dileguarsi per via di sudore, per un'emorragia dal naso, dalle emoroidi, e dalla matrice, dalla fioritura di tacche scorbutiche, da un accesso di gotta, ec.

Le osservazioni anatomiche relative al nostro soggetto sono in grandissimo numero; ma se queste ci fanno vedere tutti gli sconcerti, che possono risultare alla colica, le medesime ci insegnano altresì, che si è spesso fatto abuso di questo termine con applicarlo a molti mali, che appartengono ad altri Articoli. Sonosi trovati gl'intestini, e singolarmente i delicati, infiammati, esulcerati, o con abcessi: i loro vasi stivati di sangue, e sommamente manifesti sopra la loro convessità: sonosi veduti questi canali, e singolarmente il duodeno, ed il colon, trasparenti prodigiosamente distesi dalle flatulenze, e perfino lacerati: la cavità del duodeno, del digiuno, e dell'ileo inondata, di bile porracea, nera, ec. Sonovisi trovati dei vermi, come nelle altre budella: nei grossi intestini si è trovata la materia delle fecce disseccata: sonosi rilevate negli uni, e negli altri delle concrezioni pietrose, dei corpi eteroge-

nei inghiottiti, varj nocciuoli con degli incrostamenti, ec. il condotto intestinale, di pari che le altre viscere incavate, e membranose, riprender di rado la elasticità, allorchè glie l'ha tolta un enorme dilatamento. Io ne ho ultimamente veduto un esempio in un soggetto di cinquant'anni, che un anno avanti aveva patito una colica delle più atroci, e che non aveva quasi mai cessato fin da questo tempo di lagnarsi di dolori di viscere: tre, o quattro piedi del digiuno prodigiosamente dilatati, e fuor di luogo sonosi offerti nella prima apertura: l'estremità di questo sacco, che avrebbe potuto racchiudere un popone di mezzana grossezza, in cui si tentava a trovare la continuazione del canale, era in parte cancrenata, ed anche lacera, in quella guisa che osservansi comunemente dopo la timpanitide. Sonosi anche trovati in altri soggetti gl'intestini intonacati esteriormente di quella materia gelatinosa, e purulenta, della quale più volte abbiamo parlato: i piccioli incolati insieme con della putrefazione: finalmente sonosi osservate delle callosità nelle loro tuniche, che formavano degli strangolamenti, e con più frequenza degli scorciamenti, senza cagione manifesta, molto spessi nell'estremità del duodeno. Non è stata la sola parte intaccata il condotto intestinale; sendosi trovato scirroso il mesenterio, che racchiudeva degli abscessi, dei tumori anomali, delle idatidi, il peritoneo infiammato, con abscessi, o cancrenato, e con del sangue sparso per entro il suo tessuto celiulare: l'epiploon scirroso, cancrenato, e distrutto, pieno di ventosità, e di marcia nella sua piegatura; aggomitolato; i suoi vasi stivati, o varicosi, ec. le ultime costole, che a motivo di lor piegatura intaccavano il colon, la qual cosa abbiamo osservata nei soli vecchj. Si è finalmente veduto lo stomaco infiammato, difeso dalle ventosità, e cancrenato: il fegato scolorito, scirroso, infiammato, putrido, d'un mostruoso volume, pieno di tubercoli, d'idatidi, ingenerante dei tumori infaccati, ec. la *cistifellea* lacerata, e la bile sparfa entro la capacità; il suo sacco vuoto, e accatciato; delle ostruzioni prodotte da pietruzze nel condotto biliare. Si è trovata la milza putrida, gonfiata, e fuor di luogo, calante fino al bacino: il pancreas scirroso, infiammato, con abscessi, esulcerato, cancrenato, e putrido. Si è incontrato il dilatamento straordinario della porzione dell'*aorta*, che dà

origine alla celiaca, e alla mesenterica superiore; *per* non far parola di varj vizj dei reni, della vescica, delle capsule atrabiliari, come, a cagion d'esempio degli stravassamenti terosi, sanguigni, e saniosi, non meno nel basso ventre, che nella testa. Questo è il risultato ristrettissimo di tutte le osservazioni fatte sopra i cadaveri; ma è bene il riflettere, come dopo le coliche spasmodiche recenti, non trovansi nelle budella che sole flatulenze.

Tutte le specie di coliche, per quanto numerose, e varie, ch'elleno sieno, quasi sempre vengon medicate nella guisa stessa: le *cavate del sangue*, gli *evacuanti* delle prime vie, gli *allentanti*, i *lubrificanti*, gli *addolcenti*, e i *calmanti*; i topici emollienti, i panni lini caldi, i bagni, ec. sono i rimedj perpetuamente adattati a calmare i dolori del basso ventre, sienosi di qualunque natura essere si vogliano, e siasene quale esser si voglia la sede: si applicano parimente ai dolori del fegato, dei reni, e d'altre viscere dell'addome. Un' tale osservazione può premunirci contro gli equivoci, e gli errori, nei quali si cade con tanta frequenza, allorchè si vuol far giudizio intorno al carattere della malattia: nientedimeno è evidente, che questa medicatura dee esser variata non solo per le coliche, che sono di natura diversa, ma eziandio per rapporto alle circostanze, che le accompagnano.

Ci ha l'esperienza insegnato, che la colica biliosa vuol più *cavate di sangue*, che le altre specie. Gli *allentanti*, e gli *addolcenti*, come il broto lungo di pollo, o di vitella, il siero, l'olio di mandorle dolci, lo spermaceo, ec. vi sono ugualmente necessarij: l'acqua fresca per bevanda totale talora è più efficace. Le evacuazioni procurate per mezzo degli *emetici*, e dei *purganti* senza dubbio vengono patentemente indicate; ma non le possiamo mettere in opera in tutti i tempi. In questo caso danno un grande ajuto gl'*ipnotici*, ma l'abuso fattone sull'esempio del Sydenham, mi è stato perpetuamente sospetto. Si fa anche un grand'uso dei lavativi emollienti, anodini, e rilascianti, come delle fomentate, delle vesciche piene di latte, dei panni lini caldi, dei bagni, ec. In questo caso è grandemente raccomandata la *camomilla*, non meno per bocca, che esternamente. Ultimamente si è amministrato per le coliche abituali il latte, le acque minerali, gli aperien-

ti, i sudorifici, gli antiscorbutici, e altri rimedj molti, che richieggono le circostanze, le complicazioni, e la malattia principale, di cui la colica non era che un ramo.

La *colica flatulenta* non vuole assolutamente la cavata del sangue, la quale però non lascia talora d'esser proficua. Gli *allentanti*, gli *addolcenti*, e i *calmanti*, de' quali tante volte abbiamo parlato, vi s'impiegano con frequenza, ugualmente che i *rilasianti*, quando vien permesso di praticargli dalle circostanze. I *carminativi*, dopo aver amministrato i primi, vi fanno gran bene, malgrado ciò, che se ne dicano molti moderni, i quali hanno per avventura badato più alla loro teoria, che all'esperienza. Facciamo anche un grand'uso dei lavativi addolcenti, emollienti, calmanti, e carminativi, come altresì di tutte le applicazioni esterne, che possono allentare, e rilasciare.

Le *cavate del sangue* non s'addicono alla *colica spasmodica*: richiede questa soltanto degli *allentanti*, e degli *addolcenti*, come il siero, il brodo lungo di pollo, l'olio di mandorle dolci, lo spermaceti, ec. I *calmanti*, sì *ipnotici*, che *antispasmodici*, come le goccioline anodine, e la tintura di castore mescolate insieme; il laudano, il diacodio, ec. d'ordinario la guariscono radicalmente; ove per lo contrario non fondò niente più che rimedj palliativi nella colica, che riconosce una cagione presente nel condotto intestinale. Dopo questi rimedj, i *lassativi* sono gli amministrati con riuscita migliore: questi rendono tanto più necessarij, in quanto segue assai volte in questa specie di colica, che le ventosità, e gli escrementi sieno rattenuti nel colon. Si fa anche uso grande dei lavativi emollienti, calmanti, e carminativi: vi si aggiunge il sal gemma, quando le materie stercoracee trovansi inceppate. Le fomentate, e i cataplasmi emollienti; i bagni, e i mezzi bagni; i panni lini caldi, le vesciche piene di latte caldo, ec. in questo caso fanno gran bene, come nelle altre coliche.

La medicatura, che si addice alla *colica dei pittori*, tuttochè spasmodica, secondo le apparenze, non è assolutamente la stessa. Si è osservato, non esserle contraria la cavata del sangue, ma che se ne ritraeva poco vantaggio. Si fa uso, come nelle altre, degli *allentanti*, degli *addolcenti*, degli *antispasmodici*, e dei *narcotici*; ma questi ultimi debbono prescrivere con riserva, perchè non accelerino la paralisi, dalla quale son

minacciati per la maggior parte questi infermi. L'*emmetico* preceduto dagli allentanti, e dagli addolcenti, è il rimedio più sicuro, che si possa usare, non meno per fermare il vomito, che per dileguare i dolori di stomaco: si calma in seguito quello degl' intestini col far prendere ogni tre ore un' oncia, o due d'olio di mandorle dolci, con circa la metà d'acqua vulneraria. I buoni effetti prodotti da questo rimedio, empirico quale egli è, hanno obbligato M. Senac a servirsene: tutta volta non debbono trascurare i lassativi, che debbono reiterar con frequenza, come altresì i lavativi addolcenti, e emollienti, ai quali s'aggiunge l'olio di nocciuola trementina, il balsamo del Copahu, l'olio d'anacardi ec. Ma l'esperienza ci ha fatto vedere, come quelli che ne quali entrava il vino emetico, la coloquintida, e altri stimolanti, producono effetti più sicuri, e più spediti. I topici emollienti, de' quali abbiamo già parlato, sono anche in questo caso appropriatissimi. Se questa colica precipita nella paralisi, s'investe con i rimedj ordinarij; ma sembra, che vi si addicano di vantaggio le acque minerali. Se lascia dei dolori nella membrana, questi si distruggono con i *distrucitivi*, e con i *suponacei*: i brodi aperienti col tartaro minerale sono stati amministrati in tali circostanze con ottima riuscita. Finalmente si è provato, come l'uso della fenella poteva tener lontana questa malattia, per non parlare del governo, e dei mezzi da noi additati. M. Dubouche Medico della Facoltà di Parigi, e ch'è stato per lungo tempo incaricato dello Spedale della Carità di questa Dominante, ove si veggiono molte di queste intermitte, si serviva d'*altra meacatura*. Rigettava le cavate di sangue, gli oleosi, e gli altri addolcenti, de' quali si fa uso così copioso in queste occasioni, nè permetteva ai pazienti altra bevanda, che una *pisana diaforetica*. Pel primo giorno si contentava dei soli lavativi addolcenti, anodini, e purganti; amministrava il secondo giorno il bicchiere antimoniale, o qualsivoglia altro emetico, e la sera dello stesso giorno, la triaca con un grano d'oppio: nel terzo giorno rinnovava questo calmante, e prescriveva un *purgante stimolante* pel quarto giorno, assicurando che questa specie di colera medicata in questa guisa, rade volte s'inoltrava di vantaggio.

Potrebbe altri per avventura riprendermi di trascuratezza, qualora io lasciassi di parlare della colica det-

a del Poitou (*Colica Piclorum*) : più famosa presso i moderni scrittori, che nota ai Pratici : vien supposto, che nel Poitou questa sia endemica ; ma in sostanza non vi è più nota di quello sialo altrove . Un tal *Citors*, che fu il primo a così denominare una specie di colica, che dominava nel tempo suo , la pone fra la classe delle biliose . Afferra questa, dic' egli, in un subito : i pazienti impallidiscono , e precipitano in un estremo languore : hanno fredde l'estremità, provano degli svenimenti , e delle cardiaglie : vomitano della bile porracea , e son tormentati dal singhiozzo : eccessiva è la lor sete, tuttochè non abbian febbre : il ventre è costipato, e le orine colano a stento : i pazienti si lagnano d' un calor grande nello stomaco, e negl' ipocondri ; di dolori acutissimi , non meno al ventre , che ai lombi ; alle spalle, al petto , ec. Sembra loro d' avere il ventre serrato da una corda, che passi sopra lo stomaco, ove sono manifeste le pulsazioni della ciliaca : i dolori si calmano ; ma questa calma è seguita dalla paralisi delle estremità, conservando però il sentimento . Questa paralisi dura più mesi, e non si dilegua , che a lentissimo passo : è talvolta la medesima preceduta da un' affezione epilettica , che può esser mortale , e questa seconda da un acciecamiento di più ore , o di più giorni, con tutta la libertà del discernimento . Questa colica, della quale pare, che la paralisi sia la crisi, è più crudele per le femmine, sebbene vi sono manco soggette : è ancora terribile per i vecchi .

L' Autore da noi citato pretende , che i vini aspri , le fatiche eccessive , le passioni violente , ed il ventre abitualmente costipato , sieno le cagioni ordinarie di questo morbo , contro il quale ei propone la cavata del sangue sì dal braccio , come dal piede , avendo osservato, che il flusso menstruale, ed emorroidale erano stati vantaggiosi a molti infermi : ei si duole del pubblico prevenuto contro questo rimedio : ma non avrebb' egli trovato la stessa disapprovazione in molti Medici ancora ? Servivasi poscia dei purganti miti , in vece dei drastici , dei quali si servivano gli antichi , molto più acconci a fradicare la cagione del male : confessa anche di buona fede , che i minorativi di rado calmavano i dolori , e che sarebbe più atto a produrre questo effetto il *Crocus metallorum*, o qualsivoglia altro *emetico* . Ei faceva eziandio uso dei *calmanti* narcotici ; si serviva

dei clisteri addolcenti col latte, col brodo di trippa col vino, e coll'olio, ec. di pari che delle fomenta emollienti, dei mezzi bagni, ec. e sulla fine dava i teraperanti, e gli aperienti, le acque ferrate, le acidule ec. Da tutto il da noi riferito non sembra, che quest' infermità abbia un carattere particolare, che possa distinguersela dalle altre coliche; anzi mi pare al contrario, che non ne sia altro, che l'ultimo grado, del quale, senza ragione siasene voluta fare una nuova infermità.

Io rinvengo una pianissima prova del mio sentimento nell' Opera stessa, che M. *Tronchin* ha pubblicata sopra questa materia. Questo scrittore accorda, che una siffatta specie di colica, la quale va a finire nella paralisi, o nell'epilepsia, e nota da molto tempo, e descritta sotto varie denominazioni: egli aggiunge alla descrizione, che ne dà *Civots*, che il bellico rientra verso la spina, che i dolori sono preceduti bene spesso da un peso nel basso ventre, che dura due, o tre giorni, e che questi sono accompagnati dal tenesmo: che la voce divien ruoca, e s'estingue; che gli occhi si oscurano; che i dolori articolari calmano quelli del ventre e annunziano la paralisi; finalmente che l'epilepsia che la precede, è più lunga della vera. L'opera, di cui diamo l'estratto, è più estesa di quello annunziato nel suo titolo: vien fatta menzione di più specie di coliche, le quali si riferiscono ad altrettante differenti cagioni, e vogliono una medicatura tutta particolare. Tali sono: 1. La colica, che vien dopo le febbri mal curate, e che il più delle volte è seguita dalla paralisi, dalle convulsioni, e dal letargo. L'Autore rigetta in questo caso gli emetici, i diafici, e i narcotici, e propone gli antispasmodici, i mezzi bagni, le fomenta, i cataplasmi, e i lavativi emollienti, i rilassanti, come una mescolanza di manna, di cassia, e d'olio di mandorle dolci, di cui ne fa prendere ogni due ore un grasso in circa in un bicchiere di siero: egli stima ancora nell'occasione medesima il sugo di beccabunga, quello di tarassaco, e finalmente l'uso delle acque acidule. 2. La colica dipendente dai veleni provenienti dal piombo, dal rame, dal cinabro, dalla cerussa, dal verderame, dall'antimonio, e singolarmente dal vino addolcito col litargirio, o collo Zucchero di Saturno, la cavata di sangue, dic'egli, non s'addice che ai giovani, ed ai vigorosi: egli approva l'emetico dato sul principio, e poscia i calman-

ti, le fomenta, i cataplasmi, e i lavativi emollienti, i bagni, e finalmente i rilascianti, come il siero: consiglia ancora i vescicatorj alle gambe. 3. La *Colica cagionata dai vini aspri*, e da altre bevande acide. Disapprova la cavata del sangue, e gli emetici, e i drastici: amministra però uno, o due grani di *tartaro stibato*, e dipoi un *narcotico*, senza trascurare i clisteri, le fomenta, e i cataplasmi emollienti; i bagni sembrangli sospetti; si serve dell'olio di mandorle dolci, e degli altri rilascianti, del brodo lungo di pollo, del latte tagliato con l'acqua di Seltz; e finalmente delle acque marziali per lo spazio d'un mese, e di vantaggio, alle quali unisce l'esercizio a cavallo. 4. L'*Artetica*, e la *reumatica*, che va talvolta a finire nella paralisi, e neile convulsioni: crede proficua la cavata del sangue, se le forze la permettano: schiva i vomitivi, e i purganti violenti, e fa incontanente applicare i vescicanti alle gambe, ch'ei lascia purgare per lungo tempo: propone altresì le coppette a vento alla pianta dei piedi, che fa rinnovare mattina, e sera, le fomenta alle gambe, oppure il bagno vaporoso alle medesime parti; i rilascianti, i lavativi; e finalmente il latte: ei porta opinione, e non senza ragione, che importi il conservare la traspirazione, e che per tale effetto sia adattatissimo l'esercizio a cavallo: finalmente permette il vino a quei, che hanno rovinato le forze. 5. La *colica* proveniente dalla traspirazione troncata: egli crede, che il più delle volte sia necessario il cavar sangue, e che facciano gran bene i rilascianti, e gli oleosi: approva le coppette, e i vescicanti al ventre, i lavativi addolcenti, ec. Propone una bevanda diaforetica, come l'infusione del *sassafras*, picciole dosi di laudano colla doppia dose di canfora; e finalmente riconosce il vantaggio delle acque minerali sulfuree. 6. La *scorbutica*: stima egli pericoloso il cavar sangue, e raccomanda l'uso del siero, e dei rilascianti, come la cassia, la manna, e l'olio di mandorle dolci, e mette in opera a un tempo stesso i rilascianti esterni. Propone i vescicanti alle gambe; e finalmente l'uso delle acque ferrate, ed altre, senza pregiudizio degli antiscurbutici. 7. La *Colica dei melancolici*, che per coerente alla biliosa: ei si dichiara, che il sangue, gli emetici, e i drastici, sono inutili: che dobbiamo starci all'uso, sì interno, che esterno, dei
rila-

rilasianti, a quello del siero, dei lassativi, ec. non teme le unzioni coll'unguento d'*arthanita*, e ricorre per ultimo alle acque acidule intiepidite, all'esercizio a cavallo, ec. 8. La *colica*, che nasce dalle passioni violentemente familiare alle isteriche, e agl'ipocondriaci: confidava per micidiale il cavar sangue, e l'emetico, di parte che per pericolosissimi i purganti: crede, che i pazienti abbiano bisogno del riposo del corpo, e dello spirito, e che possa lor procurarsi per mezzo dei narcotici: propone i lavativi, e le fomentate emollienti, il pediluvio, le coppette alle coscie, e il sinapismo alle gambe: non rigetta i lassativi; ed approva l'uso del latte: propone in oltre la China-china, ed i fortificanti; finalmente crede, non meno per questo caso, che per gli altri tutti enunciati, che possansi ritrarre dei grandi vantaggi dal mutar aria. Per ciò, che riguarda la paralizia, che può venire in conseguenza di tutte queste specie di colica, ei propone i bagni, le fregagioni, e l'esercizio: vuole, che s'introducano i membri paralitici nel ventre d'animali, o che s'inviluppino nella loro pelle; la qual cosa può reiterarsi più, e più volte: raccomanda l'uso interno ed esterno delle acque termali, le unzioni coll'unguento marziale, ec. Approva l'uso interno del balsamo del Perù, della gomma ammoniac, ec. Finalmente consiglia il mutar aria, l'uso del vino, ec. Tale è il metodo proposto da M. *Tronchin* per la medicatura d'ogni specie di colica, che egli ha creduto riferire a quella del *Poitou*, la quale, siccome è agevole il rilevare, non è altro che l'ultimo grado di tutte le da esso noverate.

FLATULENZE, E TIMPANITIDE.

Non vi abbisogna gran fatica per spiegare il *meteorismo* delle prime vie: se gli alimenti vi si riscaldano a un certo dato punto, non meno a motivo del loro stanziarvi, che per altre circostanze, soffron questi una tale scioglimento, che pone in libertà le molecole aeree, le quali si trovavano intimamente unite alla loro sostanza: questo fluido libero, e sprigionato, forma delle bolle, o masse, che indarno si presentano all'imboccatura delle vene latte, e che non trovano uscita, se non dalla parte della bocca, o del secesso. Per certo, che le flatulenze, a motivo del calore sommamente elastiche, possano cagionare nello stomaco, e nelle

budella delle distensioni dolorosissime, quali appunto si provano nella colica flatuosa, di cui abbiám ragionato; ma con frequenza grandissima loro s'attribuiscono dolori puramente spasmodici, e che al più possono dar motivo alla formazione delle ventosità col ritardare il corso ordinario delle materie contenute nelle prime vie: non si danno persone, che sentono ogni giorno dei rumoreggiamenti quasi continui di ventre, che espellono prodigiosa quantità di flatulenze, e che provano perfino dei gonfiamenti considerabili, senza provare il menomo dolore? dove per lo contrario altri, che ne hanno molto meno, ne soffrono dei sommamenti acuti. La presenza delle ventosità si manifesta bastantemente per i barbottamenti, per la loro esplosione, per la gonfiatura dello stomaco, degl' ipocondrij, e di tutto l'addome: allorchè non vi ha alcuna complicazione, e che queste ventosità posson farsi strada, non cagionano il menomo sconcerto; ma la cosa passa diversamente, se queste sopravvengono alla febbre, o se s'imbattano in un' effusione spasmodica, sorgente ordinaria degli strangolamenti, che s'oppongono alla lor carriera: in tal caso soffron queste una tumultuosa rarefazione, che precipita i pazienti in nausea, in triste ansietà, e per fino in deliquj; e che cagiona la tensione del ventre con dolori più, o meno acuti, e la costipazione: eccitano anche la cefalalgia, le vertigini, l'oppressione, ec. I rutti inspidi, acidi, o putridi, additano lo stato delle digestioni: si ritrae la cognizione stessa dai venti, che sboccano pel secesso alcuni dei quali non hanno odore, ed altri contraggono varj gradi di reo odore. Abbiamo detto, che addimandavasi *colicera secca* la loro esplosione frequente per tutt' e due le strade: sono questi talora così copiosi, che prenderebboni i pazienti per vere eolipile: quei tali, che per decenza sono obbligati a ritenergli, s'espongono alla colica ventosa, e alla timpanitide, e non ne mancano esempj.

Si può considerare la *timpanitide* per l'ultimo grado delle flatulenze, o della colica flatulenta: si manifesta la medesima per l'elevamento, e per la tumefazione straordinaria del ventre, che si tende talvolta come un tamburo, ma che molto raramente ne rende il suono, benchè gli Autori tutti, i quali si copiano l'un l'altro, danno questo fenomeno per un segno patognomonico di questo male: io l'ho fatto esaminare ad alcu-

alcuni Medici sommamente prevenuti di questa opinione, i quali non hanno lasciato d'accordare, dopo varj tentativi, che non era fondata. Il tumore del ventre per lo più minore di quello, che produce l'ascite, non cambia nè di figura, nè di volume: per qualunque situazione, che si prenda, non vi si sente alcun peso: non vi si rileva alcuna fluttuazione, come nell'ascite: vi si osservano per altro delle alternative d'accrescimento, e di diminuzione, che non si osservano nelle inondazioni acquose, i cui progressi sono più lenti, e più costanti. La *timpanitide* è accompagnata da dolori non meno nel ventre, o alle vicinanze del bellico, che alla schiena; dalla totale inappetenza, dalla vigilia, e dall'emaciamento, e talora anche dal vomito: si lagnano i pazienti d'una grande oppressione, e d'ansietà: la maggior parte d'essi son tormentati da una tosse secca, e dall'inceppamento del respiro, con delle disuguaglianze nel polso: fanno devani tentativi per espellere le flatulenze, e son tormentati dalla costipazione: negli ultimi periodi restituiscono tutto quello, che si fa loro prendere, e precipitano ancora in una vera affezione iliaca. L'aria non trovandosi perpetuamente rinchiusa nello stomaco, e nelle budella: stanZIA talora nella cavità del ventre, od in tutt'e due i luoghi: quando lo stomaco è la sede principale della malattia, si stenta ad inghiottire, il respiro è più inceppato, provansi palpitazioni, ansietà, bagliori, infiammamenti di volto, ec. la regione di questa viscera è patentemente più tesa, i rutti sono più frequenti, e più proficui, ec.

Gl'ipocondriaci, e le donne isteriche; i nefritici, e i gottosi; quei che hanno il ventre insingardo, e le cui perdite di sangue son sopresse, trovansi più degli altri sottoposti ai mali flatulenti: sono questi bene spesso il prodotto di crudezze acide, e putride: è noto esservi molti alimenti, che ingenerano delle ventosità: tali sono i differenti legumi, le frutta cucurbitacee, il pesce, ec. Può anche darvi motivo il patir freddo alle gambe. I fanciulli, le donne, e singolarmente quelle di parto, i vecchj, e i Letterati sono di pari sommamente esposti alle flatulenze, e alla *timpanitide*: questa seconda vien dietro con frequenza alle malattie gravi, agli sborfi eccessivi di sangue, alle febbri intermittenti malmedicate, ec. E' noto inoltre, che l'aria
nel-

nelle febbri si disimpegna dalle materie putride, non solo nelle prime vie, ma eziandio nei vasi, ove talvolta se ne trova in gran copia.

I venti rattenuti possono cagionare degli sconcerti grandissimi, come la colica, il soffogamento, la timpanitide, la passione iliaca, l'apoplessia, ec. Rendono più gravi le febbri: si fa, che nella maggior parte degl'infermi il ventre si meteorizza, e che si innalza orribilmente anche dopo morte. La *timpanitiae*, morbo sempre da temersi, e talvolta lunghissima, ed ugualmente ostinata che l'ascite: la sete, l'oppressione, il calore ettico, l'enfiagione delle gambe, le orine lissimali, l'abbattimento del corpo, e dello spirito, le insietà, i deliquj, le estremità fredde, ec. ne sono i segni più rei: ella è assolutamente incurabile, allorchè l'enorme dilatamento delle budella ha prodotto la perdita della molla; poichè questo male comincia dallo spasmo, e termina nell'atonìa; per quanto si può giudicare da ciò, che lo precede, dagli accidenti, che l'accompagnano, e dai mezzi per guarirla, che sono stati i più efficaci, se dura lungo tempo, non lascia d'unirsi all'ascite, e questa complicazione ne rende più malagevole la medicatura: abbiamo già fatto osservare, che poteva leggersi in passione iliaca.

Nell'apertura dei cadaveri si scuopre lo stomaco gonfiato in guisa straordinaria dalle ventosità, cancrenato, tutti gl'intestini estremamente gonfiati, con pochi escrementi, putridi, e lacerati: tali enormi dilatamenti sono più manifesti nel ceco, e nel colon, che talvolta si trova della grossezza d'una coscia: il condotto intestinale racchiude con frequenza dei vermi: veggionvisi talora degli accavallamenti, che interrompono ogni comunicazione. Le flatulenze, come abbiám detto, non sono sempre contenute nelle prime vie: trovansene spesso nella cavità del ventre, che allora cede, e s'accascia sotto il primo colpo dello scalpello: è anche bene l'osservare, che questo caso non è raro, ma che trovasi per lo più complicato col gonfiamento delle budella: una sola volta io ho veduto, che tutta l'aria era contenuta nella cavità dell'addome, comparendone affatto senza lo stomaco, e il condotto intestinale.

Si è anche osservato il fegato scirroso, putrido, disseccato, il suo volume in estremo accorciato, di pari che quello della milza, che in alcuni soggetti non è com-

comparsa più grossa d'una capsula atrabiliare, ma in altri si è trovata in estremo tumefatta. Si è veduto l'epiploon distrutto, il pancreas, e il mesenterico scirroso e disseccati: si è pure trovata dell'acqua nella capacità del ventre, sebbene in poca quantità; per non parlare de' varj sconcerti del polmone, dei reni, e d'altre viscere che possono aver soltanto un rapporto molto lontano col male, che forma il soggetto di questo Articolo.

Tutto quello, che può moderare il calore delle viscere, rilasciare, o lubrificare le prime vie, dee assolutamente produrre in questo caso un buono effetto; e perciò si praticano con molta riuscita contro tutte le flatulenze le bevande acquose intiepidite, il siero, e gli altri allentanti: i temperanti, come i cicoracei, il fumosterno, i nitrosi, il tartaro vetriolato, le acque di Vals, ed altre somiglianti; e finalmente i lassativi, come l'olio di mandorle dolci, la manna, il sale d'Epsom, quello della Roccella; gli emetici sono di rado permessi, nè altri vi si dee determinare, che per la molestia delle nausee. I carminativi, come i fiori di camomilla, gli anaci, il finocchio, e altri, non si debbono porre in opera, se non dopo gli allentanti, e i rilascianti: lo stesso possiamo dire degli anodini, e degli *anti/pamodici*, i quali per altro debbono prescrivere nei soli casi pressanti. La *cavata del sangue* allorchè lo permettono l'età, il temperamento, e le altre circostanze, può giovare; ma non bisogna praticarla, se non dopo aver provato inutilmente tutti gli altri rimedj. Ultimamente, si usano i lavativi emollienti, purganti, e carminativi; bagni; fomite emollienti, anodine, e aromatiche; le coppette a vento applicate all'adome, ec.

La *medicatura della timpanitide* dee aver molta relazione con quella delle altre flatuosità; ma siccome questa n'è l'ultimo grado, così le sono indispensabili ajuti particolari ad essa sola. Gli allentanti, i lubrificanti, e i temperanti da noi indicati, vi si impiegano nella guisa stessa: sonosi sperimentati buoni effetti dall'acqua ghiacciata; ma non vien confermata, a dir vero, una tale osservazione. I lassativi, come l'olio di mandorle dolci, la manna, le acque di Sedlitz, e le altre minerali purganti, in questo caso si approvano; ma i vomitivi non vi fanno buono effetto. Gli *stomachici*, i *fortificanti*, e i *carminativi*, come la salvia, la calamandri-

na,

na, o querciola, ec. il vino d'Alicante, l'estratto di ginepro l'*elixir proprietatis*, ec. possono giovare, quando sonosi disposte le prime vie coi rimedj qui innanzi additati. Si può far uso altresì degli *antispasmodici*, come della melissa, del castoreo, dell'assa fetida, dell'acqua di fior d'arancio, ec. Gli *aperienti*, e singolarmente i *diuretici*, come il sal di tartaro, il tartaro vetriolato, il sale *de duobus*, e quello di ginestra; il sapone, i marziali, le acque di Vals, quelle di Forges, di Passy, ec. Sono i rimedj, dei quali ci possiamo compromettere più che di tutt'altro. Non so parola degli antiscorbutici, degli antiveneri, e d'altri, che possono esser renduti necessari da varie complicazioni, come altresì della cavata del sangue, dell'applicazione delle mignatte, ec. In questo caso si fa un grand'uso dei *lavativi addolcenti lassativi*, e colla *trementina*: rendono questi talora *stimolanti* col tabacco, col vino emetico, ec. Si fa uso altresì delle fomite emollienti, e discussive, come d'accessorj, che possono secondare l'azione degli altri rimedj: si è inoltre veduto, come l'applicazione della neve, o del ghiaccio pesto, ha fatto effetto; ma quanto a me credo pernicioso il familiarizzarsi con questo topico: le fregagioni calde colla fanella non si disapprovano, di pari che le unzioni coll'olio di mandorle dolci canforato. Per ultimo vien proposta la *puntura*: non v'è dubbio, che questa sia propria, quando i venti trovansi entro la cavità del ventre, e che si lasciato soccombere molti pazienti, che si sarebbero potuti salvare per un tal mezzo: è vero, che altri si rattiene dal praticarla per la difficoltà di conoscere questo caso ma e quali riguardi si debbono avere, quando il male non ha scampo? Oltredichè io non so vedere, perchè altri non ardisca tentare siffatta operazione nei casi estremi, trovandosi anche le ventosità imprigionate nelle prime vie.

VERMI INTESTINALI.

Ognun sa avervene di quattro specie, i *lombrichi*, cioè, le *ascaridi*, i *tondi*, e il *solitario*, per non parlare d'un'infinità di vermi mostruosi, che interessano più la fisica, e l'istoria naturale, che la Pratica medica, e de quali possiamo aver l'istoria delle Opere del Redi, del Vallisnieri, dell'Andry, del le Clerc, e del Bianchi, quali hanno unito con molta cura tutto quello, che era stato scritto innanzi a loro, e ciò, ch'è stato da essi

essi medesimi osservato sopra tal materia. I lombrichi familiariissimi ai fanciulli, dai sei anni fino alla pubertà, ma che non rispettano per altro l'età, che succedono si manifestano dal fiato esalante un certo agio, dalla sfogliatezza, e talora dalla voracità dell'appetito; dalla salivazione notturna, dall'aridezza della bocca nel decorso del giorno; dal pizzicore al naso, dalla lucidità degli occhi, dalla lividura delle guance, dal digrignamento dei denti in dormendo, o dal muover la bocca, assomigliantesi a quello, che altri fa inghiottendo; eccitano questi con frequenza il vomito, cardialgie, gonfiezza del ventre, tormini, dolori rodenti, o mordeventi, che cessano col prender cibo; risvegliano il tenesmo, la diarrea con iscariche bianchicce, la tosse, il singhiozzo, la febbre, e dei rigori freddi irregolari: il polso è sovente disuguale, oscuro, e cancellato: cadono talora anche in sincope: molti hanno de' sudori notturni di reo odore, e si svegliano in un subito come spaventati. Cagionano i vermi eziandio delle vertigini, la perdita della vista, le convulsioni, e l'epilessia nei bambini; affezioni comatose, il delirio, la stupidità, l'afonia, la paralisi, ec. Finalmente se ne mandan fuori per fecesse, per bocca, e pel naso: questo segno è indubitatamente il più certo; ma talora manca, perchè questi insetti privati di vita, si squagliano, e non si rendono, che delle mucosità, o una specie di colla. Gli attacchi verminosi sono alcuna volta sì pronti, che prentoni per l'apoplessia; ma le estremità fredde, e la picciolezza del polso, ne caratterizzano la differenza: si stenta più a distinguerli dall'epilessia, quando son convulsivi; ma questi non si veggiono, se non se nei fanciulli. Sono i vermi sovente un sintoma della rosolia, del vajuolo, delle febbri putride, maligne, porporine, epidemiche, ec. Ma io non credo, che queste febbri debban si chiamar verminose, poichè i vermi non ne sono, che un accidente. Questi insetti forano talora lo stomaco, gl'intestini, e perfino le parti continenti del basso ventre: sonosi veduti uscire pel bellico, per l'anguinaia, ec. risvegliando in quelle parti delle flogosi, e degli ascessi.

Le *ascaridi*, tuttochè più picciole, e più svelte dei vermi del formaggio, si rilevano ottunamente nelle deiezioni, le quali ne portano perpetuamente seco: queste eccitano il tenesmo, oppure un pizzicore continuo, e inquietantissimo nell'ano, ch'è la lor sede princi-

ale : talora ne escono di là , senza che altri vada alla seggetta , e spargonsi sopra tutte le parti vicine . I *ritondi* , che rappresentano benissimo la forma del citrionio , sono più apparenti nelle scariche fecciose , e perpetuamente annunziano il solitario : questi possono unirsi insieme a foggia di catena , la quale si spezza con sommaria facilità : eccitano questi alcuna volta dei pizzicori nel deretano , e ne escono anche soli , come le ascaridi .

Il *solitario* , denominato ora *taenia* , ora *solum* , è un verme articolato , d'una lunghezza sorprendente : ve ne ha varie specie facilissime a distinguersi dalle loro figure , non meno che dalle descrizioni , che ne sono state fatte . La sua lunghezza è indeterminata , poichè per lo più se ne restituiscono soltanto delle porzioni : può esser della lunghezza di 25. braccia , e il *Boerhaave* ne ha veduti di 30. braccia . E' stato giudicato , che si trovi perpetuamente solo : ma sonosene trovati più d'uno nei cani , e in altri animali , che vi vanno soggetti : non mancano altresì osservazioni , le quali sembrano , che ci dimostrino la sua molteplicità nello stesso uomo : vien perfino creduto , che abbia una testa , la quale non ci è mancato di rappresentare nelle figure : per me non l'ho veduta , e mi è sempre sembrato , che le due estremità di questo verme terminino in una punta : oltredichè io non rinvengo alcuna costanza nelle figure tutte , e nelle descrizioni ancora , che ci sono state fatte di questa testa . *Marquet* nella sua osservazione 102. dice d'averla veduta simile a quella della *tipera* , e non lascia d'assicurarci nella 118. che lo stesso verme è composto d'una corona , o catena di *ritondi* , e che egli ne ha staccati dei belli e vivi , la qual cosa esclude qualunque testa : finalmente se facciamo l'analisi di tutto quello , che è stato scritto intorno a tal materia , altro non vi troviamo , che dubbj , e incertezze . Non ci è gran fatto nota la relazione , che passa fra i *ritondi* , e il *solitario* ; ma siamo certi , che l'uscita dei primi annunzia la presenza del secondo : hanovi anche altri segni , che concorrono a manifestare questo strano verme : tali sono le nausea , la svogliatezza , o una fame vorace , il fetor della bocca , il continuo sputare , il pallor del viso , il peso del ventre , i dolori di stomaco , di schiena , e del fegato : le scariche mucose , ec. Questo insetto fa creder nelle donne la gravidanza a motivo della gonfiezza del ventre , per

la soppressione de' menstroi, per la svogliatezza, o pèr la stravagante appetenza: coloro, che lo hanno, perdono talvolta perfino l'uso della parola: soffrono stordimenti, sopimenti, deliquj, convulsioni, ec. Questo verme ascende talora per l'esofago fino alla bocca: alcuni ne hanno anche restituito delle grandi porzioni per questa strada: finalmente si è osservato, che coloro, che ne erano molestati, hanno avuto lunghissime convalescenze dopo le loro malattie.

Abbiamo esposto gli *scomenti*, che possono cagionare i *lombrichi*, come l'asfonia, la paralisi, la mania, le convulsioni, l'epilessia, la passione iliaca, ec. Si è più volte sperimentato, che i rossi erano più atti a produrre questi perniciosi effetti: talvolta fanno seccare il latte alle nutrici, e possono risvegliare delle fastidiosissime febbri irregolari; ma abbiamo detto, che non si dovevano loro ascrivere le febbri putride, e maligne, delle quali sono il solo sintoma: la loro espulsione per la defecazione nel terminare di queste febbri, è proficua; ma si teme la lor sortita dalla bocca, massime se portano seco una materia nera, e puzzolente. Le *ascaridi* sono spesso molestissime, ma di rado eccitano rei sintomi, come la cefalalgia, il sopimento, i deliquj, ec. Vien creduto, che uno porti seco in nascendo il *solitario*, senza che cagioni grandi incomodi; ma oltre le convulsioni, ch'ei può risvegliare, precipita nella febbre lenta, nel marasmo, nella gonfiezza, nell'ascite, nella timpanitide, ec. Molti hanno creduto, che questo verme produr possa la pleuritide. Questi due morbi possono bene incontrarsi insieme; ma è difficile il rilevarne la loro relazione.

Troviamo nei cadaveri i *lombrichi* nella bocca, e nell'esofago; nello stomaco, e per tutta la lunghezza del condotto intestinale: sonosi veduti rinchiusi in specie di tumori infaccati, formanti dei gomitoli, che ostruivano le budella: se ne sono incontrati di quelli, che si erano insinuati nel condotto biliare, o nel pancreatico: e questi casi non son rari; se ne son veduti nella capacità del ventre, entro abscessi, ec. Si squaliano, come dicemmo, talvolta a segno, che non se ne arriva a rilevar la traccia anche in coloro, che vi sono stati in estremo soggetti: finalmente si sono vedute delle flogosi, delle suppurazioni, e putrefazioni nelle budella, ec. Quanto alle *ascaridi*,

e ai ritondi, per lo più si dileguano dopo morte. Rispetto al *solitario*, si trova tale, quale vien restituito. Se ne è veduta una porzione considerabile nello stomaco, e si è incontrata la pietra sua testa nel condotto biliare, ove abbiain detto, che talora i lombrichi s'insinuano.

Noi ci guarderemo dal noverar tutti i rimedj, che si son fatti entrare nella classe dei *vermifughi*: e ci fermeremo sopra quel soltanto, che alla giornata vien messo in opera con più riuscita. I *purganti* meritano il primo luogo: tali sono il rabarbaro, la senna, la giallappa, l'aloè, il diagridio, la polvere cornachina, lo sciroppo in fior di pesco, i trocisci *albandal*, la coniezione *hamec*, ec. L'aquila alba, la panacea, l'etiope minerale, e le altre *preparazioni mercuriali*, possono passare in questo caso per specifici: talora ci contenteremo di far bollir nell'acqua il mercurio crudo, oppure nella ptisana, che serve di bevanda ordinaria. Si fa eziandio uso grande degli *amari*, e degli *assorbenti*; tali sono il seme santo, l'abrotano, l'assenzio, l'artemisia, la genziana, le mandorle di noccioli di pesche, la corallina, il corno di carvo preparato, ec. Si danno altresì con gran familiarità gli oli, il petriolo, l'assafetida, ec. Il *verjus*, il sugo di limone, lo spirito di olso, e altri acidi, in alcuni casi sono utilissimi. La cipolla, e l'aglio passano per buoni vermifughi, di pari che il vino, la confezion di giacinto, la triaca vecchia, ec. Sonosi eziandio veduti dei buoni effetti dall'acqua ghiacciata, non solo nei casi dei lombrichi, ma ancora contro tutti gli altri vermi. Bisogna aggiungere i lavativi col latte, e collo zucchero, con l'olio, ec. Le pittime coll'aloè, e col fiele di manzo, il sugo di centaurea minore, e di artemisia; la sugna, il petriolo, l'unguento d'*arthanita*, ec. Non si deve però far un uso indifferente di tutti i divisi rimedj, sì interni, che esterni, allorchè i vermi sono il sintoma della febbre: in tal caso debbonsi combiuare con quelli, che s'addicono all'infermità principale.

Non s'investono le *ascaridi*, che con medicamenti interni, se ne eccettuiamo i *purganti*, e singolarmente coll'aloè, che pare il più atto a sterminargli: ma si fa un uso frequentissimo dei *lavativi coll'olio*, con le *preparazioni mercuriali*, con la *coloquintida*, e con gli *amari*; come altresì delle *supposte* fatte col lardo, col cotone, inzuppato nella soluzione d'aloè, o di

fiele di manzo, ed inzavardate colla manteca mercuriale ec. E' cosa buona l'essere avvertito, che tali rimedi debbonfi continuare per qualche tempo dopo il disleguamento dei vermi, a motivo dell'uova da essi lasciate, e che non lasciano di schiudersi, se altri non vi si opponga con i mezzi da noi proposti.

Il *solitario*, e i *ritonaj* non cedono agli ordinarij vermifughi, cioè, agli amari, e agli oleosi: vi possiamo usar l'emetico con somma riuscita, di pari che i purganti, come l'aloè, il diagridio, il mercurio dolce, ec. Passa per specifico la *radice d'erica*: questa si amministra in sostanza nel miele, o nel vino bianco, e il seguente si purga l'ammalato: si accorda la proprietà medesima alla scorza della *radice del moro*: se ne fa bobolare la quantità di due grossi fino alla mezz'oncia in una mezza pinta d'acqua per due dosi, che prendonsi dentro la stessa giornata: questo decotto è alquanto lassativo. Sembra anche, per molte osservazioni, che si son fatte, che siasi con buon evento amministrata contro il solitario la *semenza di ruta*, la *corallina*. L'*etiopo minerale*, i marziali, l'acque minerali ferrate, ec. E' soverchio il dire, che quando si medicano i fanciulli in tutti i da noi esposti casi, fa di mestieri il proporzionare le dosi alla loro età.

COLICA EPATICA.

E' noto, che questo morbo ha la sua sede nella *cistifellea*, o nei *condotti biliari*; che quivi si formano delle *concrezioni solide*, le quali pel volume loro, o per la loro figura, cagionano delle sensazioni più, o meno intense: che queste cavità possano soffrire dei dilatamenti assai notabili a motivo del fermarsi della stessa bile, lo che dipende talora dalla semplice compressione prodotta dal pancreas scirroso, o da qualunque altro tumore, o da strangolamenti spasmodici; ma il più delle volte da alcuna pietra, che chiude i canali. Questa specie di *colica*, intorno alla quale abbiamo già osservato, che i Medici con frequenza s'ingannano, si manifesta per mezzo d'un calore più o meno acre, pel dolore, e per la tensione dell'ipocondro destro, e d'una gran porzione dell'epigastro; questi dolori, che si riferiscono talvolta allo stomaco, ai reni, e al dorso, hanno esacerbamenti crudeli, eccitano flatulenze, nausee, vomito, ansietà, stringimento di petto, ec. D'ordinario la feb-

re accompagna la colica epatica, o le vien dietro: nel primo caso ella dura con frequenza dodici, o quattordici giorni; nel secondo termina per lo più in un giorno, o in due. Il colore delle carni nella maggior parte dei pazienti è giallo, o verdastro: i medesimi talora hanno una verace itterizia: il ventre è per lo più ossipato: le orine comunemente sopresse, e dopo l'accessso divengono torbide, e fangose. Importa infinitamente il sapere, che la bile ritenuta nella vescicetta, si dilata alcuna volta a segno, che comparisce esternamente un tumore, che non di rado è stato preso per un abscesso, e che sopra siffatta persuasione è stato perfino aperto, onde si è prodotta una fistola, ed è talvolta anche da ciò seguita la morte, cagionata dallo spargimento della bile nella cavità del basso ventre: e di vero egli è tanto più agevole l'ingannarsi, in quanto queste due specie di tumori sono con frequenza accompagnati dagli stessi sintomi, e trovansi anche talora complicati: intorno a questo soggetto leggonsi delle ottime memorie nel primo, e nel terzo Tomo dell'Accademia di Chirurgia. Dobbiamo ancora aggiungere, come la maggior parte dei pazienti restituiscono per vomito, e per iscesso queste pretese *pietruzze biliari*, le quali si sa, essere concrezioni di colori diversi, leggieri, infiammabili, e che si sciolgono facilmente nell'acqua calda.

La *colica epatica* è talvolta periodica, tornando ogni quindici giorni, ogni mese, ogn'anno, ec. La durata dei parossismi è sommamente incerta: ve ne sono di quelli, che terminano in poche ore: ve ne sono altri, che durano uno, e anche più giorni, sebbene con molta remissione. Questo male può avere delle triste conseguenze: tali sono, a cagion d'esempio, l'infiammazione del fegato, l'itterizia, la febbre lenta, la polmonea, l'idropisia, e simiglianti. Abbiamo già osservato, come prendonsi alla giornata per colica epatica dolori, che mostrano d'avere la stessa sede, ma che riconoscono un'affezione spasmodica, da cui il fegato non viene niente più intaccato, di quello sianlo le altre viscere del basso ventre: e altri più facilmente s'inganna in questo, in quanto son seguiti alcuna volta dall'itterizia, la quale però in brev'ora si dilegua: prendesi anche talvolta la colica epatica per la nefritica, nè altri tampoco viene a essere disingannato dall'apertura dei cadaveri.

Questa ci pone sotto gli occhi concrezioni biliari di ogni grossezza, e in maggiore, o in minor numero nella cistifellea: in un soggetto nè abbiamo contate meno a trecento, alcune delle quali erano quasi della grossezza d'una nocciuola: se ne son vedute delle grosse come una castagna, del peso di due, e anche di tre onces. Si è trovata la cistifellea piena d'una bile fissa e collosa, contenente vermi, idatidi, ec. e una crosta pietrosa, che intonacava la sua cavità, e delle irregolari cellette, che la dividevano. Si è pur trovata la cistifellea, con uno stravasamento della bile nella cavità del basso ventre, o enormemente dilatata, contenente tre o quattro, e come si pretende, perfino a otto libbre di bile; i condotti biliari ci hanno fatto vedere le stesse dilatazioni, e delle ostruzioni cagionate da pietre, da lombrichi. Il fegato è con frequenza comparso infiammato, scirroso, suppurato, putrido, ec. Si è veduto il pancreas scirroso, che comprimeva il condotto biliare: tumori nelle budella, o nel mesenterio, ec. producenti l'effetto stesso. Tali sono gli sconcerti, che producono la colica epatica, ovvero, che ne sono le conseguenze; ma bisogna sapere, che incontrasi ogni giorno dei somigliantissimi, e specialmente delle concrezioni biliarie, in soggetti, che non erano stati invasi da questo morbo.

Si medica la colica epatica a un di presso come gli altri dolori del basso ventre: è agevole il giudicare che nel parossismo i rimedj atti a fare scorrer la bile non potrebbero far che male; ma questi son vantaggiosi, e necessari, per impedirne il nuovo accesso. Indispensabili sono nell'attacco le cavate di sangue; questo è l'unico mezzo per ovviare l'infiammazione della quale è il fegato sovente minacciato. Gli allentanti, i rilascianti, gli addolcenti, come il brodo leggero di pollo, il siero, le emulsioni, l'olio di mandorle dolci, lo spermaceo, i fiori e le radici di malva, sono i rimedj più familiari: quando la calma lo permette, si fanno prendere i lassativi, come la cassia, la manna, i tamarindi, ec. Il diacodio, le goccioline anodine, ed altri ipnotici, in questo caso fanno un gran bene. Si ritraggono altresì vantaggi grandissimi dai lavativi emollienti, anodini, coll'olio, col burro, ec. dalle fomentate, e dai cataplasmi atti a rilasciare dalle vesciche piene di latte, dai bagni, e dai mezzi

agni, ec. Quando la cistifellea sporgente esteriormente in fuori contiene una quantità grande di bile, della quale non si può per via degli appropriati rimedj, promuovere lo scolo, e ch'è in pericolo la vita del paziente, si ricorre alla puntura, o al taglio; ma dubbiosa si è in estremo la riuscita dell'operazione. Si ovvia il *vit rno della collica epatica*, servendosi del rabarbaro, e d'altri purganti leggieri, col dente di cane, coi centogambe, e con altri aperienti, col nitro, con gli amari, co' marziali, col sapone, ec. Ma le acque minerali, sì fredde, che termali debbonfi preferire a tutti i rimedj proposti; le più frequentate sono quelle di Vichy, di Plombières, di Baraluc, di Vals, ec. Il latte per alcuni temperamenti, è ancora appropriatissimo, e si può mettere in opera, allorchè son riusciti inutili gli altri rimedj.

INFIAMMAZIONE DEL FEGATO.

La *flogosi* più, o meno estesa occupante varie parti del fegato, le sue complicazioni con quella delle parti vicine, e un'infinità d'altre circostanze, danno a questo morbo molti aspetti, e l'espongono a grandissime variazioni: il rigor freddo, la febbre per lo più acuta, il calore, la tensione, il peso, e la tumefazione della regione del fegato, ne sono i segni principali; è questa sovente accompagnata da nausea, o da vomito: il ventre ora è costipato, ora sciolto, con dolori colici, con iscariche frequenti, e biliose: le orine son torbide, colorite, e scarfe: fa di mestieri osservare, che il dolore è più acuto, quando è attaccata la convessità del fegato, si fa sentire singolarmente alla bocca dello stomaco, e si stende talora fino alle clavicole, e alle spalle: in tali circostanze appunto è stato preso per la pleuritide. I pazienti vengono d'ordinario tormentati dalla sete: la loro lingua sul principio è arida, e si carica in progresso d'una crosta giallognola, o nera: hanno una tosse secca, e difficoltà di respiro: alcuni hanno l'itterizia: altri hanno un viso pallido, ch'è ben rilevato dai Pratici. A questi segni appunto può distinguersi agevolmente l'infiammazione del fegato (*epatitis*) da quella della pleura, e da quella dell'addome; malattie, le quali, a giudicarne dal sito, ove si riferisce il dolore, assomigliansi grandemente. Lagnasi anche nella colica epatica i pazienti d'un grande abbat-

timento, nè possono coricarsi sul lato destro, e talvolta soppravvien loro un violento singhiozzo, il delirio, e

Quando si forma un *abscesso*, il dolore divien più vivo, e pulsativo: il calore più ardente, e la parte ordinaria più tesa, e più turgida: hannosi dei rigori freddi irregolari: la febbre s' aumenta per non diminuire, se non dopo la formazione della marcia, e rottura dell' *abscesso*: allora questa si cangia in febbre lenta, che dà sovente motivo a svenimenti: è soverchio il dire che non si scuopre distintamente la fluttuazione, se non quando l' *abscesso* occupa le parti del fegato, che sono soggette al tatto; abbiamo fatto osservare nell' articolo precedente, essere stata con frequenza presa la cistifellea distesa per un *abscesso*. Abbiamo riportato altrove, che si formavano in conseguenza del vajuolo, delle febbri maligne, e d'altre; delle *deposizioni purulente* nel fegato, che non mostravano d' esser precedute dall' infiammazione di questa viscera: ne sono prodotte altresì dall' itterizia, e dalle ostruzioni inveterate; quindi da contusioni antiche, da piaghe alla testa, e altrove disseccatesi, da fioriture cutanee rientrate, ec. queste ultime stanno moltissimo a manifestarsi: anzi talora restansi anche occulte per sempre, e danno anche poco fastidio: io ne ho veduta una enorme di questa natura, la cui gonfiezza per lo spazio di più d' un anno occupava la metà del basso ventre: l' uomo che aveva dell' età di quarant'anni, e robustissimo faceva molto bene tutte le sue faccende, fino a tanto che la marcia sendosi fatto strada dalla parte del pombone, fu evacuata in copia sorprendente alla foggia d' una vomica, lo che precipitò l' infermo in uno ipostasiamento, al quale ebbe a soccombere in pochi giorni. Questa materia, di cui restitui, da quel, che si potette giudicare, cinque in sei pinte, aveva il colore della feccia del vino, ed un fetore, al quale non si poteva resistere, e da cui rimase infetta la casa tutta.

L' *epatite* è una pessima infermità: l' evento della medesima dipende dalla parte del fegato, ch' è offesa, e dall' estesa della infiammazione: ella va talvolta a finire nella *risoluzione*; ma con più frequenza nella suppurazione, o nello scirro. Il singhiozzo, il vomito di materie nere, il delirio; gli svenimenti, i sudori freddi, ec. sono accidenti, che danno sommamente da temere: ma non vi è cosa, che faccia maggior paura del

del cessamento subitaneo dei dolori, sussistendo gli altri sintomi. Se questo morbo termina colla *risoluzione*, non dura più di tre, o quattro giorni; quando oltrepassa il settimo, ci dobbiamo aspettare la suppurazione, e lo sfivamento scirroso. Poco ripiego abbiamo contro l'abscesso, tuttochè abbiavi alcuno esempio dell'evacuazione della marcia per vomito, per evacuazione per secesso, e per le orine: può anche prender la strada degli sputi; ma in tal caso a grandissimo stento schivasi la tificchezza: la marcia il più delle volte si spande nella cavità del basso ventre, e corrompe tutte le viscere, onde risulta un ascite purulento, la febbre lenta, la tache, ec. Se ne son veduti di quelli, che sonosi aperti naturalmente al di fuori, e che sono stati curati per questo solo mezzo, dopo alcuni mesi di scolo marcioso. Abbiamo detto, che potevasi portare per lunghissimo tempo un abscesso nel fegato; ma questo non segue, se non quando è il prodotto d'un' infermità cronica.

L'apertura dei cadaveri ci scuopre delle flogosi in varie parti del fegato, o in tutta la sua massa: il volume di questa viscera in alcuni soggetti è comparso prodigioso: si è trovata aderente alle parti vicine, contenente abcessi più, o meno considerabili, sì per la loro estensione, che pel numero loro, comunicando talora colla capacità del petto, o col polmone, collo stomaco, col duodeno, e col colon, e ciò sia o per l'erosione di tutto quello, che trovasi fra essi due, o sia pel condotto biliare: si vede un esempio di questo ultimo caso, ch'è il più raro, nelle Transazioni della Società di Londra dell'anno 1731.; ma trovasi il più delle volte l'abscesso intiero, e d'una grossezza prodigiosa, oppure aperto nella capacità del ventre. Sonosi eziandio osservate delle esulcerazioni, la cancrena, la putrefazione; il fegato totalmente distrutto, e non offrente un sacco: sonosi veduti in picciol numero abcessi, la cui marcia si era disseccata, e indurita: si è incontrata la cistifellea piena di marcia, le costole cariate, ec. finalmente si è scoperto il diaframma, la pleura, e il polmone; lo stomaco, il duodeno, il colon, e il pancreas infiammati, esulcerati, e cancrenati; della putrefazione all'epiploon, ai reni, ec. delle inondazioni saniose, e purulente, non solo nella cavità del basso ventre, ma eziandio in quella del petto.

Le cavate del sangue non son manco necessarie in que-

questo caso , di quello sienolo nell' altre infiammazioni interne : fa di mestieri il replicarle spesso ; ma non debbono senza necessità estendere oltre il quarto giorno . Gli *allentanti*, i *raddolcenti*, i *rinfrascanti*, e i *temperanti*, come il siero, il brodo lungo di vitella , o di pollastra , le emulsioni, lo spermacei, i cicoracei, agrimonia, ec. sono i rimedj , de' quali si fa perpetuamente un grand' uso . Il nitro, e la canfora sono i *camminanti* più adattati, come altresì il *nenufar* ; ma dobbiamo servirci con molta prudenza degl' *ipnotici* . Si possono mettere in opera i *lassativi*, come la cassia, e la manna , quando siasi posta in calma la febbre , e gli accidenti, lo che non accade per lo più, se non sul sesto , o sul settimo giorno del male . Molti si servono dell' antiettico del Poterio, e d' altri *sudorifici* ; ma questi rimedj troppo abbrugianti non possono appropriarsi se non se in alcune circostanze . I *vulnerarij*, e i *balsamici* non debbono prescrivere, se non quando il fegato dopo la rottura dell' abscesso resta esulcerato ; ma questo è un ripiego, sopra cui poco possiamo contare . Non bisogna in questo caso trascurare i *laurativi* emollienti, e lassativi : il loro uso stesso non sarà mai troppo frequente : si possono anche ritrarre vantaggi grandissimi dalle fomentate, dai cataplasmi , e da altri topici rilassanti, risolventi, e maturanti secondo i varj stati del male . Se l' *abscesso* finalmente si manifesta all' occhio , e al tatto, non v'è dubbio, che se ne debba far l'apertura col taglio, o col caustico: è noto, che si pratica ogni dì con ottima riuscita questa operazione, quando l' abscesso ha contratto aderenza colle parti, che si devono aprire ; ma nell' altro caso è molto difficile l' impedire , che la marcia non si spanda entro la capacità . Quanto allo scirro, all' itterizia, all' ulcera, ed alle altre conseguenze dell' epatite , si possono consultare gli Articoli risguardanti queste infermità .

L' I T T E R I Z I A .

Il color giallo della cute , e della congiuntiva , il pizzicore di tutto il corpo, la bocca amara, e la perdita dell' appetito, le orine cariche di bile , le dejezioni scolorite, ec. caratterizzano a sufficienza l' itterizia : i pazienti talora veggiono gli oggetti gialli ; la saliva, e il sudore sono spesso del color medesimo , che si comunica eziandio a tutte le parti interne : il vomito ,
la

la cardialgia, le anfità, il dolore, e la tensione degli ipocondri, o della regione del fegato, la febbre, la difficoltà del respiro, le stanchezze, gli svenimenti, ec. sono gli ordinarij sintomi di questo morbo: il polso è debole, e tardo, ed alcuna fiata febbrile. Si nomina *itterizia nera* quella, il cui colore prende al paonazzo, al verdastro, al lido, all'oscuro, o al piombino. L'itterizia dipende assai spesso dalla colica epatica, dall'istmica, e dall'ipocondriaca, o da ogn'altra: dall'infiammazione, e dall'abcisso del fegato; dall'otturazione di questa viscera, e da quella dei condotti biliari; dagli emetici, dai purganti drastici, dalla passione iliaca, dai veleni, dal morbo d'animali velenosi, dal rientramento dei mali cutanei, dalla soppressione degli sgorghi mensurali, ed emorroidali, dalla febbre quartana, e da altre intermittenti mal medicate, ec. Ella non è talvolta che una cachessia, che ha degenerato senz'alcun vizio, o intacco nel fegato, ovvero il prodotto d'un pravo nutrimento, della collera, della tristezza, e delle altre passioni d'animo, della gravidanza, e da altri accidenti, che non hanno la menoma dipendenza dallo stato della viscera stessa.

L'itterizia ordinaria invecchiata degenera in itterizia nera; e questa è d'ordinario funesta, massime nei vecchi. L'itterizia, che soppravviene alle febbri acute prima del settimo giorno, è di pessimo augurio; dopo questo tempo ella è per lo più critica: quella ch'è cagionata dalla collera, dall'emetico, e dai purganti, dalla colica spasmodica, ec. è di corta durata: il parto dilegua quell'itterizia, che dipende dalla gravidanza; ma allorchè non vien prodotta da alcuna evidente cagione, ella è più ostinata, e singolarmente se il paziente è scorbutico. Si dee fare il giudizio stesso di quella, ch'è unita all'infiammazione, all'abcisso, e allo scirro del fegato, o questi malori la precedano, o le vengano dietro. E' notissimo, senza ch'io lo additi, come la tensione del ventre, la timpanitide, il vomito purulento, e le dejezioni della stessa natura; l'oppressione, i deliqui, la tabe, l'idropisia, ec. sono segni mortali: si fa parimente, che le urine torbide, e fisse, sono stimati migliori delle limpide: finalmente si è osservato, che i sudori, lo sgorge emorroidale, e la dissenteria hanno dileguato questo male, ch'è per altro soggetto a molte recidive.

Ci fa vedere l'apertura dei cadaveri, che il tessuto cellulare, e le viscere tutte, non eccettuandone il cervello, sono spesso tinte di giallo, e che l'ossa medesime, e le cartilagini non ne vanno esenti. Si è veduto il fegato infiammato, ostrutto, scirroso, durissimo, e disseccato, e ulcerato, cancerato, e perfino totalmente distrutto, racchiudente talora prodigiosi abcessi, pieno di tubercoli con frequenza pietrosi; d'un'enorme grossezza, d'un color bianchiccio, verdastro o piombino ec. Si è trovata la cistifellea vuota, o sommamente riempita di bile talvolta nera come l'inchiostro, ora callosa, e fissa, ora serosa, e quasi insipida, contenente delle pietre osservabili pel loro numero, o per la loro grossezza: se ne sono contate oltre un centinaio, e sono vedute della grossezza d'un uovo di gallina, che venivano ad intieramente occupare tutta la capacità della cistifellea. I vasi biliari son comparsi estremamente dilatati, chiusi da pietre, o da escrescenze, le quali nascevano dalla loro interna superficie, compressi dall'a grossezza scirroso del pancreas, del mesenterio, o dalle altre parti adjacenti, dalla enorme grossezza del colon, ec. Si sono eziandio osservate, ma di rado, delle ossificazioni nella cistifellea, e ne' suoi canali. Si è finalmente veduto un tumore nella pleura, che comprimeva il polmone, e il fegato, ed altri assai frequen i sconcerti del petto: lo stomaco estremamente gonfiato, e fuor di luogo: gl'intestini meteorizzati, e singolarmente il colon, ch'era d'una straordinaria grossezza; vermi in gran numero nelle prime vie; il pancreas, e l'epiploon in uno stato di putrefazione; la milza d'una grossezza mostruosa, o d'una picciolezza incredibile; piena di concrezioni, putrefatta; o totalmente mancante; per non far parola d'altri disordini comuni a quasi tutte le infermità croniche.

La medicatura dell'itterizia, non deve essere meno variata di quello sienolo le cagioni, che la producono: dalla ricerca di queste può dipendere la buona scelta dei mezzi copiosissimi, che qui raccogliamo. L'itterizia invecchiata vuole una medicatura lenta; e molti pazienti hanno dovuto soccombere sotto il metodo a questo contrario; la recente può sostenere un urto più vivace, ma dee essere perpetuamente moderato. La cavata del sangue s'addice ad alcuni pletorici; e quando vi è soppressione di mestruj, di emorroidi, od

alcun segno d'infiammazione : ma fuori dei casi divi-
sati , ci ha fatto toccar con mano bene spesso l' espe-
rienza , ch' era micidiale , o per lo meno affatto inu-
tile . L'emetico , quando non vi si oppone lo stato
dello stomaco , fa un gran bene : è stato prescritto con
riuscita in tutti i tempi della malattia ; ma ognun ve-
de , che gioverà più sul principio ; ed è sovente acca-
duto di dileguar l' itterizia con questo solo . Niente me-
no essenziali sono in questa medicatura i purganti ; ma
dobbiamo soltanto adoperare i più miti , come il rabar-
baro , la cassia , la manna , e i tamarindi ; il sale d'
Epsom , quello di Sedlitz , del Glaubero , ec. si replica-
no sovente soli , od uniti con gli altri rimedj . Si fa
anche grand' uso degli allentanti , dei temperanti , e dei
rinfrescanti , come del siero , delle emulsioni , della li-
monata , della borrana della cicoria , dell' agrimonia ,
del fumosterno , delle capillari , della scolopendra , del
terfoglio , del dente di cane , della pazienza , dell' ace-
tosa , della pianta di fragola , della malva , dei gam-
beri , della polvere temperante , ec. Possiamo ritrarre
qualche vantaggio dallo zafferano , dalla polvere di
gutteta , e da altri calmanti antispasmodici ; ma dob-
biamo servirci con gran riserva degl' ipnotici . Vi so-
no alcuni casi , che richieggiono gli amari , e gli sto-
machici , come l' assenzio , la centaurea minore , la gen-
ziana , la china-china , la cannella , l' estratto di gine-
pro , la confezione di giacinto , la triaca , ec. ma si de-
ve schivar l' abuso , che ne fa la maggior parte dei
Pratici . Gli aperienti , e i diuretici , come la parietar-
ia , la celidonia , l' appio , lo sparagio , la garancia ,
l' iride di Firenze , il nitro , il sale di ginestra , e di
tamarisco , lo zafferano di marte , la palla d' acciaio ,
la gomma ammoniaca , il sapone , la terra sfogliata di
tartaro , il tartaro vetriolato , il tartaro marziale solu-
bile , i centogambe , l' ossimele di scille , ec. sono i
rimedj più appropriati a questo male . Gli assorbenti ,
diaforetici , i depuranti , e gli antiscorbutici , rela-
tivamente alle circostanze , ed alle complicazioni , posso-
no pure entrare in questa medicatura : finalmente si di-
legua felicemente coll' acque minerali , sì acidule , e fer-
rate , che termali : quelle di Passy , di Forges , e di
Vals fra le prime sono state anteposte alle altre : quel-
le di Vichy , di Plombieres , e di Balaruc , sono le
valde , delle quali è stato fatto sempre maggior uso .

Nel tempo, che si praticano questi rimedj, si deve tener il ventre obbediente con dei lavativi; rade volte sono necessarie le fomite: talvolta hanno giovato i bagni per acquietare il prurito, o per instabilir la cute sul fine della malattia. Si è finalmente sperimentato, che il fumo dell' aceto dileguava il color giallo, che restava negli occhi dopo la guarigione.

COLICA NEFRITICA.

L' infiammazione dei reni, il loro increspamento spasmodico, i calcoli, e le renelle; le orine mucose ec. sono le ordinarie cagioni della *colica nefritica*, la quale vien talvolta prodotta in iscena da qualche stravizzo nel bere, o nel mangiare, o da alcun altro difetto nel governo. Il dolore in tutti questi casi, per lo più è acuto, intermittente, o continuo, con maggiore, o minor remissione: si riferisce ai lombi, e talora allo stomaco; si stende fino all'anguinaja; alla radice della lingua, e talora ai testicoli, che ne rimangono attratti: provansi degl' intorpidimenti alle cosce. Le orine sopprimonsi, o sciolano scarissime; si rendono alcuna volta con del dolore: queste nel tempo del parossismo son limpide, ma sulla fine divengon fangose, e mucose, oppure arenose. Nel tempo dell' attacco provansi nausea, vomito, e si costipa il ventre: la sua durata è d' alcune ore, d' uno, o di più giorni: il più delle volte è accompagnato dalla febbre: il suo termine è annunciato dallo scolo delle orine; o dall' espulsione di qualche pietra. Vien presa bene spesso la lombaggine, la colica epatica, e quella del duodeno, e del colon, le cui estremità, com' è noto, corrispondono all' anguinaja, ed altri dolori del basso ventre, per la nefritica: gli scorbutici son soggetti a dolori, che molto s' avvicinano al male, di cui trattiamo con frequenza si mascherano nella guisa stessa le febbri intermittenti, e l' istericismo; e talora vien preceduto da simili attacchi lo sgorgo menstruale, ec. I dolori di sciatica, che hanno la loro sede nei muscoli, si risveglian al tatto, e s' accrescono ad ogni menomo movimento di quelle parti; lo che non si osserva nella colica nefritica, qualora non trovisi complicata colla lombaggine, e colla sciatica, la qual cosa veramente non è rara: tuttavia alcuni nefritici, i quali mostrano d' essere esenti da ogn' altra affezione, provano del sollievo nello starsi curvati

Nell'

Nell' infiammazione dei reni i dolori a mala pena hanno alcuna remissione: la febbre è acuta: l'orina al principio è ardente, ed in progresso divien limpida. Nel calcolo (il quale intacca per lo più il rene sinistro) picciola sì è la febbre, o manca del tutto; i dolori vengono a riprese; sono acutissimi, allorchè la pietra muta luogo, e con frequenza danno motivo all' infiammazione. Nello *spasmo* i dolori sono acuti; ma mutan luogo, e non durano molto: le orine sono bianchicce, scarfe, e totalmente impedita; finalmente nella *mucosa* i dolori sono ottusi, e più leggieri gli altri accidenti. Coloro, che hanno provato un attacco neritico di qualsivoglia specie, devon temerne il ritorno, massime se vi hanno una disposizione ereditaria. La nefritica è talora succeduta dall' abscesso, dalla cancrena, e dalla putrefazione dei reni. In evento che il dolore duri più di sette giorni, s'è sia pulsativo; se prolansì rigori freddi, e movimenti febbrili irregolari, ci dobbiamo aspettare l' abscesso. Il cessamento immediato del dolore, il polso intermittente, il sudor freddo, l'orina nericcia, e fetente, danno un segno certo della cancrena.

Ci scuopre l'anatomia i reni tumefatti, laceri, e disseccati, infiammati, con abscesso, esulcerati, putridi, e cancrenati: la loro sostanza cartilaginosa, scirrova, piena di tubercoli: le sue viscere distrutte sotto la forma d' un sacco contenente un liquor verdastro, della urina, o della marcia; la lor superficie varicosa, granellosa, ec. Non vi è cosa più comune del trovare nel picciolo bacino della renella, o delle pietruzze di tutte le forme, e grossezze, le quali s' insinuano con frequenza negli ureteri, e vi formano un vero turacciolo: sonosi anche veduti questi condotti più, o meno dilatati dalle pietre, dalla renella, dall' orina, ec. Si prende d' aver trovato delle concrezioni pietrose nelle vene emulcenti, nelle arterie lombari, e in altri vasi adiacenti. Si è veduto un rene, che conteneva 35. libbre d' orina; un altro in guisa prodigiosa dilatato da flatulenza: vien fatto anche parola di reni petrificati, duri, e bianchi come l' alabastro: ma quello, che vi è di sì singolare, e osservabile, si è, che trovansi con più frequenza i maggiori strazj, e pietre mostruose nei reni di persone, che non hanno il minimo dolore relativo a questi organi, e che non hanno mai restituito nè renelle,

le, nè mucosità. Finalmente si sono trovati in alcuni nefritici, o creduti tali, degli scirri, degli abscessi, delle pietre, nel pancreas, o nel mesenterio: la milza scirrofa, e putrida, fuori di luogo, e adagiata sopra reni: un tumore scirroso nell'ileo, che pure s'indirizzava al rene; dell'acqua nel condotto spinale, degli abscessi nei lombi, delle carie nelle vertebre; degli aneurismi; delle pietre nel cuore, ec.

Nel parossismo della nefritide ci disponghiamo ad addolcire, a rilassare, a calmare. Non vi si devono risparmiare le cavate del sangue: l'età, lo stato del polso, e la violenza dei dolori, debbon regolare il numero: con questa stessa mira si fa un grand'uso degli allentanti, e degli addolcenti, come del siero, del brodo di pollastra, delle semenze di lino, del riso, e de' fiori di malva, dell'olio di mandorle dolci, dello spermaceti, delle emulsioni col seme di papavero, dello sciroppo violato, del nenufar, ec. Gran bene fanno in questo caso gl'ipnotici, come il diacodio, le goccioline anodine, le pillole di cinoglossa, lo sciroppo di Karabe, ec. noi dobbiamo però schivarne l'abuso, ch'è tanto familiare in coloro, i quali nelle malattie non hanno l'occhio, che sopra il momento presente: i lassativi debbon praticare nella sola remissione. Quando la soppressione dell'orine, che dura da lungo tempo, pone la vita del paziente in pericolo, si può ricorrere all'emetico: un tal rimedio ha salvato in questo caso la vita a molti; ma non dobbiamo dissimulare, che ci ponghiamo a qualche rischio; questo rischio però è molto minore di quello, che abbiamo intenzione di combattere.

Fa di mestieri bandire tutti i diuretici nel tempo del parossismo; ma ne possiamo impedire il nuovo attacco coll'uso della *pareira brava*, del legno nefritico, della parietaria, dell'erniaria, della radice di calcitrapa, del nitro, del balsamo del Perù, della trementina, ec. Superano tutti i divisi rimedj le pillole di *Stephens*, allorchè vi è calcolo, o renella, e queste si possan dare anche nel parossismo. La dieta bianca, l'acque di Vals, di Forges, di Sant' Amando, di Bagnols, de la Motte, di Balaruc, di Vichy, di Baresges, d' Aix la-Capelle, di Borbone, ed altre minerali, sì fredde, che calde, son con ragione riputati i preservativi più sicuri: una pinta d'acqua comune tiepida ogni mattina, può benissimo supplire all'acque minerali, che non si pos-

posson sempre avere a mano a talento. Non bisogna dimenticare fra i rimedj, che convengono, non meno nel tempo del parossismo, che negli altri tempi, i lavativi emollienti, e addolcenti colla malva, col seme di lino, coll' olio, o col burro; le fomentate, i bagni, e i mezzi bagni ec. sonosi finalmente applicate le mignatte alle vene emorroidali; ma ognun vede, che questo non si addice, se non in alcuni casi particolari.

CALCOLO DEI RENI, E DELLA VESCICA.

La renella, che si forma nei reni, può calare nella vescica, ed esser portata via coll' orina, senza eccitar gran dolore: questo però col suo stanziare sì nei reni, che negli ureteri, dà spesso motivo alla collica nefritica: la pietra, che non è diversa dalla renella, se non rispetto al volume, può anche formarsi, ingrossarsi, e stanziare nei reni, ed anche passare alla vescica, senza che altri se ne avveda: tuttavia ella cagiona il più delle volte un dolore ottuso, e una specie di peto, che si riferisce alla regione dei reni; e può col mutar luogo, cagionare dolori acutissimi, che si riferiscono al dorso, allo stomaco, all' anguinaja, ec. Il calcolo ai reni non solo viene annunziato dalla nefritide, dall' uscita delle mucosità, delle renella, e delle pietruzze; ma eziandio da artacchi di gotta, che son preceduti, dall' orina sanguigna, e dal brugior d' orina, dopo aver cavalcato, essere stato in carrozza, ec. Questi ultimi segni appartengono più particolarmente alla pietra stanziente nella vescica, che si manifesta ancora per la disuria, e per la stranguria, pel dolore incisa alla glande, allorchè uno evacua le orine, pel tenesimo, per la frequente erezione, pel peso al peritoneo, per una specie di pizzicore nelle parti genitali, che forza i pazienti dell' uno, e dell' altro sesso a grattarsi: quest' ultimo segno è sommamente osservabile nei fanciulli, che si maneggiano, e si grattano sovente la verga, per ajutar l' uscita dell' orina, e per calmare i dolori. L' esercizio a cavallo, e in calesso non lasciano d' eccitare in queste circostanze, come abbiain detto, degli ardori, dei brugiori, e le orine sanguigne: con frequenza l' orina si ferma in tronco, quando si comincia ad evacuarla, e scola più liberamente in una situazione orizzontale, che stando in piedi.

Nulladimeno tutti i divisati segni sono equivoci, ed

ingannano ogni giorno, se altri non s'assicura della presenza della pietra col tatto, o colla tenta: si può toccarla ietro dicendo un dito nell'ano: questa operazione si fa benissimo nei fanciulli; ma è impraticabile nella maggior parte degli adulti: la tenta è il mezzo più sicuro per gli uni, e per gli altri; e questa anche talvolta non riesce, quando la pietra incantonata, schiva la punta di questo istrumento. La pietra nella vescica può dare dei giorni d'intervallo di riposo al paziente, i quali con frequenza possono far prendere equivoco rispetto alla natura del male: ve ne sono stati perfino di quelli, che hanno portato pietre grossissime sì nei reni, che nella vescica, senza aver mai provato il menomo incomodo che abbia potuto farne sospettare: si concepisce, che ciò debba accadere, quando la pietra farà liscia, e non si muoverà; avvegnachè si sappia, ch'ella s'allontana talvolta nel tessuto della vescica, e vi si accomoda come in una tasca, o s'inviluppa in parte nelle pieghe della tunica interna, lo che impedisce gli accidenti, che dipendono dal suo moto: appunto in questo caso alcuni litotomi ignorando questa circostanza afferrano colle loro tanaglie la pietra insieme, e la vescica, della quale portano via de' pezzetti, che essi fanno passare per fune gofira, che si vantano d'aver portate via. Le donne isteriche, gl'ipocondriaci, e gli scorbutici hanno spesso la stranguria, ed altri segni del calcolo, senz'esserne investiti: alcuni gottofi rendono delle orine, che fanno una posatura gellosa, e provano talvolta dei falsi attacchi di pietra, a cui trovansi peraltro soggetti, di pari che alla renella. I fanciulli, e i vecchj sono i più esposti al calcolo; massime se hanno a tal riguardo una disposizione ereditaria: la pietra ha pure la sua sorgente nell'eccesso del vino, nell'abuso delle donne, ec.

Ci fa vedere l'apertura dei cadaveri con molta frequenza pietre nei reni d'una bizzarra figura, e d'una grossezza singolare: e quello, che vi è di molto sorprendente, si è, che abbiamo fatto questa scoperta in alcune persone, che non si erano tampoco sognate d'aver questo male, o che non ne avevano avuto se non leggieri sospetti: sonosi anche osservate nei reni delle suppurazioni, delle putrefazioni, ed altri sconcerti, de' quali abbiamo parlato nel precedente Articolo. Si è di più veduto il rene destro incollato al fegato, e al colon; gli ureteri carichi d'un numero grande di pie-

struzzi, o chiusi da una sola, prodigiosamente dilatati, ec. la vescica infiammata, esulcerata, nera, e cancrenata, formante due cavità alla foggia d'una zucca, carica di pietre, strascinata dalla caduta della vagina. Vi si sono trovate pietre di grossezze varie, come d'un'arancia, d'un uovo di struzzo, della testa d'un bambino di fresco nato, del peso di quattro libbre: Sonosene vedute delle forate nel mezzo, o incavate a foggia di scolofojo pel passaggio dell'orina; delle lisce, delle sagriate, delle bernocollute, delle piallate, delle aspre, e con risalti, ec. alcune molli, e sritolabili, altre più dure, ed alcune della grossezza d'un macigno, o d'una focaja, gittanti anche fuoco sotto l'acciarino, delle bianche, delle gialle, delle verdastre, delle brune, delle nere, delle mezzo trasparenti, ec. Sonosene trovate di quelle, che erano impegnate nelle pareti della vescica, e come annicchiate in una specie di cantone, che le rende, come abbiám detto, inaccessibili alla tenta: queste specie di tasche son formate in apparenza principalmente dalle piegature della tunica interna: sonosi vedute callose, piene d'una materia purulenta, ec. Sonosi finalmente scoperte delle pietre formate intorno a uno spillo, a un filo, a una pallottola di cera, a una palla di piombo: sonosi anche trovate delle pietre nell'uretra, nel tessuto cellulare del peritonio, nello scroto, ec.

La renella, che dà con frequenza motivo alla nefritide, richiede la stessa medicatura; ma contro la pietra formata nei reni, la medicina non ci somministra che palliativi. Si fa, che la nefrotomia è stata proposta, e rigettata: si può vedere intorno a ciò il terzo volume dell'Accademia di Chirurgia. Quando il calcolo è caduto di fresco nella vescica, non vi è rimedio migliore della copiosa bevanda, dei lavativi emollienti, e dei bagni: con questi ajuti se ne son fatti rendere della grossezza d'un'uliva, ed anche d'una nocciuola. Per questi stessi mezzi lo possiamo dilungare dall'uretra, quando vi si è inceppato: se questi non riescono, si dee ricorrere all'incisione, che è un'operazione semplicissima, e senza pericolo. Quando la pietra è ingrossata nella vescica, si pongono in opera puri palliativi, o si viene all'operazione del taglio, che ai di nostri è ridotta alla maggior perfezione, alla quale possa arrivare, ma le più riuscite sono perpetuamen-

te incerte. Non è già che non si parli di molti *litonritici*, come della verga dorata, del ravanello silvestre, del sugo di limone, della pareira brava, del legno nefritico, delle acque di Baresges, e d'altre minerali, ec. ma i sovrani elogi fatti a questi rimedj da alcune persone prevenute non son confermati dall'esperienza. Io non so, se l'acqua di calcina, che a' dì nostri vien proposta con tanta fidanza, sia d'un valore agli altri superiore: pel altro par che si possa fondare qualche speranza sul numero grande d'esperienze, che sono state fatte intorno a tal soggetto, le quali pare omai, che provino, che si possa adoprare senza pericolo, sì in bevanda, che schizzettandola: si crede anche, che il rimedio del Signor *Stephens* abbia la sua efficacia dalla sola calcina, che vi ha luogo. Checchè sia di ciò, quest'ultimo fino al presente merita la preferenza sopra gli altri tutti; e io ardisco anche d'assicurare, per qualunque cosa dire se ne possa, che distrugge sicurissimamente le pietre, che non hanno la durezza della focaja: la sua efficacia attaccata da molti raziocinj, viene attestata da numerosissime guarigioni: io non occulterò, che il Dottor *Mead* è fra gli aggressori. Fra molte osservazioni, delle quali potrei parlare, non ne riferirò che una fornita di tutte le formalità, le quali posson vincere la più ostinata incredulità, contentandomi di dare il risultato delle altre.

Un uomo di circa 50. anni era disposissimo per l'operazione del taglio: la pietra toccata più volte colla tenta, gli cagionava i più intensi dolori ogni volta; che faceva alcuna goccia d'orina: aveva perduto l'appetito, sonno, e le forze, ed era qualche tempo, che trovavasi in uno stato deplorabile. Costui, io dico, prese il rimedio del Sig. *Stephens* per sette in otto mesi: nel secondo mese ne ritrasse un sollievo tale, che gli cagionò una voglia grandissima di continuarlo; nel terzo mese trovavasi in molto miglior stato: nel quarto mese poteva ritener la sua orina per lo spazio d'un'ora, lo che era gran tempo, ch'ei non aveva potuto fare: finalmente questi progressi non furono interrotti fino al settimo mese, nel quale si vide affatto libero da tutti i suoi incomodi, avendo renduto nel corso di questa medicatura molti frammenti pietrosi, e delle fangosità: allora vide la sua orina, come nello stato più perfetto di sanità: rendevala sen-

za il menomo dolore : ritornarono l'appetito, il sonno, le forze, e la carne. Tuttochè nel suo stato non vi fosse ombra d'equivoco, nè mi lasciassero il menomissimo dubbio rispetto alla sua guarigione i frantumi della pietra; io volli ciò non ostante, che questa venisse confermata per mezzo della tenta: fu questa introdotta dallo stesso litotomo, che dovea tagliarlo sette mesi prima, alla presenza di tutti coloro, che vi vollero assistere: furono inutili tutte le ricerche fatte in ogni situazione: la tenta passò per le mani di molti Medici, e Chirurghi, i quali tutti dichiararono, che nulla esisteva nella vescica, e che la guarigione non poteva esser più certa.

Ho io fatto, com'altri può immaginarsi, lo stesso giudizio di questo rimedio in molte altre occasioni, non meno per la pietra della vescica, che per la colica nefritica, e pel calcolo dei reni. 1. Di quei, che avevano la pietra nella vescica, io ne conto solo quattro guariti radicalmente alla più lunga in dieci mesi: gli altri si sono stancati d'una bevanda sì disgustosa, tuttochè ne ritraessero del sollievo: un solo vecchio d'oltre 80. anni la prese costantemente per gli ultimi cinque, o sei altri anni di sua vita, la quale, senza un tale ajuto, gli sembrava insopportabile: un altro, che con la pietra aveva un'ulcera nei reni, e nella vescica, morì dopo il 31. giorno del rimedio: l'apertura del costui cadavere, che fu fatta in pubblico, ci mostrò una pietra sommamente corrosa, che fu esposta all'Accademia delle Scienze. 2. Le pillole destinate alla colica nefritica sono anche meglio riuscite, non avendo io veduto alcun paziente, che non sia stato risanato, o in estremo sollevato da questo rimedio. 3. Non è seguito lo stesso della pietra dei reni; non avendo io incontrato, che due soli uomini, da me creduti in questo caso: questi veramente ne hanno tratto del giovamento; ma non ho saputo, che ne sieno guariti. Finalmente io credo, che questo rimedio debba considerarsi per uno dei maggiori, dei quali sia stata arricchita la Medicina: del rimanente io non ho il minimo interesse per metterlo in voga: coloro, che lo screditano, hann'eglino bene esaminata la cosa? Il Signor *Huxham* pretende, che sia contrario agli scorbutici, e che possa anche precipitare in questo morbo i pazienti: quanto a me non ho per-

anche osservato cosa simigliante : tuttavia una tal testimonianza merita tutta l'attrazione.

ORINA SANGUIGNA.

Non è sempre agevole il giudicare, se il sangue venga dai reni , o dalla vescica : nel primo caso non si sente alcun dolore , qualora non lo ecciti la pietra , o qualunque altro vizio nell'organo : tuttavia accade talora , che il sangue , ch' è uscito dai reni senza dolore , ne risvegli a motivo di aggrumamenti , i quali si impegnino , non meno negli ureteri , che nel collo della vescica : l'orina sanguigna , che viene da questo secondo organo , è d'ordinario accompagnata da dolori che sono acutissimi , quando si espelle l'orina . Questo male è per lo più periodico ; e le sue riprese dipendono il più delle volte da qualche disordine nel governo : si è talora osservato , che torna ogni mese ; per non fare parola di quei tali , che hanno uno sgorgo mestruale per la verga , del che abbiamo parecchi esempj ; nè dell'emorragia dell'uretra , in cui il sangue cola a goccia a goccia , senza dolore , e indipendentemente dall'orina . Il calcolo , e principalmente quello della vescica , è la cagione più ordinaria dell'orinar sangue : i varicoli della vescica possono dar motivo allo stesso morbo : le canterelle , l'aloe , il balsamo di zolfo trementinato , ec. hanno prodotto alcuna volta le orine sanguigne , di pari che le percosse , le cadute , i grandi sforzi , l'esercizio violento , l'abuso delle donne , e del vino , un accesso di collera , ec. Le femmine , che hanno passato il tempo dei loro corsi mensurali , vi sono sottoposte , di pari che coloro , ai quali si è fermato il loro sgorgo emorroidale : i melancolici , e gli scorbutici , rendono sovente le urine rosse , o nere , che son poco diverse dalle sanguigne : quelle di quei tali , che hanno degli imbarazzi nel fegato , sono con frequenza ardenti , e colorite , o tinte di sangue .

Dibbonsi perpetuamente temere le conseguenze dell'orina sanguigna ; ma il pericolo è di rado pressante , massime , se non vi sia nè febbre , nè dolore : questa alcuna volta termina le febbri ardenti ; ma è di reo augurio nelle altre : è poi uno dei orribili sintomi nel vaiuolo , nella rosolia , e nella febbre maligna : dà meno da temere , s'è periodico , se supplisce ai menstrui , o al flusso emorroidale : egli è sempre pericoloso , quan-

o è cagionato dalla pietra , o da qualunque altro vizio di questi organi : non ci facciamo gran paura di quell' orinar sangue , che vien dietro all' esercizio violento , o a qualsivoglia altra cagione passeggera , purchè non duri lungo tempo ; avvegnachè in tal caso la parte offesa venga minacciata dall' ulcera : ognun sa finalmente , che si possono per più anni rendere le orinerosse , o quasi nere , senza grave incomodo .

Le osservazioni anatomiche ci fanno vedere , che la vescella , e le pietre , sì dei reni , e degli ureteri , che della vescica , sono le più ovvie cagioni dell' orinar sangue : non è difficile il seguirne la traccia , e lo scuoprir i vasi de' due organi , che avevanlo somministrato : si trovano dei grumi di sangue ostruenti gli ureteri , e dei pezzi di sangue quagliato nuotanti nella vescica , o impegnati nel suo collo . Sonosi osservate nei reni delle ulcere , della putrefazione , ed anche il loro annientamento : si sono veduti i vasi della vescica estremamente stivati di sangue , e varicosi , e il più delle volte quei del suo collo grondanti sangue : questa viscera esulcerata , nera , e cancrenata , contenente dei vermi , ec. Tali sono gli sconcerti , che si presentano negli organi dell' orina ; ma non ne vanno al coperto le altre viscere : imperciocchè si è trovato il fegato infiammato , scirroso , esulcerato , e sfacelato , la milza d' una grossezza prodigiosa , e ostrutta : delle suppurazioni , e delle pietre nel cuore , ed altri vizj , che hanno un rapporto più lontano coll' orinar sangue .

Le cavate di sangue , di pari che gli altri rimedj proposti contro l' emorragia , in questo rendosi necessarie : è inutile il dire , che deesi aprire la safena , quando la soppressione dei menstrui , o del flusso emorroidale danno motivo all' orinar sangue . Si fa grand' uso degli *allentanti* , degli *adulcenti* , de' *rinfriscanti* , e de' *temperanti* , come dei fiori , e della radice di malva , delle semenze di lino , dell' ortica , della consolida maggiore , della borraia , della cicoria , dell' agrimonia , delle capillari , della scolopendra , della pimpinella ; del latte , del siero , delle emulsioni , e degli altri farinosi , dello spermacei , ec. I *calmanti* , come il nitro , e la canfora , vengono utilmente impiegati assai spesso , massime quando l' orinar sangue è il sintoma della febbre : vi sono anche dei casi , che possono richiedere i *narcotici* , ed eziandio gli *astringenti* , ma non

farà mai troppa la riserva usata nell' amministrarli fatti rimedj, nè sarà mai soverchio il guardarsi bene d'aderire all'asserzione della maggior parte degli Autori, che propongono arditamente il laudano, il diacodio, i cotogni, il cascìu, il bolo armeno, ec. I *vulnarij*, come le cime d'iperico, la veronica, l'ellera terreste, i trocisci di Gordon, ec. possono essere d'alcuna utilità; ma i balsami, e le trementine di rado riscono, quantunque sembrino più convenienti. I *laffativi*, come il rabarbaro, la cassia la manna, hanno sempre la lor parte in questa medicatura: vi si fa perfino entrare la gialappa, e il diagridio, quando abbiamo da combattere delle ostruzioni; per le quali dannosi ancora i fortificanti, e gli aperienti, come la cannella, la cassia legnosa, lo zafferano di Marte, il tartaro emetico, i centogambe, ec. Ho veduto guarire un' orinaria sanguigna abituale, che aveva fatto testa a tutti i rimedj; colla salvia: è stata fatta la stessa osservazione rispetto alla menta, e alla calamita. Le acque minerali acidule, mescolate col latte, con frequenza hanno prodotto ottimi effetti. Finalmente le schizzettature coll'acqua tepida, con quella di Balaruc, e con tutte le altre termali; i lavativi addolcenti, e lassativi; i bagni; le mignatte applicate ai vasi emorroidali, ecc. sono in alcune circostanze vantaggiosi rimedj.

ULCERA DE' RENI, E DELLA VESCICA.

Le orine fangose, purulente, e fetide, non son sempre un segno certo dell'ulcera nei reni, o nella vescica; poichè abbiamo detto altrove, che la marcia, la quale si era formata nelle altre viscere, si indirizzava talora verso questi organi; per altro non è sempre agevole il decidere, se quella materia bianca, e opaca deposita dalle orine, e che si prende comunemente per marcia, ne abbia veramente il carattere, sapendo pur troppo i Pratici, che uno vi s'inganna tuttodì; ma se la colica nefritica, i segni dell'infiammazione, e del calcolo, son preceduti; se resta nei lombi un calore, e un dolore ottuso; la febbre lenta, e gli altri segni delle esulcerazioni interne, si può giudicare con maggior fondamento, che il rene è intaccato. Il dolore, e la tensione dell'ipogastro, più sensibile, quando si tocca, o quando si orina, l'ardore delle orine, il tenesmo, le frequenti erezioni, e le orine purulente,

non

non lascian luogo di dubitare , che la vescica non sia esulcerata . Quando la materia purulenta precede l'orina , o cola indipendentemente , siamo sicuri , che l'ulcera è nel canale ; ne faremo parola a suo luogo . Si sa , che l'escoriazioni prodotte dalle pietre , nei reni non meno , che nella vescica , danno spesso motivo alle ulcere di questi organi : possono essere eziandio l'effetto delle canterelle , e d'altre sostanze corrosive ; per non parlare di molte altre cagioni generali , e comuni a tutte le parti : si può giudicare del carattere , e dell'estensione dell'ulcera dell'una , e dell'altra parte , dalla quantità , e dalla natura della marcia , che si restituisce , dai caruncoli , ed anche dai pezzetti considerabilissimi della membrana interna della vescica , che le orine talora portan seco .

L'ulcera nei reni , quando non vi si è molto avanzata , si risana più facilmente , che quella della vescica ; conciossiachè il moto di questa seconda è un ostacolo a ciò , per quanta facilità abbiamo di farvi giungere il rimedio colle iniezioni : ovvero , per parlare con più chiarezza , l'ulcera dei reni difficilissimamente si sana , e quella della vescica è quasi incurabile , massime in un'età avanzata . Non è necessario il dire , che dobbiamo far pessimo augurio del fetore delle orine , dell'uscita dei caruncoli , ec. tuttavia è molto difficile il giudicare dai segni ordinarij dello stato di queste parti : ho veduto un giovane il quale alle relazioni , che me ne furono fatte , aveva avuto una colica nefritica due mesi avanti , che mostrava di star bene , ed erano anche quindici giorni , che si era ammogliato , quando un secondo accesso nefritico lo portò al sepolcro in meno di tre giorni : sorpreso d'una morte così impetuosa , non mancò di far aprire il suo cadavere : noi trovammo il rene destro , che conteneva molte pietre , le quali nuotavano in un fango purulento , e gessoso , essendo totalmente distrutta la sua sostanza dalla suppurazione , e dalla putrefazione : questa malattia trovavasi dunque nello stato più deciso d'incurabilità , senza che ne potessimo ricavare dagli antecedenti alcun lume per giudicarla tale .

Le altre osservazioni anatomiche c' insegnano , esser cosa sommamente rara , che si trovino nei reni ulcere senza calcolo : s' incontra con frequenza quest'organo sotto la forma d'un sacco , ora accasciato , ora estremamente dilatato dall'orina saniosa , e purulenta ; ve
ne

ne abbiamo trovata fino alla misura di sei pinte : 4 n'è trovata più d'una pinta negli ureteri. Si sono anche veduti i reni disseccati, e laceri, che avevano contratto delle adesioni colle parti adjacenti, che contenevano dei vermi, ec. Sonosi osservate nella vescica ulcere più, o meno considerabili, e pietre di tutte le forme : vi si sono trovati dei caruncoli provenienti dal suo sfogliamento, o che si erano staccati dai reni : vi si sono osservate delle tasche, e delle celledette piene di marcia di pietre, e di renella, delle ulcere fistolose, comunicanti coll'intestino retto, ec.

L'ulcera dei reni, e della vescica dee essere a un dipresso medicata, come le altre interne : non lasceremo d'additare in questo luogo i soccorsi, che pajono più appropriati a questo caso. Dopo i rimedj generali, se gli vuole alcuna circostanza, non dobbiamò perder d'occhio i *temperanti*, e gli *addolcenti*, come la cicoria, l'agrimonia, la borraia, la consolida maggiore, la pazienza, i fiori, e la radice di malva, il seme di lino, il latte, il siero, ec. ai quali bisogna unire le acque minerali acidule, come quelle di Vals, di Spà, ec. ma i *balsamici*, i *vulnerarij*, i *acterfici* sono i rimedj più dicevoli al morbo, di cui parliamo; tali sono la perforata, o sia iperico, le vulnerarie svizzere, la trementina, il balsamo del Copahù, e del Perù, i trocisci di Gordon, l'idromele, l'acqua di calcina, ec. Gli *ipnotici* talora sono palliativi indispensabili; ma ci dee far paura il loro lungo uso. Si possono praticare i *lasciati*, quando lo esiga lo stato delle prime vie, e in questo caso si antepone agli altri tutti il rabarbaro. Certuni si son serviti contro questo male della pareira brava, dell'agrifoglio, della radice di prezzemolo, dell'etiope minerale, ec. ma io dubito, che gli eventi non abbiano secondato le loro mire. Le iniezioni, col latte, e con i trocisci di Gordon, coll'acqua di calcina, e con altre non meno addolcenti, che detergenti, non debbon essere dimenticate, quando il male risiede nella vescica; si può avere anche del vantaggio dai lavativi addolcenti, terebintinati, ec.

DISURIA, E STRANGURIA.

Si confondono d'ordinario queste due malattie, le quali a dir vero bene spesso dipendono da una stessa ragione; e si additano sotto la denominazione di *difficoltà col-*

oltà di urinare, accompagnata da un maggiore, o da un minor ardore: nella disuria l'orina gocciola con molto stento, ma la voglia di urinare cessa, poichè la vescica è ilaricata: nella stranguria provanti stimoli continui, e non si può urinare, che a goccia a goccia con dolori acutissimi: ma questi due stati si trovano frequentemente insieme, o si succedono: tutt'e due sono il sintoma più familiare della pietra, dell'infiammazione, e dell'ulcera, non meno della vescica, che dell'uretra, e sovente accompagnano l'orina di sangue. L'uso sì interno, che esterno delle canterelle può darvi motivo; i vecchj son fortoposti allo stranguria, e per lo più non ne guariscono: gl' ipocondriaci, e gli orbutici provano con frequenza ardori d'orina passeggeri: la birra nuova produce l'effetto stesso, ed eccita anche una specie di gonorrea, che non è da temere. Dopo un attacco di gotta, o di reumatismo, talora sopravviene una disuria, la quale cessa al ritorno dell'urina, e dell'altro parossismo: la soppressione delle emorroidi, dello sgorgo menstruale, e dei lochj, eccita alcuna volta questo male medesimo: finalmente la disuria, e la stranguria entrano con frequenza nella classe dei morbi venerei: parleremo altrove della disuria, che si riferisce ai vizi dell'uretra.

Le cagioni più familiari svelateci dall'ispezione anatomiche si raggrano sopra le pietre, e le ulcere della vescica: le prime trovansi bernoccolute, angolate, con asprezze, o di qualunque altra figura irregolare: si è scoperto, siccome abbiamo riferito, che trovavansi annicchiate in cellette formate dall'allontanamento delle fibre della vescica, e dalle piegature della sua tunica interna: le ulcere possono investire tutte le parti di quest'organo, ma trovansi per lo più situate verso il suo collo. Si è veduta la vescica infiammata, scirroso, cartilaginosa, e callosa; nera, e cancerenata: sonosi trovati abscessi nella sua interna superficie, delle escrescenze fungote, e cancerose; una specie di rogna, o di pustole esulcerate; vasi stivati, e varicosi ai contorni del collo. Si è trovata questa viscera laccerata a motivo del suo grande distendimento, d'un'estrema picciolezza; e questo, o per conformazione d'essa, o per infermità, talvolta totalmente mancante, e facendo le sue veci gli ureteri; per non far parola di parecchi altri difetti di conformazione, che poco
 inte-

interessano, a motivo della loro rarità. Si è anche spessissimo veduta la prostata infiammata, gonfiata, scirrosa, o putrefacente: si è veduto talvolta il collo della vescica compresso da tumori esterni, da aneurismi, dalla straordinaria grossezza dell'intestino retto, della vagina, ec. Bisogna aggiungere al detto finora, le pietre, la flogosi, l'abscesso, e l'ulcera dei reni, che hanno talvolta dato motivo alla disuria, e alla stranguria: tuttochè la vescica sia comparsa affatto sana; ma il più delle volte i reni, e la vescica sono intaccati nella maniera medesima: finalmente molte persone sono state per lunghissimo tempo tormentate dalla disuria, e dalla stranguria, senza che si sia rilevato alcun intacco osservabile nei reni, nè nella vescica.

Le cavate di sangue sono necessarie, quando si ha motivo di credere uno stivamento varicoso; o se vi sia la soppressione di qualche sforzo di sangue abituale; possono essere proficue anche in altri casi. Ma le cose più indicate sono gli *allentanti*, e gli *addolcenti*: tali sono il brodo lungo di pollastra, o di vitella, il siero delle acque acidule, e ferrate; il latte, le emulsioni, l'olio di mandorle dolci; i fiori di malva, il seme di lino, e di papavero, il seme di rapa, la radice di malva, di nenufar, e di fragola, le mucilagini, ec. I *calamanti ipnotici* in questo caso sono sospetti; ma si può far uso del nitro, del liquore anodino minerale, ec. I *lasciativi*, come la cassia, la manna, e i tamarindi, sono spesso proficui. Dall'istoria esposta dell'apertura dei cadaveri, è agevole il giudicare, che i *vulnerarij*, e i *balsamici* possono aver con vantaggio la loro parte in questa medicatura: ed è anche provato da buon numero d'osservazioni, che la trementina, il balsamo del Copahù, del Perù, ed altri, sono stati amministrati con riuscita. Ultimamente le iniezioni col latte, col siero, coll'olio di mandorle dolci, e con molti altri, non meno addolcenti, che vulnerarij, possono fare un gran bene, di pari che i lavativi emollienti, addolcenti, e oleosi; le fomentate, e i cataplasmi rilassanti; i bagni, i mezzi bagni, ec.

ISCURIA DEI RENI, E DELLA VESCICA.

Ella è cosa di pari agevole, che importante l'assicurarsi, se le orine sono soppresse nei reni, o ritenute nella vescica: la soppressione non nasce sempre dalla

ne-

nefritide, dal calcolo, dall'infiammazione, o da qualunque altro intacco dei reni: dipende la medesima conseguenza dall'increspamento spasmodico di tutte le viscere del basso ventre, come si osserva ogni giorno nei morbi acuti, nelle affezioni ipocondriache, e isteriche, &c. Il rilasciamento, o l'accasciamento dell'organo, in vizio negli umori, le orine mucose, ec. posson produrre l'effetto stesso. Bisogna aggiungere ai segni della nefritide, del calcolo, e dell'infiammazione, i quali appartengono anche all'*iscuria dei reni*, il dolore ottuso o con un senso di peso ai reni, le cardialgie, le nausee, il vomito, il gusto dell'orina alla bocca, il soffogamento, il sopimento, ec. Alcuni tentano a piegar la spina; ma in tal caso non vi farebb'egli una complicazione di lombaggine, o di icciatica, ch'è noto unirsi talvolta al male, di cui parliamo? Si può conoscere, che l'orina è ritenuta nella vescica dalla tensione, e tumefazione dell'ipogastro, da un senso di peso nel peritoneo, dalla voglia d'orinare, che non si ha nell'iscuria dei reni; e finalmente dall'algaria, che scuopre anche meglio il male, servendogli di rimedio: l'iscuria della vescica, che nasce dall'infiammazione, o dalla suppurazione, non meno della vescica, che della prostata, ordinarie conseguenze delle gonorree sopresse, accompagnata dalla febbre, e con frequenza dal delirio: il dolore, e gli ardori allora sono acutissimi, ed i pazienti trovansi in estremo abbandonati.

Non potrebbe altri resistere lungo tempo all'iscuria dei reni, o alla soppressione totale delle orine: d'ordinario è questa mortale, se passa il sesto, o il settimo giorno, purchè i copiosi sudori non prolunghino il male fino al duodecimo, o al decimoquarto: non si è veduto passar questo termine: quella, che viene in conseguenza d'una piaga, o d'una caduta, è pericolosissima: il sopimento, la soffogazione, e il singhiozzo, sono in tutti i casi pessimi sintomi. La ritenzione d'orina, o l'iscuria della vescica è comunissima nei vecchi: sembra, che in tal circostanza ella dipenda dall'intorpidimento delle fibre della vescica, e non già, come vien preteso: dalla paralisi: nella maggior parte si dilegua naturalmente, dopo quindici, venti, o trenta giorni, purchè non si trascuri di vuotar con frequenza la vescica. Le donne gravide son soggette all'iscuria della vescica, e ne son liberate col parto: quei che riten-

tengono per lungo tempo l'orina, vi si espongono: possono anche produr questo incomodo gli stravizj del coito: con frequenza dipende da un vizio nel canale prodruttivo dalla gonorrea; oppure dipende semplicemente dall'istringimento spasmodico, di pari che dal gonfiamento della prostrata. La grossezza smisurata di questa caruncola, che si può denominare *l'ugola della vescica*, è una cagione molto frequente, e perpetuamente ignota, dell'iscuria della vescica: questo tumore ferma talvolta l'urina; ma non è difficile il sormontar questo ostacolo quando n'è nota la natura: si possono intorno a tale accidente consultare le Memorie dell'Accademia delle Scienze sotto l'anno 1753. L'inflammatione della vescica che dà talvolta motivo alla malattia, di cui trattiamo, porta al sepolcro gl'infermi per lo più in quattro, o in cinque giorni, o degenera in ulcera, che fa tirare innanzi una vita miserabile e languente.

Coll'apertura dei cadaveri trovansi con grandissima frequenza delle mucosità, un fango gessoso, della renella, e delle pietre, non meno nei reni, che negli ureteri, e nella vescica: le pietre trovansi per lo più annicchiate nella sommità degli ureteri, o fermate nel loro tragitto a una distanza maggiore, o minore dalla vescica. Sonosi veduti i reni infiammati, esulcerati, putridi, forati, e distrutti; laceri, e disseccati, d'una grossezza mostruosa, dilatati a foggia di sacco dall'orina fermata, e talora, a motivo della loro smisurata dilatazione, trasformati in una vescica trasparente. Si è incontrato in pochissimi soggetti un sol rene nella situazione ordinaria, o collocato in mezzo con un solo uretere: si sono osservati negli ureteri, oltre le materie già noverate, dei grumi di sangue: sonosi veduti questi canali cartilaginei, e disseccati. Si fa anche menzione di pietre trovate nelle vene emulgenti: del bacinetto dei reni intornaciato d'una crosta pietrosa, e di varj tumori, che dal di fuori comprimevano gli organi: si è assai volte osservato, che un rene, tuttochè nel suo stato naturale, aveva cessato di fare le sue funzioni, quando era intaccato l'altro; che i reni, e la vescica comparivano talora sanissimi, benchè fossero, ora stivati d'orina, ora a secco. Niente meno copiosi, nè meno frequenti sono gli sconcerti della vescica: oltre le pietre, e la renella, che le sono ordinarij, vi si scuoprono delle flogosi, degli abcessi, delle ulcere,

a cancrena, ec. Sonosi veduti dei polipi, che occupavano quasi tutta la sua cavità; tumori scirrofi, e carcinomatosi, della grossezza del pugno, ec. Questa viceria è ancora con frequenza cartilaginosa, e callosa. Si trova in oltre la prostata gonfiata, infiammata, scirrofa, e callosa. L'ugola tumefatta, ed additata sovente dagli Autori sotto la denominazione di scirro, di tubercolo, d'escrescenza, di caruncola, di carne spumosa, che dicevasi esser piantata vicino al collo della vescica. L'enorme grossezza dell'intestino retto, della vagina, della matrice, ec. Abbiamo già detto, che la vescica rigurgitava l'orina senza vizio apparente; noi l'abbiamo incontrata, che rimontava al di sopra del bellico, e che occupava la metà del basso ventre: si è finalmente trovata alcuna volta lacera, di pari che gli ureteri.

Quando l'iscuria dei reni è sintoma della febbre, dell'infiammazione, e della nefritide, non richiede medicatura particolare: negli altri casi la cavata del sangue, e principalmente dal piede, è appropriatissima, se lo permettano l'età, e le forze: lo stesso rimedio può essere anche applicato all'iscuria della vescica, massime quando dipende dalla gonorrea soppressa. L'emetico nella soppressione dell'orina può far gran bene, e gran male; e perciò non deesi praticare, che con somma prudenza, ed anche nei casi estremi: gli *allentanti*, i *lubrificanti*, e gli *addolcenti*, da noi tante volte additati, debbon essere in questo luogo dati con riserva, come quelli, che possono accrescere l'imbarazzo. Si può far uso nell'iscuria de' reni non dipendente da vizio locale, dei *diuretici*, come del nitro, del sugo di limone, della parietaria, del calcitrappa, del ravano, degli sparagi, della pareira brava, dei centogambe, del balsamo del Copahu, del sale di succino, dello spirito di nitro, e di vetriolo, ec. si è talora amministrata utilmente la polvere delle mosche melate, ed anche quella di canterelle; ma questa seconda dee riservarsi per i casi estremi. Tutti i diuretici son perniciosi nell'iscuria della vescica: questa s'investe con lavativi emollienti, ed oleosi; i terebintinati s'addicono a quella dei vecchi; con fomite, cataplasmi, e lenimenti rilassanti; con bagni, e con mezzi bagni, ed anche coll'immersione dei piedi nell'acqua calda, o fredda: i cataplasmi di cipolle cotte, o di parietaria, applicati ai lombi, o all'ipogastro, secondo che l'iscu-

sia è dei reni, o della vescica, sono altresì grandemente raccomandati: fanno sì anche delle unzioni coll' olio di formica, o con quello di scorpione; e questa pratica pare, che sia ben riuscita. L'*algaria* è finalmente il mezzo più sicuro per terminare l'iscuria della vescica, massime per i vecchj; le tente, e le candelette graduate, sì semplici, che composte, sono eziandio utilissime quando il vizio trovasi nel canale: se non se ne può introdurre per disimpegnar la vescica dall'orina, che s'opprime, uno si rivolge a pungere il peritoneo, o l'ipogastro; ma si può schivare questa operazione perpetuamente pericolosa, e bene spesso inutile, come quella che lascia sussistere la cagione del male, col servirsi di una tenta dritta, solida, o incavata. Io posso accertare sopra la cognizione, ch'io tengo di queste parti sane, o inferme, che non vi è alcun caso, se si eccettua la pietra impegnata nel canale, che possa impedire una tenta dritta, condotta da una mano alquanto esercitata, d'entrare nella vescica: si pratica eziandio in questa occasione un'altra operazione poco diversa dal taglio col grande apparato, e ch'io credo ugualmente inutile, che le precedenti. Questo fatto Chirurgico richiederebbe d'essere esposto più estesamente; ma il piano di quest'opera me lo vieta.

IL DIABETE.

Non è questo morbo così raro com'altri pensa, massime nei vecchj, e fra i cachetici; ma con frequenza non se ne avviano nè i Medici, nè gli ammalati, quali trascurano d'osservar le orine; allora queste sono più abbondanti, relativamente all'abbevanda, che si prende: è anche cangiata la loro qualità; e non è difficile l'accorgersi, che sono oleose, e talvolta anche chiose. Questo stato, sempremai pericolosissimo, è accompagnato dalla febbre lenta, e dalla sete: la saliva è spesso spumosa: sentesi un ardore ai lombi, e talvolta alle viscere: ultimamente si perdono le forze, e la carne, ecc. In una parola ella si è questa una specie di febbre etica, o come dicono, colliquativa, che dipende comunemente da un vizio nei reni, o nel fegato. Il diabete viene talora in conseguenza d'una malattia grave, della colera, ec. L'eccessiva fatica, l'abuso delle donne, del vino, e dei liquori, può darvi motivo, come altresì certi diuretici, ed anche le acque minerali.

Dal-

Dalla sezione anatomica ci vengono offerti i reni molli, e accasciati; d'una straordinaria grossezza, o in uno stato di putrefazione: le loro membrane indurite, ec. queste viscere racchiudono sovente delle pietre, di pari che gli ureteri, che sono trovati irregolarmente dilatati, e che facevano più giri: si è anche veduto la vescica stivata, e sfacelata; il fegato scirroso, e putrido, la milza callosa, ec.

I *temperanti*, e i *rinfrascanti* sono i rimedj, che pajono i più appropriati a questo male: i più usati sono il latte, il siero, le emulsioni, le creme d' orzo, di riso; ec. la cicoria, la borraia, l'agrimonia, la pimpinella, la consolida maggiore, la gomma adagrante, e l'arabica, le tartarughe, ec. Quindi si fa uso degli *assorbenti*, e degli *astringenti*, come del corallo, degli occhi di granchio, del bolo Armeno, del corno di cervo preparato, delle rose, della piantaggine, del sommacco, della bistorta, dei cotogni, del cascìu, dell'acacia, dell'allume, della pietra ematite, dei marziali, e dell'acque minerali naturali, ec. Non s'addice a questo male la cavata del sangue, quantunque coloro, che fannola entrar per tutto, non manchino di proporla anche in questo caso con gli altri rimedj: i purganti leggieri, come il rabarbaro, la cassia, e la mana sono proficui di pari che i lavativi, i quali posson riparare la costipazione del ventre sì familiare a questo stato, e dilungare a un tempo stesso una parte della serosità, che sopraccarica i reni: si è anche fatto uso colla stessa intenzione del Guajaco, del Saffafras, degli anriettici del Poterio, e d'altri sudorifici, i quali diminuiscono, di pari che i purganti, la copia delle orine. Si sono anche sperimentati dei buoni effetti dagl'*ipnotici*, vale a dire, dal laudano, dal diacodio, dalla tintura anodina, ec. Finalmente varie circostanze, che accompagnano questo morbo, hanno con frequenza impegnano i Medici ad amministrare altri rimedj, come gli aperienti, i fortificanti, i vulnerarij, detergenti, ec.

INCONTINENZA D'ORINA.

Questo male senza cagione patente è familiare ai fanciulli, e ai vecchj: nei primi accade soltanto nel sonno; ma i secondi vannovì soggetti in ogni tempo. L'abuso dei diuretici, il parto difficultoso, il calcolo, le cadute, l'operazione del taglio, la troppo lunga dimo-

ra nell'acqua fredda, l'apopleffia, e le affezioni soporose, il più alto grado di tutte le malattie acute, ecc. possono dar motivo allo scolo involontario dell'orine. L'età, e l'educazione ne libera i fanciulli; ma di rado si risana nei vecchj, come altresi in tutti i casi ove dipende da un vizio negli organi; ognun sa ancora, quanto terribile sia questo sintoma nei morbi acuti.

L'incontinenza d'orina provenendo il più delle volte dal rilasciamento, o dalla paralisi degli organi, si vede bene, come l'apertura dei cadaveri non deve somministrarci molti lumi: si è per altro veduta l'idropisia della midolla spinale, la smisurata grossezza dei reni, pietre, ed ulceri nelle viscere. Si è trovato la vescica indurita, e incapace di dilatazione, esulcerata, livida, e cancrenata, contenente pietre, e abscessi, compressa dal tumore della matrice, e da altri delle parti adjacenti. Sono incontrati gli ureteri estremamente dilatati, che facevano le veci della vescica, la quale trovavasi sommamente ferrata; per non parlare dei varj sconcerti, che danno motivo all'orine di colore involontariamente pel peritoneo, per lo scroto, per l'ano, pel bellico, ec.

Gli *astringenti*, come l'acqua, in cui sieno stati smorzati dei mattoni roventi, il vin rosso, le rose di Provins, la consolida maggiore, l'asparella, la coccola di cipresso, il cascìu, il mastice, i marziali, ec. sono i rimedj più acconci a fortificare gli organi rilasciati: si possono anche amministrare coll'indicazione medesima gli *aromatici*, come la menta, la calamenta, il pepe, il garofano, la noce moscada, ec. Per la ragione medesima pure si preferisce il rabarbaro, e i mirobolani agli altri purganti, allorchè gli voglia lo stato delle prime vie. Vengono anche proposte le iniezioni aromatiche, e fortificanti, di pari che i cataplasmi, le fomite, i linimenti, i mezzi bagni, e i lassativi, che hanno la stessa proprietà: sono anche in questa occasione veduti de' buoni effetti dai bagni freddi. Chicchessia ha sentito parlare della polvere di forcio, e d'altri varj rimedj da donnicciuole, che possono esser renduti efficaci dal grado di fidanza, che se gli dà. Si sa finalmente, essere stati immaginati diversi instrumenti, i quali col comprimere la verga, e l'uretra, impediscono lo scolo dell'orina; ma pochi son quelli, che ne possano sottrire l'incomodo: è stata anche praticata per
le

le donne una supposta, che produce l'effetto stesso; ma esse pure vi trovano la medesima difficoltà. Non parlo dei diversi vasi di rame, di vetro, o d'argento; atti a ricever l'orina, che da coloro, i quali si vogliono difendere dal reo odore, e dall'immondezza, sogliono portare senza molta ripugnanza.

FLUSSIONE CATARRALE DELLA VESCICA.

Così, a mio credere, si può denominare una malattia singolare della vescica, da me veduta in un giovane di sedici in diciotto anni d'età: fu questa preceduta da una febbre reumatica gottosa, che durò quattordici giorni: nella ricaduta, che seguì sul settimo giorno di sua convalescenza, l'infermo laggiù d'un dolore alla vescica, e dell'ardore delle orine, che allora cominciarono ad esser tisse, ed a deporre una posatura bianchiccia, e mucosa, la quale in progresso divenne sì copiosa, malgrado il totale cessamento dei dolori, che si giudicò esser per lo meno la quarta parte del volume delle orine. Questa seconda febbre durò per dodici giorni con gran violenza, e si dileguò in capo a questo tempo, senza produrre il menomo cangiamento rispetto all'orine, le quali non furono naturali, se non dopo cinquanta giorni; che erasi dileguata la febbre. Il paziente in questo tempo non provò altro incomodo, salvo la debolezza comune ai convalescenti; ma il suo emaciamento approssimavalo al marasma, e gli dava da temere. Le cavate di sangue con riserva, gli allentanti, i temperanti, i sedativi, e i lassativi si adopravano, mentre durava la febbre: credevamo, che si potesse abbandonare alla natura, e al tempo, fiancheggiati da un buon governo, il ricovramento della vescica; e l'evento fece vedere, che non ci eravamo ingannati.

Non debbo occultare, come molti Medici, che avevano veduto l'infermo, e che avevano esaminato le sue orine, furono d'opinione, che la posatura delle medesime fosse purulenta: alcuni d'essi ne stabilivano i reni per sorgente: altri la volevano nella vescica: quanto a me, che era principalmente incaricato della cura di questo male, credetti sempre, che fosse accaduta alla vescica, malgrado la differenza degli organi, una flussione, simile a quella, alla quale è comunemente soggetta la membrana del naso, della bocca, e dei bronchi, e che ciò, che prendevasi per marcia, altro non fosse,

che un *moccio bianchiccio*, che trasudasse dalle pareti della vescica. Questo sentimento, che era lo stesso, che quello di M. *Senac* primo Medico del Re, sembrava pienissimamente confermato dall'evento; imperciocchè s'ardirebb'egli asserire, che un'ulcera, la quale avesse somministrato copia sì prodigiosa di marcia, potesse essersi risanata in tempo sì corto, e quasi senza rimedj? Non si può nemmeno supporre, che quelle materie mucose sieno state separate dai reni, i quali fecero perpetuamente le loro adeguate funzioni, essendo le medesime state precedute da i più evidenti segni d'un male della vescica. L'*Osmanno* fu consultato per una simile infermità: il titolo di *varus vescicae morbus*, ch'ei gli assegna, prova quanto basta, ch'ei non la conosceva meglio di noi, e che stabilivane la sede nella vescica: egli ci fa sapere, che i Medici del suo tempo non s'accordarono più che i nostri, rispetto alla natura di questo morbo..

L' A S C I T E .

L'innalzamento del ventre, e la fluttuazione, che vi si rileva, ci manifestano, a sufficienza questa infermità, la quale il più delle volte comincia, di pari che le altre specie d'idropisia, dall'enfiagione dei piedi: il pallor della faccia, la sete; e la febbre lenta; la difficoltà del respiro, e talvolta la tosse secca, la cardialgia, e le flatulenze; la costipazione, la scarrezza delle urine, ora limpide, ora fisse, e del colore del matton cotto, o dello zafferano; la magrezza delle parti superiori, l'edema delle gambe, dello scroto, e della verga, sono gli univoci segni: il ventre si tende come un pallone, e talvolta cresce a segno, che cala fino alle ginocchia, e si screpola, massime se gl'integumenti sono edematosi. L'*ascite* può trovarsi complicato colla timpanitide, colla gravidanza, o colla mola, colla leucoflemmazia, ec. Accade ogni giorno, che faccianfi passar per ascite gravidanze *furive*; ma oltre la fluttuazione, che può distinguere questi due stati, si può anche giudicarne dal volto, che nell'*ascite* porta impressi i segni del male, e che nelle donne incinte è naturale: oltredichè si può sentire il moto del feto, e ricorrere ai segni della gravidanza: a cagion d'esempio, alla configurazione del ventre più gonfiato dall'*ascite* nell'ipogastro, che dalla gravidanza; allo stato delle fioriture mensurali, che fuori della gravidanza d'ordinario sgorgano, ec.

E' an-

E' anche malagevole il distinguere il *vero ascite*, in cui il liquido bagna tutte le viscere destinate alla chi-
lificazione, dall'idropisia infaccata del basso ventre, vale a dire, richiusa in un sacco, come quella del peritoneo, dell'epiploon, della matrice, dell'ovaje, dei reni, ec. E' poi senza fondamento l'asserzione d'alcuni che in queste specie d'idropisie non vi è alcuna fluttuazione: è vero, che la medesima è talora poco sensibile, perchè il liquore d'orinario è fisso, o racchiuso entro un picciolo spazio; ma quando il sacco occupa la maggior parte del basso ventre, la fluttuazione vi è ugualmente manifesta, che nell'ascite vero. Non si può conoscere l'idropisia infaccata, se non quando il sacco poco esteso permette all'occhio, e al tatto il rilevarne i confini: a questo segno si può aggiungere, che il liquido, che se ne cava per la paracentesi, è quasi sempre fangoso, fetido, sanguigno, o purulento; lo ch'è molto più raro nel vero ascite. Si è pure osservato, come nell'idropisia del peritoneo, il bellico era alquanto incavato, a motivo della sua connessione con questa membrana: l'enfiagione dello scroto può passare altresì per un segno dell'idropisia del peritoneo; ma bisogna distinguersela dall'infiltramento edematoso degli integumenti, ch'è comune a tutte l'idropisie, e che non ha alcuna comunicazione col tessuto cellulare del peritoneo.

Segue comunemente nell'idropisia infaccata, che l'enfiagione del ventre è disuguale; che i pazienti conservano il loro colorito, la lor carne, e il loro appetito: oltredichè ella sta molto più a formarsi, che l'ascite: le estremità inferiori si stivano più tardi: finalmente pare, che i pazienti non abbiano altro incomodo, che quello, che proviene dal peso, e dal volume del ventre. L'idropisie dell'uno, e dell'altro carattere, riconoscono quasi tutte degli scirri, che non si potrebbero toccare, quando il ventre è tumefatto, o teso a un certo dato punto, ma che si scuoprano agevolmente, dopo che si è evacuato esso ventre per mezzo dell'operazione. L'acque, che si estraggono per via della puntura, o che troviamo aprendo i cadaveri, son limpide, del color dell'orina, verdastre, oleose, sanguigne, saniose, purulente, lattiginose, del color del caffè, o delle fecce del vino, collose, gelatinose, untuose, fangose, fetide, ec. Abbiamo detto, che quest'

ultime erano più comuni nelle idropisie infaccate : rispetto alla loro quantità , si pretende d'averne estratte più di cinquanta pinte in una sola volta : sonosene trovate nei cadaveri , secondo il Riviera , 90. libbre , secondo il Stalpart , 95. e secondo le Memorie dell' Accademia di Chirurgia , 120.

I bevitori di professione, i cachetici , gli scorbutici , e i gottosi : quei , che hanno avuto grandi emorragie , son soggetti alle *inondazioni* , ec. la leucostemmazia , e l'itterizia , la febbre quartana , e l'altre intermittenti , i morbi acuti , e i più gravi , la soppressione di sgorgi sanguigni abituali , il regresso delle malattie della cute , il disseccamento delle ulcere , delle fistole , ec. vi danno altresì motivo ; ma il più delle volte queste inondazioni si formano in occasione di scirri , di tubercoli , e d'altri sconcerti , de' quali parleremo : hanno questi anche talvolta la loro sorgente nella bevanda fredda , e trasmodata , nella cattiva condotta delle donne di parto , ec.

E' dimostrato da numerosissime osservazioni , che abbiamo sopra l'ascite , che le fanciulle , e le donne ne guariscono più che gli uomini , e che nelle une , e negli altri è meno ostinato dell' idropisia infaccata . Se l'ascite nasce dalla soppressione delle orine , senza intacco interno , siccome talora accade , si dilegua agevolmente : una donna di 35. anni , che avevane uno manifestissimo , veramente poco tempo dopo il suo male , ne fu ritanata in meno di dodici giorni con una semplice ptisana nitrata , ed alcuni altri dei più comuni diuretici : sonosi veduti di quelli , che si trovavano nel caso medesimo , liberarsene senz' altro ajuto , salvo quello della Natura , comunemente per uno sgorgo d' orine , e talvolta dalla diarrea : si è anche osservato , come questo male erasi dileguato per lo scolo naturale dell'acque pel bellico . Nulladimeno l'ascite per lo più , è di malagevolissima guarigione , e sempre più ostinato della leucostemmazia , massime quando questo n' è la conseguenza : l' invecchiato vien considerato come incurabile , per esser comunemente conservato da uno sconcerto grande del fegato , o delle altre viscere : allora possiamo ben seccare le acque , o con i rimedj , o colla puntura ; ma i malatti non ne muojono meno disseccati , o precipitano in recidive familiarissime a tutti gl' inondamenti , e quasi sempre mortali . La svogliatezza , l' itterizia , il marasmo , l' orina rossa , il tras-

modato sgorgo emorroidale, lo sputo di sangue, la febbre resipellacea, ec. son sintomi, o accidenti assai tristi: la tosse secca, e frequente dà molto da temere pel fegato, o annunzia l'idropisia del petto: i brividi irregolari sono per lo più segni d'una suppurazione interna: il vomito lo scioglimento del ventre nel principio posson essere sommamente salutari; ma danno da temere negli altri tempi. Le acque, che si estraggono per mezzo della puntura, che s'avvicinano più all'indole dell'urina, son tenute per le migliori: ci fanno temere le limpide, le fetide, le sanguigne, le purulente, ec. Se dopo una tale evacuazione sussiste l'oppressione, si ha tutta la ragione di temere un inondamento nel petto. Quando l'ascite trovasi unito alla gravidanza, talvolta si dilegua per lo scolo delle acque, che precede il parto; ma il più delle volte la malattia sussiste a un segno, che il ventre dopo l'uscita del feto, e della secondina, mostra d'aver il medesimo volume. L'ascite può durar lungo tempo, trovandosi persone con un tal morbo indosso da 10. o 12. anni: abbiamo veduto portare l'idropisia dell'ovaja per ben 50. anni a una fanciulla, che ne ha vissuti 88. Conosco io una donna, che trovasi in tale stato da 25. anni in quà, il cui ventre da più anni è così sterminato, che quando l'inferma, ch'è per altro assai piccola, si trova in letto, sembra una gran palla.

Le osservazioni anatomiche ci lasciano poco da desiderare intorno alla cognizione dei differenti concerti, che danno motivo all'ascite, o che ne sono le conseguenze: queste sono anche in così gran numero, che a stento potrebbero scriversi in un volume, come questo; ma col riunire i fatti della stessa natura, e con toglierne tutte le superfluità, si può molto accorciarle: eccovene il risultato perpetuamente conforme al piano da noi finora tenuto. Il fegato è per lo più la viscera, ch'è intaccata: ora si è veduto d'una mostruosa grossezza, ora picciolo, e disseccato, nulla più grosso del pugno della mano, bianchiccio, livido, del colore dello zafferano, piombino, nero, ec. La sua superficie è comparsa granellosa, bernoccoluta, piena di vesciche, coperta di vasi linfatici sommamente rilevati; la sua sostanza scirroso, callosa, della durezza del legno; gremita di tubercoli, o gessosi, contenente degli abscessi, delle idatidi, degli steatomi, ec. Vien parlato

d' un tumor pietroso del peso di 10. in 12. libbre ; aderente al suo ligamento sospendente . Si è trovata la cistifellea enormemente distesa dalla mole di sette in otto libbre di bile ; contenente un' acqua limpida , senza la menoma tintura , racchiudente abscessi , steatomi , idatidi , pietre , ec. finalmente si è trovata riarfa , e la sua cavità quasi distrutta . La milza è comparsa d' una grossezza sorprendente , scirroso , callosa , e d' una durezza quasi simile a quella della pietra ; la sua superficie coperta di tubercoli gessosi , o di granelli simili alle bolle del vajuolo . Si è scoperto l' epiploon , che conteneva copia grande d' acqua , e d' idatidi , estenuato , steatomatoso , suppurato , e distrutto . Si è veduto lo stomaco prodigiosamente gonfiato dalla flatulenza , pieno d' acqua , cancerato , lacero , ec. Gl' intestini tumefatti in guisa straordinaria , massime il colon , che divien talora grosso come una coscia ; infiammati , putridi , e lacerati ; gl' intestini più delicati alcuna volta incollati insieme , e formanti una sola pallottola : il pancreas esulcerato , in uno stato di putrefazione , e distrutto : il mesenterio esulcerato , scirroso , e d' una mole spaventosa , contenente abscessi , tumori anomali , idatidi , ec. Si è trovato il peritoneo orribilmente grosso , e cartilaginoso , infiammato , granelloso , e cancerato , formante una spranga , che divideva la cavità del ventre in due parti , una delle quali soltanto era inondata . La vena umbilicale è stata trovata profonda , e aperta nel bellico , che serviva di scolatoio , e questo caso è stato alcuna volta osservato . Sono trovati i reni disseccati , spogliati del loro grasso , coperti d' idatidi , scirrosi , esulcerati , racchiudenti pietre , o prodigiosamente dilatati dall' orina , forati , come gli ureteri , e la vescica . La matrice è comparsa enormemente dilatata dall' acqua , contenente pietre , e idatidi , esulcerata , ec. Le ovaje enormemente estese , scirroso , con abscessi , e putride , di apri che le trombe : torna bene l' osservare , che la sostanza delle ovaje s' aumenta a proporzione della loro estensione , sendone vedute di quelle , le quali dopo d' essere state vuotate , pesavano ancora 27. libbre .

Sono altresì osservati dei *Cisti* , o sacchi di tutte le grossezze : ve ne sono di quelli , che occupano tutto il basso ventre , e riducono le viscere a un volume così picciolo , che coloro , i quali non n' erano prevenuti ,
alla

alla prima apertura hanno creduto , che fossero tutte distrutte , tanto eran esse riserrate , ed occultate dal sacco , che contrae maggiore , o minore adesione con tutte le parti adjacenti : questo è massimamente comune all'idropisia del peritoneo , situata fra questa membrana , e il recinto muscolare . Si è inoltre veduto l'epiploon , i reni , e le ovaje formanti colla loro dilatazione sacchi più , o meno considerabili : si è osservato , ch' erano provenienti soltanto dal fegato , dalla matrice , e dalle altre viscere , che non avevano perduto la lor forma : gli uni , e gli altri racchiudevano diverse specie di liquido , idatidi d'ogni grossezza , distaccate , solitarie , o riunite come in un grappolo : questi cisti s' incontrano talora divisi in più cavità , che non comunicano insieme , e racchiudono liquori differenti . Tutte le viscere nell' ascite vero sono state trovate aderenti , coperte d' una crosta gelatinosa , di cui abbiamo più volte parlato , e in uno stato di putrefazione . Si sono osservati tumori fungosi , e carcinomatosi , che si alzavano dalla superficie del fegato , dallo stomaco , dagli intestini , e da altre parti ; idatidi attaccati a tutte le viscere , o ruotolantisi per entro tutta la cavità del ventre . Si è scoperto talora con molta evidenza , che il liquido prendeva il suo corso da un vaso linfatico aperto da una vena latea forata , dai reni , dagli ureteri , e dalla vescica , lacerati : abbiamo già detto di qual natura fossero i varj liquori , covanti nelle cavità additate . Non dobbiamo lasciar di dire , che in queste malattie veggionsi sconcerti orribili nel petto , come inondamenti di tutte le specie , i polmoni aderenti , con tubercoli , esulcerati , putridi , ec. Finalmente si è veduto il cuore d' una smisurata grossezza , o estenuato ; le sue valvule cartilaginose , offee , o pietrose ; la sua superficie esulcerata , coperta della stessa crosta gelatinosa , che trovasi nel basso ventre ; tacche bianchicce , che si toglievano via a foggia di pelliciatola , di cui abbiamo fatto menzione : la sua aderenza col pericardio : questo sacco inspessito , contenente un copioso liquore limpido , sanioso , fetido , ec. intieramente distrutto , e per conseguenza il cuore affatto nudo . Non so parola delle osservazioni , che risguardano la testa , perchè hanno una relazione più lontana colla malattia , di cui trattiamo .

La medicatura , che conviene alle inondazioni del basso ventre , è poco diversa da quella , che abbiamo proposta

posta nell' Articolo generale dell' idropisia: nulladimeno l' esperienza ci ha insegnato, che vi si debbon fare alcuni cambiamenti, che dobbiamo indicare. I vomitivi replicati nei principj, hanno con frequenza prodotto ottimi effetti; ma non è stato lo stesso, quando il male trovavasi avanzato: si può far uso in tutti i tempi dei purganti, come della gialappa, del rabarbaro, dell' iride, della senna, e dei sali idragoghi: ma non dobbiamo fare gran fondamento sopra questi rimedj: i *drastici* singolarmente, che sovente riescono nella leucostemmazia, in questo caso debbonsi temere: l' gomma-gutta, che si dà tanto ugualmente sull' esempio dell' *Willis*, che ne faceva prendere per sei giorni, dai 12. ai 20. grani, potrebbe somministrarne la prova: non è già, che questo metodo non sia talvolta riuscito; ma sommamente estesa sarebbe l' istoria dei suoi rei effetti, se collo stesso interesse ci fosse stata conservata. Gli *aperienti*, e singolarmente i *diuretici* meritano più fede: tali sono la cicoria, il cerfoglio, la scolopendra, la radice di fragola, d' oppio, di mortella salvarica, ec. Il nitro, il sale di ginestra, di tamarisco, e del Glaubero: i centogambe, il tartaro vetriolato, e finalmente la scilla, e le sue preparazioni; ma i rimedj, che in casi simiglianti debbonsi con più ragione denominare aperienti, e diuretici, sono i fortificanti, gli amari, e i marziali: tali sono l' enula campana, le coccole di ginepro, il rabarbaro, la cannella, la cassia legnosa, la pazienza, la centaurea minore, e l' assenzio; lo zafferano di marte, il tartaro marziale, ec. Le acque di Plombieres, di Bourbon-Lancy, e altre minerali, talvolta sono state molto efficaci: si è ancora in alcune circostanze fatto uso del crescione, della pazienza, e d' altri depuranti, e antiscorbutici. Non dobbiamo lasciar di dire, come alcune persone sono state risanate coll' astenersi da ogni, e qualsivoglia bevanda; e vi è stato perfino chi l' ha retta sotto questo strano governo per intieri tre mesi, ingannando la sete con un crostino inzuppato nell' acqua-vite: siffatta pratica, adottata dal *Lislero*, non è da dispregiare.

Ognun sa, che l' evacuazione artificiale delle acque è uno dei più essenziali punti della medicatura: quell' operazione, che chiamano *paracentesi*, può riuscire, quando il liquido non ha covato lungo tempo, e che le viscere non sono intaccate; ma senza queste condizioni la me-

de-

desima precipita i pazienti, che avrebbero potuto vivere lungo tempo in quello stato. Quando il ventre evacuato si riempie in capo a dodici, o quindici giorni, vi è poco da sperare; e siamo forzati, per prolungar la vita all'infermo, a rinnovare l'operazione: ci viene asserito, essere stata fatta più di cinquanta volte nel medesimo soggetto, dal quale si asserisce essere state estratte circa quattrocento pinte d'acqua. Dirò rispetto a questo, che importa molto il comprimere il ventre, a misura che l'acqua scola, e d'impiegarvi dopo l'evacuazione più fasce guarnite di fibbie, e di strisce di cuojo, alcune delle quali debbon passar per le coice, affinchè le viscere vengano ad esser compresse a un di presso, come lo erano per innanzi: bisogna altresì, che i pazienti, i quali erano oppressi dalla pienezza del ventre, non si trovino gran fatto sollevati per l'accasciamento del medesimo: la mancanza di tal precauzione, da molti considerata come una minuzia, rende infruttuosa la paracentesi. E' ancora sovente pericoloso il lasciare il ventre a secco, quando è stato esorbitantemente ripieno; ed allora è cosa più sicura il non estrarre, se non quindici o venti pinte d'acqua per volta. Se vi sono idatidi, fa di mestieri, che l'apertura sia proporzionata al volume loro: ognun vede, che in tal caso non basta la semplice puntura; ed è anche necessario per tutte le idropisie infaccate l'aggrandir l'apertura, e conservarla, non solo per favorir lo scolo delle materie fisse, e fangose, che vi s'incontrano, e che si riproducono in brevissimo tempo; ma eziandio per introdurvi delle iniezioni deterfive, e disseccanti, che in questo caso sono indispensabili: veramente quest'apertura può restar fistolosa: ma è per i pazienti una felicità il poter vivere con questo incomodo: ultimamente si è in questa occasione tentato il setone, e il cauterio, ed è stata una tal pratica alcuna volta vantaggiosa.

Il fine del Primo Tomo.

TAVOLA DEGLI ARTICOLI

Che comprendono le malattie interne.

TOMO PRIMO.

SEZIONE PRIMA.

Malattie generali, e quelle, che non hanno alcuna sede determinata.

L E Febbri.	pag. 9	Flussioni catarrali.	755
Continua semplice.	23	Cachessia.	788
Purida.	25	Scorbuto	811
Ardente.	30	Malfranzese.	877
Maligna.	34	Scrofole.	951
Il sudore Anglicano.	42	Lebbra.	1000
La Peste.	44	Gotta.	102
Febbri intermittenti.	50	Reumatismo.	108
Febbre quotidiana.	56	Affezione Ipocondriaca.	112
Terzana.	57	Idropisia.	117
Quartana.	59	Ristagno di sangue, e di mar-	
Remittente.	61	cia.	122
La Pletora.	62	Ostruzioni, e Scirvi.	124
Riscaldamento morbofo.	64	Tumori interni.	129
Lo Spoffamento (vires ex-		Infiammazione.	132
haustæ.)	65	Suppurazione.	136
L' Anemia.	67	Cancrena.	141
Scoli soppressi, e sfoghi tor-		Insetti, e corpi stranieri.	144
nati indietro.	69	Veleni.	146
Dolori.	72		

SEZIONE II.

Malattie interne della Testa.

L A Vertigine.	151	Sopimento.	161
L' Apoplessia.	153	Tremore.	163
La Vigilia.	170	Paralisi.	165
L' Incubo.	172	Stupidità, e perdita della	
		me-	

memoria.	168	Frenesia.	177
Malinconia.	173	Convulsioni.	18r
Mania.	175	Epilepsia.	186

SEZIONE III.

Malattie interne del Petto.

R Aucedine.	191	Tifichezza.	217
Tosse.	193	Vomica.	221
Catarro soffogativo.	197	Empiema.	223
Infiammazione del petto.	200	Idropisia del petto.	225
Peripneumonia spuria.	206	Palpitazione di cuore.	229
Asma.	208	Sincope.	231
Soffogamento.	212	Singhiozzo.	234
Emoftisi.	214		

SEZIONE IV.


Malattie interne del basso ventre.

I Indigestione.	236	orina spontanea).	321
Vomito.	242	Flatulenza, e Timpanitide.	282.
Vomito sanguigno.	246	Vermi intestinali.	287
Fame canina.	248	Colica Epatica.	292
Dolor di stomaco.	249	Infiammazione del fegato.	295
Passione iliaca, volgarmente il mal del Miserere.	252	Interizia.	298
Cholera.	255	Colica nefritica.	302
Diarrea.	257	Calcolo dei reni, e della ve-	
Flusso sanguigno.	261	scica.	305
Tenesmo.	266	Orina sanguigna.	310
Costipazione.	267	Ulteri dei reni, e della vesci-	
Colica.	270	ca.	312
Iscuria dei reni, e della ve-		Discuria, e Stranguria.	314
scica (o sia soppressione d'		Flussione catarrale della ve-	
orina).	316	scica.	323
Diabete.	320	Ascite.	324
Incontinenza d'orina, (o sia			

TAVOLA

DELLE MATERIE

Contenute nel primo Tomo.



A			
A Bscello interno.	139	Soffogativo.	197
Del fegato.	145	Della vescica.	32
Affezione ipocondriaca.	112	Celtico.	81
Afie febbrili.	14	Colera.	255
Amarezza della bocca.	237	Secca.	ivi
Anasarca, o idropisia.	117	Colica.	270
Anemia.	67	Del Poison.	279
Aneurisma interno.	130	Di stomaco.	250
Annegati.	213	Epatica.	292
Ansietà.	249	Nefritica.	302
Apoplessia.	153	Costipazione.	267
Appetito perduto.	238	Contorsione della bocca.	181
Ardore dello stomaco.	249	Convulsioni.	ivi
D' orina.	315	Convulsionarij.	182
Ascaridi. Vermi.	288	Corpi eterogenei.	144
Ascite.	324	Crisi.	18
Asma.	208	Crudezze delle prime vie.	237
Del petto.	225	Cucurbitini, Vermi.	290
Infaccata.	325	D	
Del pericardio.	324	D Anza di S. Vito.	182
Assopimento.	161	Debolezza da spoffamen-	
B		to.	65
B Azzo ventre, e suoi stati.	17	Delirio.	178
Bile depravata.	239	Depositi purulenti.	137
Brivadori.	163	Diabete.	320
Bubbone pestilenziale.	45	Diarrea.	257
Bubbone venereo.	89	Sanguigna.	261
C		Febbrile.	17
C Achessia.	78	Difficoltà d' orinare.	315
Cancrena interna.	141	Dignignamento di denti.	14
Cardialgia.	249	Digestione, suoi difetti.	237
Catalessia.	182	Dolore.	72
Catarro.	75	Di stomaco.	249
		Febbrile.	17

Dis.

Dissenteria.	262	Frenesia.	177
Disuria.	314	G	
E		Gotta.	102
E Femera, febbre.	23	G Irregolare.	107
E Emiplegia	166	Errante.	109
Emitrite, febbre.	58	I	
Emoptisi.	214	I Dropisia.	117
Emoroidi sopresse.	70	I Incontinenza d' orina,	317
Empiema.	223	Incubo.	172
Epatite.	216	Indigestione.	236
Epilepsia.	186	Inflamrazione interna.	134
Eruzioni rientrate.	69	Del petto.	200
Evacuazioni sopresse.	70	Del cuore.	ivi.
F		Del fegato.	295
F Accia ippocratica.	14	Dei reni.	302
F Fame canina.	248	Insetti in varie parti.	144
Falso peripneo.	206	Intorpidimento.	166
Febbre essenziale.	10	Ipocondria.	112
Generalità.	9	Iscuria.	316
Remittente.	61	Itterizia.	298
Sintomatica.	11	L	
Efemera.	23	L Etargia.	161
Putrida.	25	L Leucostemmazia.	118
Ardente.	30	Licantropia.	173
Maligna.	34	Lienteria.	258
Petecchiale.	37	Lipotimia.	232
Porporina.	ivi.	M	
Quotidiana.	56	M Al caduco.	186
Terzana.	57	M Mal del paese.	173
Quartana.	59	Mania.	175
Continua.	24	Marcia stravasata.	122
Intermittente.	ivi.	Melancolia.	173
Scorbutica.	83	Memoria, sue lesioni.	168
Reumatica.	109	Miserere.	253
Catarale.	193	Moti convulsivi.	181
Dissenterica.	262	Mucchi dello stomaco.	237
Mesenterica.	263	N	
Del sangue.	261	N Efitide.	302
Soppressa.	69	N Nostalgia.	175
Terro caldo.	249	O	
Logosi interna.	132	O Rina sanguigna.	310
Lussioni.	75	O Ostruzioni.	123
Colica.	175		
Colletto.	193		

P

P alpitazione del cuore .	229
Paralisi .	165
Dalla Colica .	277
Parafrenitide .	200
Passione iliaca .	251
Peripneumonia .	200
Spuria .	206
Pestilenza .	44
Pietre dei reni .	303
Di varie parti .	144
Pletora .	62
Pleuritide .	200
Polipo del cuore .	233
Polmonea .	217
Premi .	266
Pronostico .	13
Putredine delle prime vie .	237

R

R enella .	324
Reuma del petto .	191
Reumatismo .	108
Rientramento delle fioriture cutanee .	69
Ritensione d'orina .	317
Riscaldamento .	64
Rogna febbrile .	14
Ruocaggine .	192

S

S angue stravaso .	122
Scorbuto .	81
Scirro interno .	124
Scrofole .	95
Singhiozzo .	234
Sincope .	231
Cardiaca .	197
Solitario . Verme .	289
Soffogamento .	212
Soprappurga .	258
Soppressione dell' evacuazioni .	70

Soppressioni di scoli abituali .

	ivi .
D' orina .	315
Spoffamento .	65
Sputo di sangue .	213
Stagnamento di sangue .	122
Stravamenti sanguigni e linfatici .	124
Stranguria .	314
Stravaso di sangue , e di marcia .	122
Stupidità .	168
Subsulti dei tendini .	16
Sudore anglicano .	42
Svenimento .	232
Svogliatezza .	138
Suppurazione interna .	134

T

T enesmo .	266
Timpanitide .	282
Tifichenza .	217
Tosse .	193
Traspirazione impedita .	71
Tremore .	163
Del cuore .	155
Tumori interni .	129

V

V apor del vino .	213
Ubriachezza .	239
Veleni .	146
Ventosità delle prime vie .	282
Ventre costipato .	267
Vermi di varie parti .	144
Delle prime vie .	287
Vertigine .	151
Vigilia .	170
Ulcera interna .	129
Ulcera del polmone .	215
Dei reni .	316
Vomito .	242
di sangue .	246
Vomica .	221

